

Gene-aminoglycoside interaction severity
Raw Stouffer p < 0.01; median +/- 5 unscaled MAD with minimum |medLFC| >= 1
TOB 0.025
Sens = 8 Prot = 22
Median = 0.040
MAD = 0.106
5MAD range = [-0.490, 0.571]
Final LFC cuts: <= -1.000 / >= 1.000
TOB 0.1
Sens = 77 Prot = 37
Median = -0.068
MAD = 0.129
5MAD range = [-0.711, 0.576]
Final LFC cuts: <= -1.000 / >= 1.000
TOB 0.4
Sens = 121 Prot = 8
Median = 0.028
MAD = 0.217
5MAD range = [-1.059, 1.114]
Final LFC cuts: <= -1.059 / >= 1.114
TOB 1
Sens = 0 Prot = 199
Median = 0.634
MAD = 0.491
5MAD range = [-1.820, 3.089]
Final LFC cuts: <= -1.820 / >= 3.089
TOB 0.4 T2
Sens = 74 Prot = 32
Median = 0.035
MAD = 0.339
5MAD range = [-1.661, 1.731]
Final LFC cuts: <= -1.661 / >= 1.731
AMK
Sens = 322 Prot = 246
Median = -0.025
MAD = 0.243
5MAD range = [-1.240, 1.189]
Final LFC cuts: <= -1.240 / >= 1.189
− log10(raw pStouffer)
Median adjusted log2 fold change
Interaction
Sensitizing
Protective
Not significant