

Additional sensitizing candidates
ftsL
TOB 0.4
Sev=1.42
Emax=-1.78
EK50=0.17
Sens=0.46
Prot=NA
AUC=0.234
Width=0.30
accC
TOB 0.4
Sev=-3.15
Emax=-3.85
EK50=0.51
Sens=0.46
Prot=NA
AUC=1.102
Width=0.30
accB
TOB 0.4
Sev=-0.84
Emax=-2.72
EK50=0.53
Sens=0.52
Prot=NA
AUC=0.427
Width=0.31
minE
TOB 0.4
Sev=-0.98
Emax=-3.96
EK50=0.56
Sens=0.58
Prot=NA
AUC=0.523
Width=0.25
ftsL
AMK
Sev=-1.37
Emax=-0.33
EK50=NA
Sens=0.33
Prot=NA
AUC=0.548
Width=0.40
accB
AMK
Sev=-0.46
Emax=-2.34
EK50=0.38
Sens=0.39
Prot=NA
AUC=0.701
Width=0.43
gyrB
AMK
Sev=-0.69
Emax=-1.34
EK50=0.40
Sens=0.47
Prot=NA
AUC=0.214
Width=0.34
folD
AMK
Sev=-1.21
Emax=-1.17
EK50=0.50
Sens=0.53
Prot=NA
AUC=0.057
Width=0.23
cdsA
AMK
Sev=-0.48
Emax=-1.01
EK50=0.41
Sens=0.56
Prot=NA
AUC=0.137
Width=0.26
purB
AMK
Sev=-1.06
Emax=-1.22
EK50=0.55
Sens=0.58
Prot=NA
AUC=0.072
Width=0.22
Adjusted interaction log2 fold change
Predicted guide efficacy
Guides per bin
5
10
15
20
Parent-guide sequence score
1
0
-1
-2