
Dominant pose cluster (8/10)
Alternative cluster (2/10)
Best pose from Vina seed
10101 0.00 0.07 0.04 0.05 0.06 0.05 0.10 0.09 7.35 7.35
1001 0.07 0.00 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.08 7.35 7.35
2002 0.04 0.05 0.00 0.03 0.03 0.02 0.07 0.06 7.35 7.35
5005 0.05 0.05 0.03 0.00 0.03 0.03 0.06 0.04 7.35 7.34
3003 0.06 0.04 0.03 0.03 0.00 0.02 0.05 0.06 7.36 7.35
9009 * 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.00 0.05 0.06 7.35 7.35
4004 0.10 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.00 0.06 7.36 7.35
7007 0.09 0.08 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.00 7.34 7.33
6006 7.35 7.35 7.35 7.35 7.36 7.35 7.36 7.34 0.00 0.06
8008 7.35 7.35 7.35 7.34 7.35 7.35 7.35 7.33 0.06 0.00
Within dominant cluster
0.02–0.10 Å
Between clusters
7.33–7.36 Å
Within alternative cluster
0.06–0.06 Å
Pairwise pose RMSD (Å)
6
4
2
0
Each cell compares the top−ranked ISO pose from the row seed with the top−ranked pose from the column seed.
Diagonal = self−comparison (0 Å); * seed 9009 = representative dominant pose.
10101 1001 2002 5005 3003 9009* 4004 7007 6006 8008
Best pose from Vina seed