

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Pág. 1 de 5

DETIDADA DE PRODUCTOS II EGALES DADA LA DISEUNCION

RETIRADA DE PRODUCTOS ILEGALES PARA LA DISFUNCION ERECTIL QUE CONTIENEN SILDENAFILO Y TADALAFILO ASI COMO SUS DERIVADOS

El objetivo de esta alerta internacional es difundir información sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos basados en las comunicaciones recibidas por las Agencias Reguladoras Internacionales. Esta es una traducción del texto original de carácter informativo. Cualquier incoherencia en el texto prevalecerá el del texto en su idioma de origen.

PÚBLICO OBJETIVO: Profesionales de la Salud y Público en general. **PRINCIPIOS ACTIVOS:**

- SILDENAFILO Y SUS DERIVADOS: SULFOAILDENAFILO, SULFOSILDENAFIL Y HYDROXYTHIOHOMOSILDENAFIL.
- TADALAFILO.

PROBLEMA: La Agencia de Administración de Drogas y Alimentos – FDA, en Estados Unidos, ha tenido conocimiento, de la comercialización de los productos relacionados en la siguiente tabla y recomienda a los consumidores a no comprar y no usar:

Nº	Fecha de Publicación en Web	Nombre del producto	Descripción del Producto	Razón / Problema	Empresa
				No declaración del	
1	26/05/2012	V Maxx Rx(1)	Droga para la	ingrediente	The Menz
			disfunción eréctil	Sulfoaildenafilo	Club,LLC







Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

			RIF: G-20000101-1	•	
		Kaboom Action		No declaración del	
2	25/05/2012	String(a)	Droga para la	ingrediente	-
		Strips(2)	disfunción eréctil	Sulfoaildenafilo	
				No declaración del	
3	25/05/2012	Mojo Nights(3)	Droga para la	ingrediente	
			disfunción eréctil	Tadalafilo,	
				Sildenafilo,	
				Sulfoaildenafilo	-
				Sulfosildenafilo,	
				Hidroxithiohomosil-	
				denafilo	
4	22/05/2012	EreXite(4)	Droga para la		_
			disfunción eréctil	Tadalafilo	-
		FIRMINITE,			
	18/05/2012	EXTRA			
		STRENGTH	Drogas para la		
5		INSTANT HOT	disfunción eréctil	Tadalafilo	West Coast
3					Nutritionals
		ROD,			
		LIBIDRON			
		cápsulas(1)			
6	18/05/2012	X - ROCK(1)	Droga para la	Sildenafilo y	XROCK
			disfunción eréctil	Hidroxithiohomosil-	INDUSTRIES
				denafilo	

MEDIDA DE REGULACIÓN:

Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio de la FDA, los mencionados productos contienen los principios, farmacológicamente activos: sildenafilo y sus derivados (sulfoaildenafilo, sulfosildenafil, hydroxythiohomosildenafil) y tadalafilo.







Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Pág. 3 de 5

Estos principios activos no están incluidos entre los ingredientes declarados en el etiquetado de dichos productos.

Tadalafilo es el ingrediente activo de Cialis®, y el sildenafilo es el ingrediente activo del Viagra®. Cialis® y Viagra® son medicamentos con prescripción médica que fueron aprobados por la FDA para el tratamiento de la Disfunción Eréctil. Sulfoaildenafil, sulfosildenafil y hydroxythiohomosildenafil son estructuralmente similares al sildenafil, el ingrediente activo del Viagra®.

Estos ingredientes no declarados pueden interactuar con los nitratos, como la nitroglicerina indicada a pacientes masculinos con diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto o enfermedad cardiaca asociada, generando disminución de la presión arterial a niveles peligrosos.

La FDA recomienda que Tadalafilo puede provocar efectos secundarios como cefaleas y erupciones exantemáticas, erupciones cutáneas y/o dermatitis, etc.

Los principios activos señalados anteriormente actúan sobre la disfunción eréctil mediante la inhibición selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE5). Están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión o hipertensión arterial no controlada, ictus y personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.(5)

Este grupo de principios activos (inhibidores selectivos de la PDE5) presenta numerosas interacciones con otros medicamentos, pudiendo además aparecer reacciones adversas de diversa gravedad, a tener en consideración, como las cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia







Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Pág. 4 de 5

ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro vascular, incluso muerte súbita cardiaca, aunque en mayor medida se han presentado en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular. También pueden presentarse cefaleas, mareos, dispepsia, dolor abdominal, congestión nasal, mialgias, dolor de espalda, reacciones de hipersensibilidad como urticaria, erupciones exantemáticas, erupciones cutáneas y/o dermatitis, alteraciones oculares y visuales, etc. (5)

De la información disponible se desprende que estos productos se comercializan en tiendas naturistas así como a través de internet.

Esta notificación es para informar al público de una tendencia creciente de los productos comercializados como suplementos dietéticos o alimentos de contener en los ingredientes drogas ocultas y productos químicos no declarados. Estos productos suelen ser vendidos para el mejoramiento sexual, corporal y pérdida de peso presentándose como "productos totalmente naturales", por lo tanto, los consumidores deben tener cuidado antes de comprar cualquier producto en las categorías anteriores.

Considerando lo anteriormente mencionado, la FDA ordenó el retiro del mercado de todos los ejemplares de los citados productos.

FUENTE: NOTAS INFORMATIVAS, RETIROS DEL MERCADO Y ALERTAS DE SEGURIDAD.

SITIOS:

(1) http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm







Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Pág. 5 de 5

- (2)http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm305601.htm?utm_campaign=Google2&utm_source=fdaSearch&utm_medium=website&utm_term=kaboom&utm_content=1
- (3)http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm305594.htm?utm_campaign=Google2&utm_source=fdaSearch&utm_medium=website&utm_term=mojo%20nights&utm_content=1
- (4) http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/M
 http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/M
 http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/M
 http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/M
 http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesfdaSearch&utm_content=1
- (5) http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/segurid ad/2011/NI-MUH_28-2011.htm

El Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica - CENAVIF agradece su colaboración con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, así mismo, hacer extensivo al personal de salud, la comunicación oportuna de las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) observadas durante su práctica clínica habitual. Se les recuerda que estos reportes remitidos por usted en impreso los puede realizar vía internet, a través, de la dirección: www.inhrr.gob.ve.

Telf CENAVIF: (0212) 219.16.91 / 219.17.66., Fax (0212) 2191779 / 2191785, correo electrónico: cenavif@gmail.com



