

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

1. NOMBRE APROBADO PARA LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA:

PRESARTAN 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

- 2. PRINCIPIOS ACTIVOS:
- a. Cada Comprimidos Recubiertos contiene:

b. Denominación Común Internacional Cantidad b. Denominación Común Internacional Cantidad

Losartan Potásico 50 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA:

Comprimidos Recubiertos

Comprimidos Recubiertos, redondos, concavos con ámbas caras lisas de color blanco.

- 4. DATOS CLÍNICOS:
 - CONDICIONES DE USO
 - 4.1 Indicaciones Terapéuticas Aprobadas:

Tratamiento de la Hipertensión arterial leve a moderada

4.2 Posologías Aprobadas:

Adultos: 50 mg - 100 mg/día.

a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de administración:



4.7 Otras interacciones:

Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

I	b. Dosis Máxima Aprobada:
•	c. En caso de insuficiencia renal:
,	d. En caso de insuficiencia hepática:
4.3	Vía de Administración:
	Vía Oral
•	RESTRICCIONES DE USO
4.4	Contraindicaciones:
	Insuficiencia cardíaca severa, colestasis biliar, aldosteronismo primario. En niños. Paciente con hipersensibilidad desmostrada al principio activo o alguno de sus excipientes.
4.5	Advertencias:
	No administrar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso, suspéndase totalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento.
;	a. Precauciones de empleo:
	Se debe considerar una dosis menor en pacientes con insuficiencia o alteraciones hepáticas moderadas o graves. Después de recibir el tratamiento con el producto puede ocurrir hipotensión sintomática en pacientes con depleción de sodio y/o volumen, esto debe ser corregido antes del inicio del tratamiento. El uso concomitante con suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio y otros productos que contengan potasio, deberá hacerse con precaución, ya que puede producirse un incremento del potasio sérico, por lo que debe realizarse monitoreo frecuente del mismo.
ı	b. Información importante sobre algunos componentes del producto:
4.6	Interacción con otros medicamentos:
	Rifampicina, fluconazol. Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos.



Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

4.8 Interferencias con pruebas de diagnóstico:

4.9 Embarazo:

No administrar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable

4.10 Lactancia:

No administrar durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso, suspéndase totalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento.

4.11	Efectos sobre	la capacidad	para conducir	y utilizar	maquinaria:
------	----------------------	--------------	---------------	------------	-------------

4.12 Reacciones Adversas:

4.13 Sobredosis:

Tratamiento:

- a. Tratamiento Adultos:
- b. Tratamiento Niños:

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

5.1 Propiedades Farmacodinámicas:

Grupo Farmacoterapéutico: Antagonistas de angiotensina II, monodrogas

Código ATC: C09CA01

El losartan, o losartán potásico, es un antihipertensivo tipo ARAII (antagonista de los receptores de angiotensina II). Está indicado en el tratamiento de:

- Hipertensión arterial
- Insuficiencia cardíaca, en combinación con diuréticos o digitálicos (aunque estos últimos son cada vez menos usados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca).
- Enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 2 con proteinuria e hipertensión, como parte del trtamiento antihipertensivo.



6.

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219,1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

5.2 Propiedades Farmacocinéticas:

5.3 Datos Preclínicos sobre seguridad:
DATOS FARMACÉUTICOS:
6.1 Lista cualitativa de Excipientes:
Avicel PH 200
Lactosa
Croscaramelosa Sódica
Estearato de Magnesio
Color Opadray Blanco
Alcohol Etílico 95%
Agua Purificada
6.2 Incompatibilidades:
6.3 Periodo de Validez Aprobado:
3 años
3 dilos
6.4 Precauciones Especiales de Conservación:
No se precisan precauciones especiales de conservación.
6.5 Sistema Envase Cierre:
Blister de PVDC verde/ Foil de aluminio en estuche de cartón
Blister de 1 V De Verde/ Foir de aluminio en estdene de carton
a. Medida Dispensadora:
N/A
b. Uso correcto de la Medida Dispensadora:
N/A
6.6 Presentaciones Aprobadas:
Blister x 7, 10, 14, 20, 30 y 40 comprimidos recubiertos
a. Muestras Medicas Aprobadas:



Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

N/A

6.7 Conservación:

Conservese a temperatura inferior a 30°C y Humedad relativa de 70 % +/- 5% HR.

6.8 Tipo de Dispensación:

Con Prescripción Facultativa

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

Laboratorios Klinos C.A. 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Alegre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

8. REPRESENTANTE:

Laboratorios Klinos C.A. 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Alegre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

9. FABRICANTE:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas.Tlf: 5156031/32/34./ Laboratorios Valmor C.A. Avenida Bolivar, Edificio Valmorca, # 242 Ejido Estado Mérida; Telefono: 0274-2212324, Fax: 0274-2212075.

10. FABRICANTE ENVASADOR:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas.Tlf: 5156031/32/34./ Laboratorios Valmor C.A. Avenida Bolivar, Edificio Valmorca, # 242 Ejido Estado Mérida; Telefono: 0274-2212324, Fax: 0274-2212075. / Producciones Farmaceuticas Elafarca, C.A. ubicada en la zona industrial los tres puentes, Final Avenida Rosendo Bravo este, Edificio Marle P.B., N° 3, El Tambor, Edo. Miranda. Telefono: 0212-322.99.49.

11. PROPIETARIO:

Laboratorios Klinos C.A 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Algre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

E.F. 30.483

13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:

27 de Julio de 1999

14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:

02 de Abril de 2009



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: