

# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

1. NOMBRE APROBADO PARA LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA:

DALTAZEN 60 mg COMPRIMIDOS

- 2. PRINCIPIOS ACTIVOS:
- a. Cada comprimido contiene:

b. Denominación Común Internacional Cantidad b. Denominación Común Internacional Cantidad

Diltiazem Clorhidrato 60 mg

## 3. FORMA FARMACÉUTICA:

Comprimidos

Comprimidos redondos planos, de color blanco.

- 4. DATOS CLÍNICOS:
  - CONDICIONES DE USO
  - 4.1 Indicaciones Terapéuticas Aprobadas:

Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada, cardiopatía isquémica crónica, angina de pecho y taquicardia paroxística supraventricular.

4.2 Posologías Aprobadas:

Adultos: 60 - 120 mg cada 8 ó 12 horas.

Dosis máx: 320 mg/día.

a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de administración:



b. Dosis Máxima Aprobada:

disopiramida.

4.7 Otras interacciones:

# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

	Dosis máx: 320 mg/día.	
ď	En caso de insuficiencia renal:	
Ċ	I. En caso de insuficiencia hepática:	
4.3	Vía de Administración:	
	Vía Oral	
•	RESTRICCIONES DE USO	
4.4	Contraindicaciones:	
	Insuficiencia hepática y renal severa. Insuficiencia cardíaca congestiva. Síndrome del nódulo sinusal. Bloqueo seno-auricular y aurícula ventricular. Hipersensibilidad al diltiazem.	
4.5 Advertencias:		
	Producto de uso delicado, que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No administrar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso, suspenda la lactancia materna mientra dure el tratamiento.	
a. Precauciones de empleo:		
	En pacientes con insuficiencia hepática, renal leve, con disfunción ventricular moderada.	
ŀ	o. Información importante sobre algunos componentes del producto:	
4.6 Interacción con otros medicamentos:		
	Bloqueadores beta adrenérgicos, cimetidina, ciclosporinas, carbamazepina, carbonato de litio y	



# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

## 4.8 Interferencias con pruebas de diagnóstico:

#### 4.9 Embarazo:

No administrar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable.

#### 4.10 Lactancia:

No administrar durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso, suspenda la lactancia materna.

4.11 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:

#### 4.12 Reacciones Adversas:

Bloqueo auriculo-ventricular, estreñimiento, cefalea, náuseas, fatiga y disfunción hepática.

## 4.13 Sobredosis:

**Tratamiento:** 

- a. Tratamiento Adultos:
- b. Tratamiento Niños:

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

## 5.1 Propiedades Farmacodinámicas:

Grupo Farmacoterapéutico: Derivados de la benzotiazepina

Código ATC: CO8DB01

En farmacología, el diltiazem es el nombre genérico de un medicamento que pertenece a los bloqueadores de los canales de calcio a nivel muscular produciendo vasodilatación, por lo que son usados en medicina en el tratamiento de la hipertensión, la angina de pecho y algunos trastornos del ritmo cardíaco. El diltiazem se categoriza como una droga antiangina de la clase 3 y como antiarrítmico de clase IV e incita cambios mínimos en el sistema nervioso simpático.

El diltiazem es un potente vasodilatador por lo que aumenta el flujo sanguíneo, disminuyendo la frecuencia cardíaca por vía de una fuerte depresión de la conducción del nódulo auriculoventricular. Sus acciones farmacológicas son muy similares al verapamilo.



6.

# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219,1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

El diltiazem es metabolizado en el hígado por la enzima CYP3A4 de quien es inhibidor. Es un medicamento por lo general contraindicado en el síndrome del nodo enfermo, en trastornos de conducción del nodo AV, en la bradicardia, en función disminuída del ventrículo izquierdo, en enfermedades oclusivas periféricas, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y en la angina de Prinzmetal.

5.2	Propiedades Farmacocinéticas:	
F 2	Dates Bussificios solves associated	
5.3	Datos Preclínicos sobre seguridad:	
DATOS FARMACÉUTICOS:		
6.1	Lista cualitativa de Excipientes:	
	Aerosil	
	Eudragit N30D	
	Fosfato de Calcio Dibasico	
	Estearato de Magnesio	
	Agua Purificada	
6.2	Incompatibilidades:	
6.3	Periodo de Validez Aprobado:	
	2 años	
6.4	Precauciones Especiales de Conservación:	
	No se precisan precauciones especiales de conservación.	
6.5	Sistema Envase Cierre:	
	Tira termosellada de Foil de Aluminio/Blister de Aluminio-Aluminio, en estuche de cartón.	
а	. Medida Dispensadora:	
	N/A	
b	o. Uso correcto de la Medida Dispensadora:	
	N/A	
6.6	Presentaciones Aprobadas:	



# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Tira Termosellada contentivo de 10,20,30,40 y/o 60 comprimidos Blister x 10,20,30,40 y/o 60 comprimidos

### a. Muestras Medicas Aprobadas:

N/A

## 6.7 Conservación:

Conservese a temperatura inferior a 30°C y Humedad relativa de 70 % +/- 5% HR.

## 6.8 Tipo de Dispensación:

Con Prescripción Facultativa

## 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

Laboratorios Klinos C.A 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Alegre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

## 8. REPRESENTANTE:

Laboratorios Klinos C.A 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Alegre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

### 9. FABRICANTE:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas.Tlf: 5156031/32/34./ Laboratorios Valmor C.A. Avenida Bolivar, Edificio Valmorca, # 242 Ejido Estado Mérida; Telefono: 0274-2212324, Fax: 0274-2212075.

## 10. FABRICANTE ENVASADOR:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas.Tlf: 5156031/32/34./ Laboratorios Valmor C.A. Avenida Bolivar, Edificio Valmorca, # 242 Ejido Estado Mérida; Telefono: 0274-2212324, Fax: 0274-2212075/ Producciones Farmaceuticas Elafarca, C.A. ubicada en la zona industrial los tres puentes, Final Avenida Rosendo Bravo este, Edificio Marle P.B., N° 3, El Tambor, Edo. Miranda. Telefono: 0212-322.99.49.

## 11. PROPIETARIO:

Laboratorios Klinos C.A 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Alegre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

## 12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

E.F. 30.715

### 13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:

14 de Diciembre de 1999



# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

- 14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:
- 27 de Noviembre de 2008
- 15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: