

b. Dosis Máxima Aprobada:

Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

	mbre aprobado para la especialidad fa $ m VA ext{-}A~0.05\%$	RMACÉUTICA	λ:		
a. Cada	nCIPIOS ACTIVOS: a 100g contiene: b. Denominación Común Internacional noína	Cantidad 0,05	g	b. Denominación Común Internacional	Cantidad
3. FOI	RMA FARMACÉUTICA: a.				
4. DA	TOS CLÍNICOS:				
•	CONDICIONES DE USO				
4.1	I Indicaciones Terapéuticas Aprobadas: Está indicado en el tratamiento de	el acné vul	garis.		
4.2	Posologías Aprobadas: Aplicar una vez al día.				
	a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de adm		l 4		
	Apricar en el area afectada una ve	ez ai dia, d	urante	la noche, según indicación médica.	



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-021) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

	c. En caso de insuficiencia renal:
,	d. En caso de insuficiencia hepática:
4.3	Vía de Administración:
	Tópica
•	RESTRICCIONES DE USO
4.4	Contraindicaciones:
	Alergia a los componentes de la fórmula.
4.5	Advertencias:
	Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No usar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que el médico lo indique.
	Se recomienda el uso de un protector solar para evitar la repigmentación causada por la exposición a la luz solar o luz ultra violeta.
	Evitar el contacto con los ojos y otras mucosas. Mantener alejado de los niños.
;	a. Precauciones de empleo:
	En todo paciente con dermatitis crónica refractaria al tratamiento se recomienda realizar la prueba de sensibilidad a los parabenos.
	Proteger toda la preparación de la acción de la luz directa.
ı	b. Información importante sobre algunos componentes del producto:
4.6	Interacción con otros medicamentos:
	Con otros productos usados para el acné.
4.7	Otras interacciones:
4.8	Interferencias con pruebas de diagnóstico:
4.9	Embarazo:



5.

6.

# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

4.10	Lactancia:
4.11	Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:
4.12	Reacciones Adversas:
4.13	Sobredosis:
	Tratamiento:
a.	Tratamiento Adultos:
b.	Tratamiento Niños:
PROP	PIEDADES FARMACOLÓGICAS:
5.1 I	Propiedades Farmacodinámicas:
	- Definition and the second
	Grupo Farmacoterapéutico: Retinoides para uso tópico en acné.
	Grupo Farmacoterapéutico: Retinoides para uso topico en acne.  Código ATC: D10AD
5.2	Código ATC: D10AD
5.2 I	Código ATC: D10AD  Propiedades Farmacocinéticas:
5.2 I 5.3 I	Código ATC: D10AD  Propiedades Farmacocinéticas:  Datos Preclínicos sobre seguridad:
5.2 I 5.3 I DATO	Código ATC: D10AD  Propiedades Farmacocinéticas:  Datos Preclínicos sobre seguridad:  DS FARMACÉUTICOS:
5.2 I 5.3 I DATO 6.1 I	Código ATC: D10AD  Propiedades Farmacocinéticas:  Datos Preclínicos sobre seguridad:  DS FARMACÉUTICOS:  Lista cualitativa de Excipientes:



# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622

LRANGEL	http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1
	Palmilato de Isopropilo.
	Vaselina blanca.
	Butilhidroxianisol.
	Butilhidroxitolueno.
	Propilparabén.
	Metilparabén.
	Edetato Disódico.
	Propilenglicol.
	Agua purificada.
6.2	Incompatibilidades:
6.3	Periodo de Validez Aprobado:
	3 años.
6.4	Precauciones Especiales de Conservación:
	Almacenar en un lugar seco a temperaturas inferiores a 30°C
6.5	Sistema Envase Cierre:
	Tubo colapsible de aluminio revestido internamiente con resina epoxifenólica con tapa de polipropileno
а	. Medida Dispensadora:
b	. Uso correcto de la Medida Dispensadora:
6.6	Presentaciones Aprobadas:
	Tubo colapsible de aluminio revestido internamente con resina epoxifenólica contentivo de 25g y 30g en estuche de cartón.
а	. Muestras Medicas Aprobadas:
	Tubo contentivo de 6g.
6.7	Conservación:
	Consérvese a temperatura ambiente.
6.8	Tipo de Dispensación:



# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Con prescripción.

### 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

GLAXOSMITHKLINEVENEZUELA, C.A, CALLE LUIS DE CAMOENS, N° 115-117, URB. LA TRINIDAD, CARACAS-REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, APARTADO POSTAL 4641. TELEFONOS, (0058-0212) 945.21.22/FAX 943.33.33, RIF J-00021492-1

### 8. REPRESENTANTE:

GLAXOSMITHKLINEVENEZUELA, C.A, CALLE LUIS DE CAMOENS, N° 115-117, URB. LA TRINIDAD, CARACAS-REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, APARTADO POSTAL 4641. TELEFONOS, (0058-0212) 945.21.22/FAX 943.33.33, RIF J-00021492-1

### 9. FABRICANTE:

Stiefel Mexicana S.A de C.V Mexico

### 10. FABRICANTE ENVASADOR:

Stiefel Mexicana S.A de C.V Mexico

### 11. PROPIETARIO:

Lab. Stiefel Inc USA

### 12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

27.830/10

### 13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:

24/10/1995

### 14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:

19/08/2010

### 15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:

23/09/2010