

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

# RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

#### 1. NOMBRE APROBADO PARA LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA:

CLENBUNAL 0.014mg/ml SOLUCIÓN GOTAS

# 2. PRINCIPIOS ACTIVOS:

a. Cada ml contiene:

b. Denominación Común Internacional Cantidad b. Denominación Común Internacional Cantidad

Clenbuterol Clorhidrato 0.014 mg

# 3. FORMA FARMACÉUTICA:

Solución Gotas

Líquido transparente de color rojo ladrillo y olor a mandarina.

# 4. DATOS CLÍNICOS:

CONDICIONES DE USO

#### 4.1 Indicaciones Terapéuticas Aprobadas:

Tratamiento precoz de las afecciones relacionadas con el asma crónico, especialmente en sus formas bronquiales (bronquitis asmática, crónica y enfisematosa).

# 4.2 Posologías Aprobadas:

Adultos y niños mayores de 12 años: 0,02 mg - 0,04 mg/día 2 v/día (1 comp ó 10 mL de jarabe), por la mañana y por la noche. Niños de 6 a 12 años: 0,012 mg/kg/día (10 mL) 2 v/día, mañana y noche. Menores de 6 años: 1 cdta (0,005 mg/ 5 mL) 2 v/día, mañana y noche ó 1 gota/kg/día, mañana y noche.



Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

# a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de administración:

Drogas betabloqueantes pueden alterar su acción.

4.7 Otras interacciones:

Adultos y niños mayores de 12 años: 0,02 mg - 0,04 mg/día 2 v/día (1 comp ó 10 mL de jarabe), por la mañana y por la noche. Niños de 6 a 12 años: 0,012 mg/kg/día (10 mL) 2 v/día, mañana y noche. Menores de 6 años: 1 cdta (0,005 mg/ 5 mL) 2 v/día, mañana y noche ó 1 gota/kg/día, mañana y noche.

ŀ	o. Dosis Máxima Aprobada:
C	a. En caso de insuficiencia renal:
c	I. En caso de insuficiencia hepática:
4.3	Vía de Administración:
	Vía Oral (VO)
•	RESTRICCIONES DE USO
4.4	Contraindicaciones:
	Alergia a los componentes de la fórmula. Insuficiencia renal. Uso concomitante con betabloqueantes, feocromocitoma. Infarto agudo al miocardio, hipertiroidismo.
4.5	Advertencias:
	Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No administrar durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. No exceda la dosis prescrita.
a	a. Precauciones de empleo:
	En pacientes con infarto reciente del miocardio. Tratamiento previo con simpático-miméticos alteraciones del funcionalismo renal, insuficiencia cardíaca e hipertensión.
k	o. Información importante sobre algunos componentes del producto:
4.6	Interacción con otros medicamentos:



5.

# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

4.8	Interferencias con pruebas de diagnóstico:
4.9	Embarazo:
4.10	D Lactancia:
4.11	L Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:
	No se han descrito.
4.12	2 Reacciones Adversas:
	Algunos pacientes sensibles pueden ocasionalmente presentar un ligero temblor en las manor una leve inquietud, cefalea, taquicardia, signos que aconsejan una reducción de la dosificación.
4.13	3 Sobredosis:
	Tratamiento:
а	. Tratamiento Adultos:
b	o. Tratamiento Niños:
PRO	PIEDADES FARMACOLÓGICAS:
5.1	Propiedades Farmacodinámicas:
	Grupo Farmacoterapéutico: Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias. Agonistas selectivos de receptores beta 2 adrenérgicos.
	Código ATC: $R03AC14/R03CC13$
5.2	Propiedades Farmacocinéticas:
5.3	Datos Preclínicos sobre seguridad:



Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

#### 6. DATOS FARMACÉUTICOS:

#### 6.1 Lista cualitativa de Excipientes:

Sorbitol, Glicerina, esencia de mandarina, nipagin, colorante rojo amaranto, colorante FD&C rojo N°40, agua purificada.

# 6.2 Incompatibilidades:

No se han descrito.

# 6.3 Periodo de Validez Aprobado:

24 meses

# 6.4 Precauciones Especiales de Conservación:

No se precisan precauciones especiales de conservación.

# 6.5 Sistema Envase Cierre:

Frasco de vidrio ámbar tipo III con tapa pilfer proof y gotero en estuche de cartón.

#### a. Medida Dispensadora:

Gotero plastico

# b. Uso correcto de la Medida Dispensadora:

NA

# 6.6 Presentaciones Aprobadas:

Frasco de vidrio ámbar con gotero x 15ml en estuche de cartón.

#### a. Muestras Medicas Aprobadas:

Frasco de vidrio ámbar con gotero x 5ml en estuche de cartón.

#### 6.7 Conservación:

Mantener en lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30°C

# 6.8 Tipo de Dispensación:

Con prescripción Facultativa

#### 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas. Tlf: 5156031/32/34.



Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhr.gob.ve RIF: 6-20000101-1

# 8. REPRESENTANTE:

Laboratorios Klinos C.A. 2da avenida de campo alegre, torre credival PB. Chacao. Caracas. Tlf: 7007693.

# 9. FABRICANTE:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas. Tlf: 5156031/32/34.

#### 10. FABRICANTE ENVASADOR:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas. Tlf: 5156031/32/34.

# 11. PROPIETARIO:

Laboratorios Klinos C.A. Parcelamiento industrial la Fe. Edificio Proton. Macarao. Caracas. Tlf: 5156031/32/34.

#### 12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

E.F 29.289

# 13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:

27 Febrero 1998

#### 14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:

23 Octubre 2009

# 15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: