

患者指導③（リン）

リン

腎臓の働きが悪くなると腎臓からのリン排泄ができなくなり血中のリン値が上昇する

リンが上昇すると、血中のカルシウムと結合し体のいろいろなところに沈着する

- ・血管に沈着すると血管石灰化がおき、心筋梗塞や脳梗塞などの合併症を引き起こす
- ・皮膚の痒みや関節の腫脹や変形、痛みなど運動障害が起こる



リンが上昇すると、リンを下げようと骨からカルシウムが溶け出し骨折しやすくなる


採血（透析前）基準値＝3.5～6.0mg/dl

（みたき導入期患者指導パンフレットには 3.5～5.5mg/dl 参考書や医師の考え方により基準値は多少前後）

食事摂取ガイドライン

リン	たんぱく質（0.9～1.2g×DW）×15mg/day 以下
----	--------------------------------

透析患者の血液



骨折すると寝たきりになることもあり予防が大切

透析治療だけでは十分にリンを取り除けないこともある

食事の管理が大切




リンの薬もきちんと飲むように指導

- ・リンはタンパク質に多く含まれる（タンパク質と結合しているため）
- ・無機リンは有機リンに比べて、体内に吸収されやすいためリンの濃度が上昇しやすい

リンの種類	含有食品	体内への吸収率
-------	------	---------

無機リン	食品添加物	加工食品 嗜好飲料	90%以上
有機リン	動物性	肉・魚類 乳製品 卵	40～60%
	植物性	豆類	20～40%

リンを多く含む食品

無機リン	有機リン
 ハム・ソーセージ  加工食品  練り物	 乳製品・豆類  卵  肉 魚

無機リンはコーラ、炭酸飲料水、清涼飲料水、缶コーヒー、ビール、発泡酒にも多く含まれる

食品添加物入りの加工食品はなるべく控えるように指導

内臓系は特にリンが多いため、レバーやしらす・ししゃも等の丸ごと食べる魚には注意

動物性の有機リンの中で肉や魚は栄養価が高く不足すると低栄養の原因となるため、過度な減量は避ける

アセスメント 例

・インスタントラーメン、カップ麺、お菓子、コンビニ弁当、菓子パン、ハム・ソーセージなどの加工食品
を

多く食べていませんか？

・ビールや清涼飲料水、炭酸水、コーラなどの飲料水を飲んでいませんか？

・たんぱく質(肉・魚・卵・豆腐・乳製品など)を多くとりすぎていませんか？

・リンの薬を正しく服用していますか？ 飲む時間、飲む量！！

・リンの薬を飲まない時間帯にお菓子や洋菓子など間食は多くありませんか？

・便秘していませんか？

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。