

患者指導②（カリウム）

カリウム

食事から摂取した90%は尿と一緒に排出される

透析患者は腎機能が低下しており尿からのカリウム排泄がされにくい

採血（透析前）基準値：3.5～5.5(mEq/L)

（みたき導入期患者指導パンフレットには4.5～6.0mEq/L 参考書や医師の考え方により基準値は多少前後）

食事摂取ガイドライン

カリウム	2000mg/day 未満
------	---------------

高カリウム血症の症状

- ・四肢、口唇のしびれ
- ・筋脱力感
- ・悪心、嘔吐などの胃腸症状

高カリウム血症では不正脈が起こり重篤な場合、心停止

カリウムが上昇する原因

・食事からのカリウム過剰摂取

・便秘が続いたとき

カリウムの多い食材



・魚類

海藻類



日本人のカリウム摂取量に影響するものは野菜類が最も多く、次いで果実類

→摂取量が多いため高カリウムになりやすい食材

食材当たりのカリウム含有量が多い、芋類、豆類・種実類、海藻類

→摂取量は少ないがカリウムの割合が多い食材

肉・魚類にもカリウムは含まれているが制限するとタンパク質の低下につながるため、

他の食品での調整が望ましい

カリウムを減らす工夫

カリウムは水に溶けやすい性質がある

①細かく切る→水にさらす（30分以上）



捨てる（カリウムが溶け出しているため）

※電子レンジや蒸し料理ではカリウムはほとんど減らない



大変な場合は冷凍野菜や水煮保存の食材、缶詰の食材を活用

（果物の缶詰のシロップはカリウムが多く含まれているため捨てる）



野菜ジュースやドライフルーツは特にカリウムが濃縮されて含有されているため注意

アセスメント 例

- ・カリウムが多い食品を好んで食べていないかの確認

- ・食事摂取量が多くなっていないか、バランスよく食べているか
- ・食事以外の原因（消化管出血や透析量不足）による高カリウムになってないかを探る

災害時には透析ができず高カリウム血症になる！

カリメート経口液 20%は災害用持ち出し袋に入れておく



内容に関する質問や意見等はME 伊藤までお願いします。