

**STOP !**

# 同一部位穿刺



患者さまの大切な血管（命綱）を、みんなで守る

動画はこちら（約8分）

教育チーム



## 「同一部位穿刺」とは？

こういう刺し方です

他に穿刺できる血管があるのに、**前回・前々回と同じ部位**に刺し続けること。

ただし例外もあります

**その部位にしか穿刺できない**患者さまもいます。

？

トラブルのリスクを承知で**刺し続けても良い**ですか？

# なぜ起きてしまうのか？

患者さま側の事情だけでなく、私たちの要因も見直してみましょう。

## 血管・患者さま側の要因

- 皮下脂肪が厚く、浅い血管が少ない
- シャント血管が短い・蛇行・狭窄があり、穿刺できる範囲が狭い
- 患者さまから「そこなら痛くない」と部位を指定される

## 私たちの要因

- 忙しさや失敗への不安から、つい刺しやすい場所を選んでしまう
- 穿刺部位を記録・共有できておらず、結果的に前回と同じ場所になる

## 患者さまは、こう見ているかもしれません

「また前回と同じところに刺された？」

「今日の透析のことしか考えていないんじゃない？」

「忙しいから、刺しやすいところに刺されただけでは？」

——その一刺し、患者さまはちゃんと見ています。

## なぜ同一部位穿刺は良くないのか

皮膚は体を守る**バリア**。穿刺はそれを壊し、抜針後はかさぶたが代わりを務めます。

完全に修復するまで**約2週間**。同じ場所に刺し続けると…

修復までに

**約2週間**



### ① 感染しやすくなる

敗血症など重大な全身感染につながることも



### ② 瘤ができやすい

血管壁が傷つき、真性瘤・仮性瘤を形成



### ③ 止血困難がおこる

止血しにくく、再出血も起こしやすい

## 私たちにできること

- ✓ 毎回少しずつ穿刺部位をずらす
- ✓ 曜日ごとに違う部位を患者個人板に記載し、スタッフ間で共有する
- ✓ 患者さまの希望でも、リスクを説明し可能な範囲でずらす
- ✓ 迷ったら一人で判断せず、他のスタッフに相談する
- ✓ シヤントの瘤・発赤などがいないか、日々観察する

注意



# 穿刺部位を変えるときに気をつけること

## ① 「ずらす」 = “お試し”ではない

- ずらすことは必要。ただし、難しい場所に「とりあえずお試し」で挑戦する意味ではありません。
- 失敗すると血腫形成などで**シャントを潰すリスク**があります。

### → 推奨

ブラインド穿刺に自信がない場合は、**エコー下穿刺**を強く推奨

## ② 部位を変えるときに注意



局所麻酔剤を貼っている範囲内での部位変更はOK

麻酔の効いている範囲を有効に使い、少しずつずらしましょう。



いきなりとんでもない場所には刺さない

大きく離れた部位は、患者さまの不信感につながります。



瘤化した部位に「毎回ここへ」と言われたら

ずらす必要性を説明し、「次回からずらしましょう」と適切に声かけを。

まとめ

## もう一度、考えてみてください



- 「安全に、失敗しない“同じところ”へ刺せばいい」と思っていないですか？
- 患者さまのことを考えた穿刺か、もう一度考えてみてください。
- シャントの寿命を縮めているのは、あなたではありませんか？

スタッフ一人ひとりの“一刺し”が、  
患者さまの大切な血管（命綱）を守ります。