

<患者指導③ リン>

氏名 _____

リンが上昇すると、血中の（ ① ）と結合し体のいろいろなところに沈着する。

- ・血管に沈着すると（ ② ）がおき、心筋梗塞や脳梗塞などの合併症を引き起こす。
- ・皮膚の痒み、関節の腫脹や変形、痛みなど運動障害が起こる。

食事摂取ガイドライン

リン（ ③ ）×15mg/day 以下。

リン上昇に対する対応

- ・食事指導
- ・（ ④ ）
- ・透析

リンには無機リンと有機リンがあり、無機リンのほうが体内に吸収されやすい。

吸収率は無機リン（ ⑤ ）%以上

有機リン 動物性（ ⑥ ）% 植物性 20～40%

リンを多く含む食品

無機リン

- ・（ ⑦ ）
- ・加工食品
- ・練り物

有機リン

- ・（ ⑧ ）
- ・豆類
- ・卵
- ・肉
- ・魚

無機リンは炭酸飲料水、清涼飲料水、缶コーヒー、（ ⑨ ）、発泡酒にも多く含まれる。

（ ⑩ ）入りの加工食品はなるべく控えるように指導。

解答欄

①	⑥
②	⑦
③	⑧
④	⑨
⑤	⑩