

患者指導①（水分・塩分）

体重増加が多いと循環血漿量が増えるため心負荷、血圧の上昇の原因となり、透析時の除水困難を招く

透析間の体重コントロール

中2日→DWの5%まで 中1日→DWの3%まで

腎臓の残存機能を長期に維持するためには除水量をできるだけ抑えるとよい

食事摂取ガイドライン

塩分	6g/day 未満
水分	できるだけ少なく

水分

- 1.透析間の体重コントロールは水分調整が大事
- 2.医師から言われている1日の水分制限を守る（まずは1ℓ/day）

→1日の尿量+DW×15ml/day という目安もある



- 3.飲水量を量る（使っているコップの容量を量る）

- 4.自宅で体重測定を行う

体に入る水分には薬を飲む水・ラーメンや味噌汁の汁、おかゆの水分、お酒やアルコールも含まれる

水分を減らす工夫




- ・氷で口をうるおす（1個 15cc）
- ・冷たい飲み物はストローを使う
- ・一気に飲む量を減らすため、温かい飲み物にする

調理方法

茹でる・煮るよりも焼く、炒める、揚げるほうが水分は減る

麺類や鍋物、雑炊やシチューなどは水分が多い



塩分

味付けが濃いもの、塩分摂取量が多いと体が水分を要求する（8gの食塩摂取で体重は1kg増える）



塩分を減らす工夫

- ・ 香辛料（しょうが、こしょう、カレー粉）

香味野菜（しそ、にんにく、みつば）

酸味（酢、レモン）などを使う

- ・ しょうゆやソースはかけるよりもつける
- ・ 減塩調味料を使う
- ・ 味にメリハリをつける（濃い味のおかず+薄味のおかず）



ハム、ウインナー、練り物、チーズ、小魚、干物、など加工品や佃煮、漬物など塩蔵品には塩分が多い

中食（惣菜や弁当を購入して食べる場合）

- ・ 買い物をするときに塩分含有量の表示を確認する

（2020 年以降、食塩相当量に換算したものの表示が義務化されている）

【A弁当】		【B弁当】	
			
栄養成分表示 1食分(420g)当たり		栄養成分表示 1食分(420g)当たり	
エネルギー 697kcal		エネルギー 829kcal	
たんぱく質 28.4g		たんぱく質 20.4g	
<u>脂質 20.7g</u>		<u>脂質 32.2g</u>	
炭水化物 99.2g		炭水化物 114.5g	
<u>食塩相当量 2.3g</u>		<u>食塩相当量 2.9g</u>	

外食

- ・ 塩分の多いメニューを知る
- ・ 味がしみ込んだ丼物ではなく定食物を頼み、塩分の多い副菜（汁物や漬物など）を残す

- ・ 麺類は汁を残す
- ・ 減塩料理を依頼する

アセスメント 例

- ・ 外食、中食の利用頻度を確認する
- ・ 水分管理の状況を探る
- ・ 水分管理やのどの渇きのタイミングを聞き食塩摂取量過多の可能性を探る

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。