

Sampling non-isotropic Gaussian random fields


RandField_Matern.m script uses the following stationary non-isotropic Matérn model

$$C_{\Phi}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sigma_c^2 \frac{2^{1-\nu_c}}{\Gamma(\nu_c)} (2\sqrt{\nu_c} \tilde{r})^{\nu_c} K_{\nu_c}(2\sqrt{\nu_c} \tilde{r}) \quad (1)$$


$$\tilde{r} = \sqrt{\frac{(x_1 - x_2)^2}{\lambda_{cx}^2} + \frac{(y_1 - y_2)^2}{\lambda_{cy}^2}} \quad \text{with} \quad \mathbf{x}_1 = (x_1, y_1), \mathbf{x}_2 = (x_2, y_2). \quad (2)$$

where λ_{cx} and λ_{cy} are correlation lengths along x- and y-coordinates, respectively, ν_c is the smoothness of the random field and σ_c^2 is the marginal variance. Some examples of usage:

```
»[F]= RandField_Matern(0.1,0.1,1,1,7,1)% isotropic
```



```
»[F]= RandField_Matern(2,0.02,0.5,1,7,1)% layering along x
```



```
»[F]= RandField_Matern(0.01,1,0.5,0.5,7,1) % layering along y
```

