

Περίληψη

Η παρουσίαση διερευνά πώς η θεωρία Fourier συνδέει τον ήχο, τα κύματα και τη σύγχρονη ψηφιακή προσομοίωση της θάλασσας. Αφετηρία αποτελούν παραδείγματα από τον κινηματογράφο και τα βιντεοπαιχνίδια, όπου οι επιφάνειες νερού δεν σχεδιάζονται κύμα-κύμα, αλλά προκύπτουν από φασματικά μοντέλα και αποδοτικούς αλγορίθμους. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η θεωρία δεν παρουσιάζεται ως έτοιμο εργαλείο, αλλά αναδύεται φυσικά: από τα απλά κύματα και τη σύνθεση ήχων, στις μιγαδικές περιστροφές, τις αναπτύξεις Taylor και τον τύπο του Euler, μέχρι τους μετασχηματισμούς Fourier και την υπολογιστική τους υλοποίηση. Η βασική ιδέα είναι ότι κάθε πολύπλοκο φαινόμενο μπορεί να αποσυντεθεί σε απλές ταλαντώσεις και να ανακατασκευαστεί από αυτές. Με αυτό το πρίσμα, παρουσιάζεται ένα πλήρες pipeline για ocean rendering: επιλογή ενεργειακού φάσματος, εισαγωγή τυχαίων φάσεων, εξέλιξη στο πεδίο συχνοτήτων και τελική ανακατασκευή της επιφάνειας μέσω IFFT.

Στο τέλος, η ψηφιακή θάλασσα δεν αποτελεί απλώς ένα οπτικό αποτέλεσμα, αλλά μια κατασκευή της οποίας μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη δομή και την προέλευση κάθε κύματος.

1 1) Εισαγωγή

1.1 Ο Fourier και η θάλασσα

Η κεντρική ιδέα της παρουσίασης είναι ότι σύνθετα φυσικά φαινόμενα, όπως ο κυματισμός της θάλασσας ή ένας σύνθετος ήχος, μπορούν να περιγραφούν ως άθροισμα απλούστερων ταλαντώσεων. Ο Fourier λειτουργεί ως η γέφυρα ανάμεσα στην οπτική παρατήρηση και στη μαθηματική αναπαράσταση.


1.2 Η τεχνική στον κινηματογράφο

Η πρώτη ταινία στην οποία εφαρμόστηκε η τεχνική που θα συζητηθεί στην συνέχεια είναι το *Waterworld* του 1995. Υλοποιήθηκε σε fortran από τον καθηγητή οπτικής υπολογιστικής (Visual Computing) του πανεπιστημίου του Clempson, Jerry Tessendorf. Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, η ακριβότερη, μέχρι εκείνη την στιγμή, κινηματογραφική παραγωγή, ο *Τιτανικός*, χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική στις σκηνές ανοιχτής θάλασσας. Στην ταινία *“The Perfect Storm”* η τεχνική πέτυχε να απεικονίσει σκηνές με πολύ φουρτουνιασμένη θάλασσα. Έλαβε Όσκαρ Τεχνικής Επίτευξης το 2008 και το λογισμικό προσομοίωσης ρευστών που ανέπτυξε χρησιμοποιήθηκε στην ταινία *«Η Ζωή του Πι»*, η οποία κέρδισε το 2013 το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ. Στα παιχνίδια, η ανάγκη για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο ωθεί στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και ευέλικτων τεχνικών προσομοίωσης κυμάτων, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν ρεαλιστικά αποτελέσματα χωρίς το υψηλό υπολογιστικό κόστος των κινηματογραφικών παραγωγών. Αντί για πλήρεις φυσικές προσομοιώσεις, χρησιμοποιούνται συχνά προσεγγιστικά μοντέλα, όπως τα Gerstner waves, συνδυασμοί ημιτονοειδών κυμάτων, καθώς και τεχνικές βασισμένες σε shaders που εκτελούνται στην GPU. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από σύγχρονα παιχνίδια δείχνουν την εξέλιξη αυτών των τεχνικών. Στο *Assassin's Creed IV: Black Flag*, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο του gameplay, με δυναμικά κύματα και αλληλεπίδραση με τα πλοία που ενισχύουν την αίσθηση του ρεαλισμού. Στο *Sea of Thieves*, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική απόδοση του νερού, με έντονα χρώματα, ομαλές κινήσεις και εντυπωσιακές αντανakλάσεις. Στο *Crysis*, η μηχανή γραφικών εισήγαγε προηγμένες τεχνικές shading και λεπτομερή προσομοίωση επιφάνειας νερού, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του hardware της εποχής. Οι τεχνικές αυτές επιδιώκουν μια ισορροπία μεταξύ οπτικού

ρεαλισμού και υπολογιστικής απόδοσης, επιτρέποντας την απόδοση πειστικών θαλάσσιων επιφανειών σε πραγματικό χρόνο.

2 2) Θεμέλια κυμάτων

Για να καταλάβουμε γιατί αυτές οι τεχνικές δουλεύουν, χρειαζόμαστε πρώτα τη γλώσσα τους. Αυτή η γλώσσα είναι τα κύματα — και ξεκινάμε από τα πιο βασικά. ## Παράμετροι κύματος Η ημιτονοειδής καμπύλη (ή ημιτονοειδές κύμα) είναι ένα μαθηματικό σχήμα που δείχνει πώς γίνεται μια απλή ταλάντωση που επαναλαμβάνεται περιοδικά. Οι συναρτήσεις που τη δημιουργούν, δηλαδή το ημίτονο και το συνημίτονο, είναι συνεχείς και μπορούμε να βρούμε την παράγωγό τους σε κάθε σημείο.



Σχήμα 1: Γραφική παράσταση ημιτονοειδούς κύματος $\sin(x)$.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = A \sin(kx + \varphi)$ ως τη γενική (παραμετρική) μορφή του ημιτόνου.

- Αν πολλαπλασιάσουμε το x με έναν αριθμό k , αλλάζουμε τη συχνότητα (ή ισοδύναμα την περίοδο) του κύματος. Με αυτόν τον τρόπο τα διαδοχικά μέγιστα έρχονται πιο κοντά ή πιο μακριά. Συγκεκριμένα, η περίοδος γίνεται $T = \frac{2\pi}{|k|}$.
- Ρυθμίζοντας το πλάτος A , αλλάζουμε το πλάτος του κύματος: οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές του γίνονται $\pm|A|$.
- Προσθέτοντας μια αρχική φάση φ , εφαρμόζουμε οριζόντια μετατόπιση (phase shift). Έτσι, το κύμα «ολισθαίνει» αριστερά ή δεξιά. Η μετατόπιση είναι $x_0 = -\frac{\varphi}{k}$ ($k \neq 0$).

Για να περιγράψουμε ένα κύμα που κινείται, κάνουμε τη συνάρτηση εξαρτώμενη από θέση και χρόνο $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$. Η μορφή $kx - \omega t$ εισάγει ταυτόχρονα χωρική και χρονική μεταβολή, καθώς ο χρόνος αυξάνεται, το ίδιο «σχήμα» του κύματος μετατοπίζεται στον χώρο.

- k είναι ο κυματαριθμός (rad/m) και συνδέεται με το μήκος κύματος μέσω $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.
- ω είναι η γωνιακή συχνότητα (rad/s) και συνδέεται με τη συχνότητα μέσω $\omega = 2\pi f$.

- Η φασική ταχύτητα (ταχύτητα διάδοσης μιας σταθερής φάσης, π.χ. ενός μέγιστου) προκύπτει αν κρατήσουμε τη φάση $kx - \omega t + \varphi$ σταθερή, $kx - \omega t + \varphi = C()$ οπότε

$$x(t) = \frac{\omega}{k} t + C \Rightarrow v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}.$$

- Τέλος, το πρόσημο καθορίζει την κατεύθυνση διάδοσης:
 - $A \sin(kx - \omega t + \varphi)$: κίνηση προς $+x$,
 - $A \sin(kx + \omega t + \varphi)$: κίνηση προς $-x$.

2.1 2D κύμα $A \sin(k_x x + k_z z - \omega t + \phi)$

Η 1D ιδέα επεκτείνεται σε 2D πεδίο. Το ύψος της επιφάνειας εξαρτάται από δύο χωρικές διαστάσεις (x, z) και από τον χρόνο t : $y(x, z, t) = A \sin(k_x x + k_z z - \omega t + \phi)$. Οι παράμετροι $A, k_x, k_z, \omega, \phi$ έχουν άμεση γεωμετρική/φυσική ερμηνεία:

- A : πλάτος (μέγιστη απόκλιση της επιφάνειας).
- $\vec{k} = (k_x, k_z)$: κυματικό διάνυσμα. Δείχνει την κατεύθυνση διάδοσης (για το $-\omega t$) και το μέτρο του είναι

$$|\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_z^2} = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

- ω : γωνιακή συχνότητα, με $\omega = 2\pi f$.
- ϕ : αρχική φάση (καθορίζει την αρχική «μετατόπιση» του μοτίβου).

Οι γραμμές σταθερής φάσης (π.χ. κορυφές/κοιλάδες) ικανοποιούν

$$k_x x + k_z z - \omega t + \phi = C,$$

δηλαδή είναι ευθείες στο επίπεδο $x-z$ κάθετες στο $\vec{k}$. Η **φασική ταχύτητα** κατά την κατεύθυνση $\vec{k}$ είναι

$$v = \frac{\omega}{|\vec{k}|}.$$

2.2 Gerstner waves

Στην πραγματικότητα, τα κύματα δεν μοιάζουν καθόλου με καθαρά ημιτονοειδή. Αντίθετα, είναι πιο κοφτά και παρουσιάζουν πιο αιχμηρές κορυφές. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προσομοιωθεί με τα λεγόμενα κύματα Gerstner. Τα σημεία της επιφάνειας στα κύματα αυτά, αντί να κινούνται πάνω κάτω όπως στα ημιτονοειδή, κινούνται σε κυκλικές τροχιές και η επιφάνεια αποκτά πιο ρεαλιστικό χαρακτήρα.

Κάθε σημείο της επιφάνειας δίνεται παραμετρικά:

$$x(u, t) = u - \frac{A \cdot k}{|k|} \sin(ku - \omega t + \varphi)$$


$$y(u, t) = A \cos(ku - \omega t + \varphi)$$

όπου u είναι η αρχική οριζόντια θέση κάθε σημείου.

Παράμετροι:

- A (**Πλάτος**): Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς
- k (**Κυματαριθμός**): $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
- ω (**Γωνιακή συχνότητα**): $\omega = \sqrt{g \cdot k}$ (σχέση διασποράς)
- φ (**Αρχική φάση**): Οριζόντια μετατόπιση

Η σχέση $\omega = \sqrt{gk}$ προκύπτει από τη θεωρία επιφανειακών κυμάτων βαρύτητας σε βαθύ νερό.



Σχήμα 2: Γραφική παράσταση κύματος Gerstner (τροχοειδές κύμα) για μήκος κύματος $\lambda = 1$.

2.3 Άθροισμα συχνοτήτων

Διαδραστικά προστίθενται συνιστώσες με διαφορετικές συχνότητες και πλάτη. Οι μαθητές βλέπουν ότι το «σύνθετο» σήμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από υπέρθεση απλών κυμάτων.

3 3) Ήχος

Μέχρι τώρα μιλήσαμε για κύματα στο νερό. Αλλά η ίδια μαθηματική δομή επανεμφανίζεται σε έναν άλλο, πιο οικείο τομέα — τον ήχο. Το αυτί κάνει φυσικά αυτό που ο Fourier κάνει αλγεβρικά. ## Το παράδειγμα του ήχου Ο ήχος χρησιμοποιείται ως αναλογία: όπως το νερό είναι υπέρθεση κυματικών συνιστωσών, έτσι και το ακουστικό σήμα αναλύεται σε απλά ημίτονα. Συνδέεται η μαθηματική μορφή με την φυσική εικόνα πυκνώσεων και αραιώσεων.

3.1 Παράδειγμα ήχου τάξης

Οι συμμετέχοντες τροφοδοτούν παραμέτρους (συχνότητα/πλάτος) και δημιουργούν συλλογικά σύνθετο σήμα. Η διαφάνεια μετατρέπει την ανάλυση Fourier σε βιωματική ομαδική δραστηριότητα.

3.2 Από σύνθετο ήχο σε 3 καθαρούς

Γίνεται η αντίστροφη ανάγνωση: από ένα ενιαίο σύνθετο κύμα προς τις βασικές συνιστώσες του. Έτσι σταθεροποιείται διαισθητικά η έννοια «σύνθεση και ανάλυση είναι δύο όψεις του ίδιου μηχανισμού».

4 4) Taylor

Μια συνάρτηση γύρω από ένα σημείο x_0 μπορεί να προσεγγιστεί με μια σειρά (πολυώνυμο) Taylor:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0)^1 + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

Με παραγωγή της $f(x)$, προκύπτουν οι αντίστοιχοι συντελεστές a_k : $a_0 = f(x_0)$, $a_1 = f'(x_0)$, $a_2 = \frac{1}{2} f''(x_0)$, ..., $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$. Αν το σημείο x_0 είναι το μηδέν, η σειρά ονομάζεται Maclaurin.

4.1 $e^{x/2} \cos(x)$


Η καλύτερη γραμμική προσέγγιση μιας συνάρτησης σε ένα σημείο είναι εκείνη για την οποία η τιμή και η παράγωγος της προσέγγισης συμπίπτουν με την τιμή και την παράγωγο της συνάρτησης στο σημείο αυτό.

Για τη συνάρτηση $f(x) = e^{x/2} \cos(x)$, στο σημείο $x = 0$ υπολογίζουμε $f'(x) = \frac{1}{2} e^{x/2} \cos(x) - e^{x/2} \sin(x) = e^{x/2} \left(\frac{1}{2} \cos(x) - \sin(x) \right)$, άρα:

- $f(0) = e^0 \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1$,
- $f'(0) = e^0 \left(\frac{1}{2} \cdot 1 - 0 \right) = \frac{1}{2}$.

Επομένως, η γραμμική προσέγγιση (πολυώνυμο Taylor πρώτου βαθμού) είναι:

$$T_1(x) = f(0) + f'(0)x = 1 + \frac{x}{2}.$$



Σχήμα 3: Σύγκριση $e^{x/2} \cos x$ με γραμμική προσέγγιση $1 + x/2$

Για τη δεύτερη παράγωγο:

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left[e^{x/2} \left(\frac{1}{2} \cos x - \sin x \right) \right] = \dots = e^{x/2} \left(-\frac{3}{4} \cos x - \sin x \right),$$

οπότε στο $x = 0$:

$$f''(0) = e^0 \left(-\frac{3}{4} \cdot 1 - 0 \right) = -\frac{3}{4}.$$

Έτσι, η τετραγωνική προσέγγιση (πολυώνυμο Taylor δεύτερου βαθμού) είναι:


$$T_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{3}{8}x^2.$$

Σημειώνεται ότι, ενώ η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης στο 0 είναι $-\frac{3}{4}$, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για έναν όρο ax^2 στο πολυώνυμο, ισχύει

$$\frac{d}{dx}(ax^2) = 2ax \quad \text{και} \quad \frac{d^2}{dx^2}(ax^2) = 2a.$$

Άρα, αφού $P''(0) = 2a = -\frac{3}{4}$, προκύπτει $a = -\frac{3}{8}$.

Αν η διαδικασία συνεχιστεί, είναι προφανές ότι κάθε πολυώνυμο μεγαλύτερου βαθμού —και, αντίστοιχα, οι παράγωγοι μεγαλύτερης τάξης— θα ενσωματώνει στο πολυώνυμο περισσότερη πληροφορία, οδηγώντας σε ολοένα και καλύτερη προσέγγιση. Η αναπαράσταση μιας συνάρτησης ως άπειρο άθροισμα πολυωνυμικών όρων ονομάζεται Σειρά Taylor.



Σχήμα 4: Σύγκριση $e^{x/2} \cos x$ με το πολυώνυμο Taylor 5ου βαθμού.

Ο γενικός τύπος της σειράς γύρω από το 0 (γνωστός και ως ανάπτυγμα Maclaurin) είναι η έκφραση:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

όπου κάθε επόμενος όρος προστίθεται για να “διορθώσει” την προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ολοένα και υψηλότερες παραγώγους.

4.2 $\cos(x)$

Η συνάρτηση $\cos(x)$ είναι άρτια, οπότε στο ανάπτυγμα Maclaurin (σειρά Taylor γύρω από το 0) εμφανίζονται μόνο άρτιες δυνάμεις του x . Υπολογίζοντας τις παραγώγους:


$$\begin{aligned} f(0) &= \cos(0) = 1, \\ f'(0) &= -\sin(0) = 0, \\ f''(0) &= -\cos(0) = -1, \\ f'''(0) &= \sin(0) = 0, \\ f^{(4)}(0) &= \cos(0) = 1, \quad \text{κ.ο.κ.} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας στον τύπο $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, προκύπτει:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

Για παράδειγμα, κοντά στο 0:

- Το πολυώνυμο 1 δίνει $\cos(x) \approx 1$.
- Το πολυώνυμο $1 - \frac{x^2}{2}$ διορθώνει την προσέγγιση για μικρά x .
- Προσθέτοντας τον όρο $\frac{x^4}{24}$ γίνεται ακόμη καλύτερη προσέγγιση.



Σχήμα 5: Σύγκριση $\cos x$ με το πολυώνυμο Taylor 5 όρων (έως x^8).

4.3 $\sin(x)$


Αντίστοιχα, το $\sin(x)$ είναι περιττή συνάρτηση, οπότε το ανάπτυγμα περιέχει μόνο περιττές δυνάμεις. Οι παράγωγοι στο 0 δίνουν:

$$\sin(0) = 0, \cos(0) = 1, -\sin(0) = 0, -\cos(0) = -1, \sin(0) = 0, \dots$$

Έτσι:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Παρατηρούμε ότι η σειρά του $\cos(x)$ είναι ακριβώς η παράγωγος όρο προς όρο της σειράς του $\sin(x)$, κάτι που συμφωνεί με τη γνωστή παραγωγή $(\sin x)' = \cos x$.



Σχήμα 6: Σύγκριση του $\sin x$ με πολυώνυμο Taylor 5 όρων.

4.4 e^x


Η εκθετική συνάρτηση e^x έχει την ιδιότητα να ισούται με κάθε της παράγωγο: $(e^x)^{(n)} = e^x$. Επομένως, στο $x = 0$:

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \quad \text{για κάθε } n.$$

Ο τύπος Maclaurin δίνει:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο ανάπτυγμα Taylor, καθώς αποτελεί τη βάση για ορισμούς και πολλές εφαρμογές. Η σειρά συγκλίνει και πάλι για κάθε x , με ακτίνα σύγκλισης $R = \infty$.



Σχήμα 7: Σύγκριση e^x με το πολυώνυμο Taylor 5ου βαθμού (6 όροι).

5 5) Euler

Τα αναπτύγματα του $\sin x$, $\cos x$ και e^x μοιάζουν ανεξάρτητα. Αλλά αν αντικαταστήσουμε το x με ix στο ανάπτυγμα του e^x και οι τρεις συναρτήσεις αποκαλύπτονται ως μία.

Γνωρίζοντας τα αναπτύγματα των $\sin x$, $\cos x$ και e^x , μπορούμε να ανακαλύψουμε τη σχέση **Euler**. Αν αντικαταστήσουμε x με ix στο ανάπτυγμα της e^x (όπου $i^2 = -1$) και ομαδοποιήσουμε πραγματικούς και φανταστικούς όρους, θα προκύψει $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ που συνδέει τις τρεις αυτές θεμελιώδεις συναρτήσεις.


Ξεκινάμε από το ανάπτυγμα της εκθετικής συνάρτησης:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

Αντικαθιστούμε το x με ix , όπου i είναι η φανταστική μονάδα ($i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$, κ.ο.κ.):

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} + \cdots$$

Υπολογίζουμε τις δυνάμεις του i :



Σχήμα 8: Μιγαδικό επίπεδο: η γραφική αναπαράσταση του τύπου του Euler.

- $(ix)^0 = 1$
- $(ix)^1 = ix$
- $(ix)^2 = i^2 x^2 = -x^2$
- $(ix)^3 = i^3 x^3 = -ix^3$
- $(ix)^4 = i^4 x^4 = x^4$
- $(ix)^5 = i^5 x^5 = ix^5$
- $(ix)^6 = i^6 x^6 = -x^6$
- $(ix)^7 = i^7 x^7 = -ix^7$
- Κ.Ο.Κ.

Αντικαθιστώντας:

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{-x^2}{2!} + \frac{-ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} + \frac{-x^6}{6!} + \frac{-ix^7}{7!} + \dots$$

Ομαδοποιούμε τώρα τους **πραγματικούς** όρους (αυτούς που δεν πολλαπλασιάζονται με i) και τους **φανταστικούς** όρους (αυτούς που περιέχουν i).

Πραγματικοί όροι: προέρχονται από άρτιες δυνάμεις $n = 0, 2, 4, 6, \dots$ (γιατί οι περιττές δίνουν παράγοντα i). Συγκεκριμένα:

$$n = 0 : 1, \quad n = 2 : -\frac{x^2}{2!}, \quad n = 4 : \frac{x^4}{4!}, \quad n = 6 : -\frac{x^6}{6!}, \quad \dots$$

Δηλαδή:

$$\operatorname{Re}(e^{ix}) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Το άθροισμα αυτό είναι ακριβώς το ανάπτυγμα Taylor του $\cos x$ (βλ. §4.2):

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Φανταστικοί όροι: προέρχονται από περιττές δυνάμεις $n = 1, 3, 5, 7, \dots$ και περιέχουν τον παράγοντα i . Γράφουμε:

$$n = 1 : ix, \quad n = 3 : -\frac{ix^3}{3!}, \quad n = 5 : \frac{ix^5}{5!}, \quad n = 7 : -\frac{ix^7}{7!}, \quad \dots$$

Βγάζοντας κοινό παράγοντα i :

$$\operatorname{Im}(e^{ix}) = i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)$$

Η παρένθεση είναι το ανάπτυγμα Taylor του $\sin x$ (βλ. §4.3):

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Επομένως:

$$e^{ix} = \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right)}_{\cos x} + i \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}_{\sin x}$$

Τελικά:

$$\boxed{e^{ix} = \cos x + i \sin x}$$

Αυτή η ταυτότητα συνδέει την εκθετική με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις στο μιγαδικό πεδίο και αποτελεί το θεμέλιο για τις σειρές Fourier, την ανάλυση κυματομορφών και άλλες εφαρμογές στη φυσική και τη μηχανική.

5.1 Ο i ως περιστροφή και ανάπτυγμα

Ο πολλαπλασιασμός με i ερμηνεύεται ως περιστροφή κατά 90° . Από εκεί προκύπτει φυσικά η σύνδεση με τη σχέση του Euler και η μετάβαση σε κυκλική αναπαράσταση ταλαντώσεων.

6 6) Σειρές Fourier

Ο Fourier (1768–1830), εμπνευσμένος από το πρακτικό πρόβλημα της θερμικής μόνωσης κτιρίων που τον απασχόλησε κατά τη θητεία του ως σύμβουλος του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, ανέπτυξε μια πρωτοποριακή μαθηματική θεωρία για τη διάδοση της θερμότητας, απορρίπτοντας τις θεωρίες της εποχής του και στηριζόμενος αποκλειστικά στις εξισώσεις. Το 1807 παρουσίασε στην Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού την εξίσωση θερμότητας και, για να τη λύσει, εφηύρε τις σειρές Fourier — την ανάλυση δηλαδή οποιασδήποτε ομαλής συνάρτησης ως άθροισμα απείρων ημιτόνων και συνημιτόνων. Αν και αρχικά αμφισβητήθηκε για έλλειψη μαθηματικής αυστηρότητας, το έργο του δημοσιεύτηκε πλήρως δεκαπέντε χρόνια αργότερα στο *Théorie analytique de la chaleur* (1822).

6.1 Διάχυση θερμότητας με ημίτονο

Αν θερμάνουμε ένα μικρό τμήμα μιας μονωμένης μεταλλικής ράβδου και το αφήσουμε για αρκετή ώρα, η καθημερινή μας εμπειρία από τη διάχυση της θερμότητας μάς επιτρέπει να προβλέψουμε ότι η θερμοκρασία θα εξομαλυνθεί μέχρι να γίνει ομοιόμορφη. Σε συνθήκες τέλει μόνωσης, η θερμότητα θα παραμείνει στο μέταλλο για πάντα. ια τρία γειτονικά σημεία T_1, T_2, T_3 :

$$\frac{dT_2}{dt} = \alpha \left(\frac{T_1 + T_3}{2} - T_2 \right)$$

Αυτό είναι η **διαφορά των διαφορών** — δηλαδή η δεύτερη παράγωγος ως προς τον χώρο.

Στο συνεχές όριο (άπειρα σημεία) γίνεται:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Διαβάζεται: «ο ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας στον χρόνο εξαρτάται από την καμπυλότητα της κατανομής στον χώρο».

Όπου η κατανομή **κυρτώνει προς τα πάνω**, η θερμοκρασία **ανεβαίνει**.

Όπου **κυρτώνει προς τα κάτω**, **κατεβαίνει**.

Οι ανωμαλίες εξομαλύνονται.

6.2 Ο Fourier μπροστά στο πρόβλημα

Ο Fourier ρώτησε: μπορώ να γράψω μια **αυθαίρετη** αρχική κατανομή $T(x, 0)$ ως άθροισμα ημιτόνων;

$$T(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x)$$

Αν ναι, τότε κάθε αρμονική εξελίσσεται ανεξάρτητα:

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\alpha n^2 \pi^2 t} \sin(n\pi x)$$

Παρατήρησε τι συμβαίνει με τον χρόνο:

Αρμονική	Ρυθμός απόσβεσης
$n = 1$ (χαμηλή)	αργά
$n = 5$ (μέση)	γρηγορότερα
$n = 20$ (υψηλή)	πολύ γρήγορα

Οι υψηλές συχνότητες σβήνουν πρώτες.

Γι' αυτό η ράβδος εξομαλύνεται με τον χρόνο.

6.2.1 Πώς βρίσκουμε τους συντελεστές a_n ;

$$a_n = 2 \int_0^1 T(x, 0) \sin(n\pi x) dx$$

Πολλαπλασιάζουμε την άγνωστη κατανομή με μια **γνωστή αρμονική** και ολοκληρώνουμε.

- Αν «ταιριάζουν» → μεγάλο αποτέλεσμα
- Αν δεν ταιριάζουν → μηδενίζεται

Αυτή η ιδέα δεν ανήκει μόνο στη θερμότητα.

Στην επόμενη ενότητα θα δούμε ότι η ίδια ακριβώς λογική — πόσο από κάθε συχνότητα κρύβεται μέσα σε ένα σήμα — αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier.

6.3 Step function σε ράβδο 1 m

Μια ασυνεχής αρχική συνθήκη αναπτύσσεται σε σειρά Fourier και παρατηρείται η σταδιακή σύγκλιση με περισσότερους όρους. Η διαφάνεια συνδέει μαθηματική ανάλυση με πραγματικό διάχυτο φαινόμενο.

6.4 Σύνοψη Fourier

Κάθε συνάρτηση μιας μεταβλητής είτε συνεχής είτε ασυνεχής, μπορεί να επεκταθεί σε μια σειρά ημιτόνων πολλαπλασίων της μεταβλητής

7 7) Μετασχηματισμός Fourier

Η ράβδος και η εξίσωση θερμότητας δεν ήταν παρά η αφετηρία. Εκεί γεννήθηκε η βασική ιδέα — ότι μια περιοδική συνάρτηση μπορεί να αναλυθεί σε άθροισμα ημιτόνων και συνημιτόνων — αλλά η δύναμη της μεθόδου δεν μπορούσε να μείνει κλεισμένη στα όρια ενός φυσικού προβλήματος. Το επόμενο βήμα ήταν η γενίκευση: ο Μετασχηματισμός Fourier απελευθερώνει το εργαλείο από την περιοδικότητα και το εφαρμόζει σε οποιοδήποτε σήμα, οποιασδήποτε μορφής. Από την περιγραφή της θερμότητας σε μια ράβδο, φτάνουμε σε ένα καθολικό μαθηματικό πρίσμα που διαλύει κάθε σήμα στις συχνοτικές του συνιστώσες — και αυτό ακριβώς το κάνει σήμερα θεμελιώδες εργαλείο σε κάθε πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας. ## Από το σήμα στο φάσμα (Fourier Transform)

Ο τύπος του Euler που είδαμε στην ενότητα 5:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

είναι η καρδιά του μετασχηματισμού. Με $\theta = -\frac{2\pi kn}{N}$:

$$e^{-i\frac{2\pi kn}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Άρα ο DFT γράφεται:

$$\begin{aligned} X_k &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i\frac{2\pi kn}{N}} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \left[\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right] \end{aligned}$$

και άρα η πράξη που εκτελείται είναι ουσιαστικά:

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(X_k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \\ \operatorname{Im}(X_k) &= -\sum_{n=0}^{N-1} x_n \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right).\end{aligned}$$

Τι σημαίνει αυτό γεωμετρικά:

- Κάθε δείγμα x_n πολλαπλασιάζεται με ένα σημείο στον μοναδιαίο κύκλο γωνίας $-\frac{2\pi kn}{N}$
- Το άθροισμα όλων αυτών των σημείων δίνει το X_k
- Το κόκκινο διάνυσμα στον κύκλο αριστερά είναι ακριβώς αυτό το άθροισμα — το κέντρο μάζας του τυλίγματος
- Όταν η δοκιμαστική συχνότητα k ταιριάζει με το σήμα, τα σημεία συγκεντρώνονται και το διάνυσμα απομακρύνεται από το μηδέν → spike στο φάσμα

7.1 Σύνθετο σήμα και spikes

Συνδέονται ορατά οι κορυφές του φάσματος με τις επιμέρους ημιτονικές συνιστώσες. Το «κάθε spike = ένας τρόπος ταλάντωσης» γίνεται άμεσο συμπέρασμα.

7.2 Τι κάνει ο απλός Fourier Transform (DFT)

Ο DFT παρουσιάζεται ως αποτίμηση/προβολή του σήματος σε διακριτές συχνότητες. Η διαφάνεια προετοιμάζει το έδαφος για πολυωνυμική ερμηνεία στην επόμενη ενότητα.

7.3 Τι κάνει ο αντίστροφος μετασχηματισμός (IDFT/IFFT)

Από το φάσμα επιστρέφουμε στο σήμα: η αντίστροφη διαδικασία ανασυνθέτει χρονική μορφή. Εδραιώνεται ότι η πληροφορία δεν χάθηκε, απλώς άλλαξε αναπαράσταση.

7.4 Παράδειγμα απλού DFT -> IFFT σε ήχο

Αφαιρείται επιλεκτικά φασματική συνιστώσα και ακούγεται το αποτέλεσμα μετά την ανασύνθεση. Η διαφορά πριν/μετά κάνει απτή την έννοια του φιλτραρίσματος. Ο Μετασχηματισμός Fourier αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση σημάτων σε συχνότητες – είτε πρόκειται για ένα ηχητικό κύμα (1D) είτε για μια επιφάνεια θάλασσας (2D). Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά στην υπολογιστική πολυπλοκότητα που καθιστά την προσομοίωση ωκεανού πολύ πιο απαιτητική από την επεξεργασία ήχου.

8 8) Πολυπλοκότητα

Κάθε αλγόριθμος έχει ένα «κόστος» — τον αριθμό των πράξεων που απαιτεί συναρτήσει του μεγέθους των δεδομένων εισόδου n . Αυτό το κόστος εκφράζεται με τη Big-O notation και αποτελεί το κύριο μέτρο σύγκρισης αλγορίθμων. Ένας

αλγόριθμος $O(n^2)$ σημαίνει ότι αν διπλασιαστούν τα δεδομένα, ο χρόνος εκτέλεσης τετραπλασιάζεται — ένας $O(n \log n)$ αλγόριθμος “αντέχει” σε πολύ μεγαλύτερα δεδομένα, καθώς η αύξηση του κόστους είναι ουσιαστικά σχεδόν γραμμική. Η διαφορά αυτή δεν είναι θεωρητική, σε πραγματικά προβλήματα με εκατομμύρια δεδομένα, η επιλογή αλγορίθμου καθορίζει αν μια υπολογιστική εργασία ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα ή σε μέρες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, αρκεί να συγκρίνουμε τον 1D ήχο με τη 2D θάλασσα. Στον 1D ήχο, για ένα σήμα μήκους N δειγμάτων, ο απευθείας DFT απαιτεί $O(N^2)$ πράξεις. Για $N = 44100$ (π.χ. 1 sec CD quality), αυτό είναι εφικτό με σύγχρονους επεξεργαστές, ειδικά αν χρησιμοποιήσουμε FFT ($O(N \log N)$).

Αντίθετα, σε μια προσομοίωση θάλασσας με πλέγμα $N \times N$ σημείων, ο 2D DFT χρειάζεται $O(N^4)$ πράξεις συνολικά. Για $N = 512$, αυτό σημαίνει περίπου 68×10^9 πράξεις – πρακτικά αδύνατο σε πραγματικό χρόνο. Ακόμα και με FFT ($O(N^2 \log N)$), το κόστος παραμένει μεγάλο: για $N = 1024$ χρειαζόμαστε $\approx 10^7$ πράξεις ανά frame, κάτι που απαιτεί GPUs και παραλληλοποίηση.

Γι’ αυτό ο ήχος μπορεί να υπολογίζεται εύκολα σε real-time, ενώ η ρεαλιστική θάλασσα χρειάζεται εξειδικευμένες τεχνικές (φάσμα Phillips, IFFT) για να είναι υπολογιστικά εφικτή. Ακριβώς επειδή το κόστος είναι τόσο υψηλό, χρειαζόμαστε αλγορίθμους που δεν αυξάνουν εκρηκτικά τον αριθμό των πράξεων καθώς μεγαλώνουν τα δεδομένα. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η στρατηγική Divide & Conquer.

8.1 Divide & Conquer

Η στρατηγική **Divide & Conquer** είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους μείωσης της πολυπλοκότητας. Η λογική της είναι απλή: αντί να επιλύεις ένα μεγάλο πρόβλημα απευθείας, το διασπας αναδρομικά στη μέση, επιλύεις κάθε τμήμα ανεξάρτητα και στη συνέχεια συνδυάζεις τα αποτελέσματα. Ένα κλασικό παράδειγμα εφαρμογής της στρατηγικής αυτής αποτελεί η ταξινόμηση. Ο Bubble Sort προχωρά αφελώς συγκρίνοντας κάθε στοιχείο με όλα τα υπόλοιπα με κόστος $O(n^2)$. Ο Merge Sort εφαρμόζει Divide & Conquer και ανάγει το ίδιο πρόβλημα σε $O(n \log n)$, με δραματικά αποτελέσματα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Αυτή ακριβώς η αρχή εφάρμοσαν οι Cooley & Tukey (1965) στον υπολογισμό του Μετασχηματισμού Fourier: ο απευθείας υπολογισμός (DFT) απαιτεί $O(n^2)$ πράξεις — ο **FFT** διασπά αναδρομικά το πρόβλημα και το ανάγει σε $O(n \log n)$, καθιστώντας εφαρμόσιμο στην πράξη ό,τι ήταν ως τότε υπολογιστικά απαγορευτικό.

9 9) Fast Fourier Transform

9.1 Πολυώνυμα

Ένα πολυώνυμο βαθμού $n - 1$ γράφεται ως:

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$$

ή ισοδύναμα ως **διάλυμα συντελεστών**: $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$.

9.1.1 Κύριες Πράξεις

- **Υπολογισμός**: Δίνεται x_0 , υπολόγισε $A(x_0)$ — Χρόνος: $O(n)$ με τον Κανόνα Horner
- **Πρόσθεση**: $C(x) = A(x) + B(x)$ — Χρόνος: $O(n)$

- **Πολλαπλασιασμός:** $C(x) = A(x) \cdot B(x)$ — Χρόνος: $O(n^2)$ αφελώς

Κανόνας Horner: $A(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots x(a_{n-1}) \dots))$

Απαιτεί $O(n)$ πολλαπλασιασμούς και $O(n)$ προσθέσεις. Πολλαπλασιασμός δύο πολυωνύμων 2ου βαθμού: κάθε όρος του A πολλαπλασιάζεται με κάθε όρο του B. Για πολυώνυμο βαθμού n, ο απλός αλγόριθμος χρειάζεται $O(n^2)$ πράξεις (κάθε ζευγάρι στοιχείων = 1 πολλαπλασιασμός). Κάθε πολυώνυμο βαθμού d μπορεί να αναπαρασταθεί μοναδικά με d+1 σημεία

N-ες ρίζες της μονάδας Οι n-οστές ρίζες της μονάδας είναι οι μιγαδικοί αριθμοί z που ικανοποιούν την εξίσωση $z^n - 1 = 0$

9.2 Split άρτιων/περιττών όρων (Cooley)

Το πρόβλημα μεγέθους N χωρίζεται σε δύο υποπροβλήματα μεγέθους N/2 μέσω even/odd decomposition. Αυτή είναι η εννοιολογική καρδιά του divide-and-conquer για FFT.

9.3 Cooley-Tukey FFT βήμα-βήμα

Παρουσιάζεται η αναδρομική διαδικασία και η επανασύνθεση αποτελεσμάτων σε επίπεδα. Οι μαθητές βλέπουν πώς τοπικά βήματα παράγουν συνολικά μεγάλη μείωση κόστους.

10 10) Θάλασσα

10.1 Από 1D ήχο σε 2D θάλασσα

Γίνεται η αφηγηματική ένωση του πρώτου μισού με το τελικό application: από σήματα και φάσματα σε χωρικό κυματικό πεδίο. Η διαφάνεια λειτουργεί ως conceptual bridge.

10.2 Τι είναι ο κυματισμός

Ορίζεται η επιφάνεια ως σύνθεση κυματικών modes σε 2D. Οι βασικές έννοιες μεταφέρονται από το 1D στο πεδίο (x, z) .

10.3 Ενεργειακό φάσμα

Το φάσμα εκφράζει πώς κατανέμεται η ενέργεια σε κυματαριθμούς. Η επιλογή του επηρεάζει άμεσα αν η θάλασσα φαίνεται ήρεμη, κοφτή ή χαοτική.

10.4 Φάσμα Phillips

Εισάγεται το κλασικό μοντέλο Phillips που ενσωματώνει άνεμο και βαρύτητα στη στατιστική στάθμιση συχνοτήτων. Έτσι το φάσμα αποκτά φυσική βάση.

10.5 Τυχαίες φάσεις

Η τυχαιοποίηση φάσεων είναι κρίσιμη για ρεαλισμό, ώστε να αποφεύγονται τεχνητά περιοδικά μοτίβα. Τονίζεται η σημασία του stochastic στοιχείου στο τελικό visual.

10.6 Εξέλιξη στον χρόνο

Οι φασματικοί συντελεστές ενημερώνονται χρονικά ώστε το πεδίο να εξελίσσεται δυναμικά. Η στατική περιγραφή μετατρέπεται σε animation.

10.7 IFFT ανακατασκευή

Με IFFT μεταφερόμαστε από το πεδίο συχνοτήτων στο χωρικό ύψος επιφάνειας $h(x, z, t)$. Εδώ κλείνει ο πλήρης κύκλος θεωρία -> υπολογισμός -> γεωμετρία.

10.8 Τελικό rendering

Από το height field παράγονται normals, φωτισμός και τελικό shading. Η μαθηματική υποδομή μετασχηματίζεται στο ορατό αποτέλεσμα.

10.9 Δραστηριότητα: Σενάριο θάλασσας

Η τάξη επιλέγει σενάριο παραμέτρων (άνεμος, ένταση, στιλ) και παρατηρεί ζωντανά το οπτικό αποτέλεσμα. Η διαφάνεια λειτουργεί ως εφαρμοστικό capstone.

11 Εκτέλεση και κλείσιμο

11.1 Ρυθμίσεις web demo

Καταγράφεται πρακτικά ο τρόπος εκτέλεσης του demo σε teacher/client mode, καθώς και βασικά σημεία χειρισμού για τάξη. Έτσι το υλικό είναι άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμο.

11.2 Θάλασσα κυμάτων

Τελική εικόνα: επιστροφή στο αρχικό οπτικό ερέθισμα, αλλά πλέον με πλήρη κατανόηση του pipeline που το παράγει. Κλείσιμο με ανακεφαλαίωση της πορείας από τα απλά κύματα έως τη φασματική προσομοίωση θάλασσας.

12 Βιβλιογραφία