
Eczéma

Eczema

Généralités

- Dermatose vésiculeuse, liée à une spongiose intradermique mais à vésicules non visibles ni palpables.
- Responsable d'un prurit qui induit un épaississement du derme (une lichénification).
- Deux grands types :
 - dermatite atopique : chez un patient génétiquement prédisposé à produire des anticorps d'isotype IgE (atopique) en lien avec une exposition à des allergènes (acariens, salive d'animaux, pollens...) par différentes voies (respiratoires, alimentaire) ;
 - eczéma de contact : sensibilisation à un allergène par contact direct avec la peau (nickel).

Dermatite atopique

Diagnostic (clinique)

Critères de Williams = prurit et au moins trois critères parmi les suivants :

- antécédent personnel d'asthme ou de rhinite allergique ;
- début avant l'âge de 2 ans ;
- antécédents de lésions des convexités ;
- lésions d'eczéma des plis ;
- peau sèche généralisée.

Présentations cliniques

- Chez le nourrisson :
 - survenant avant l'âge de 2 ans ;
 - prurit gênant le sommeil, agitation au déshabillage ;
 - lésions aiguës érythémateuses, suintantes puis croûteuses sur un fond de xérose cutanée ;
 - les lésions atteignent les faces convexes du visage et des membres : « croûtes de lait ».
- Chez l'enfant :
 - xérose cutanée (surtout en hiver), lichénification et excoriation ;
 - prédomine dans les plis (du coude ou creux poplité).
- Chez l'adolescent et l'adulte :
 - même aspect que l'enfant ;
 - eczéma nummulaire : forme arrondie, en médaillon en dehors des plis ;
 - prurigo ;
 - possible atteinte du visage ou du cou ;
 - érythrodermie.
- Diagnostic différentiel : si apparition tardive, évoquer une autre cause (gale, eczéma de contact, lymphome T cutané...).

Évolution et complications

- Dans la majorité des cas, l'évolution de la dermatite atopique est favorable et disparaît avec l'âge (avant la fin de l'adolescence).
- Les autres manifestations de l'atopie peuvent, par contre, apparaître au cours du temps, selon « la marche atopique » :
 - allergie alimentaire, notamment aux protéines de lait de vache ;
 - asthme ;
 - rhinite chronique.
- Les complications sont surtout infectieuses :
 - bactériennes : impétiginisation (lésions croûteuses jaunes) ;

- virales : eczéma herpeticum, surinfection par HSV-1 : voir fiche [Herpèsvirus \(infection à\)](#).

Examens complémentaires

- Pas de nécessité d'examen complémentaire.
- Il existe quelques rares situations où les explorations allergologiques sont requises :
 - suspicion d'allergie alimentaire associée (cassure de la courbe pondérale, syndrome oral, troubles digestifs, résistance à un traitement bien conduit) ;
 - asthme.

Traitement

- Éducation thérapeutique : comprendre les poussées ; éviter les textiles irritants et le tabac ; la nuit, ne pas trop couvrir et température fraîche dans la chambre ; gels lavant sans savon.
- Application d'émollient quotidiennement.
- Traitement des poussées :
 - traitement dermocorticoïde en général 1 à 3 semaines :
 - activité très forte : contre-indiquée chez nourrisson, jeune enfant, visage, plis et siège,
 - activité forte : pour les lésions lichénifiées ou très inflammatoires,
 - activité modérée : pour les autres formes (pas d'intérêt de l'activité faible) ;
 - inhibiteur de la calcineurine topique (tacrolimus) : en cas de résistance aux dermocorticoïdes.
- Antihistaminique (uniquement si prurit).
- Traitement de seconde ligne en milieu hospitalier (si échec du traitement bien conduit ou surinfection grave) :
 - photothérapie ;
 - ciclosporine.

Eczéma de contact

Diagnostic positif

- Il s'agit d'un eczéma aigu se développant au contact d'un produit.
- Le délai d'apparition est de 24 à 48 heures après une première exposition.
- Bords plus émiettés.
- Tests épicutanés positifs.

Allergènes incriminés

- Allergènes professionnels.
- Cosmétiques.
- Médicaments topiques ou pansements.
- Produits vestimentaires.
- Photoallergènes.

Traitement

- Traitement local par dermocorticoïdes à forte dose pendant 1 à 2 semaines.
- Éviction de l'allergène si possible. Sinon protection vestimentaire pour éviter le contact.
- Remettre une liste d'allergène.