


1.2. Le syndrome hémorragique

⇒ Trouble de l'hémostase primaire (formation du clou plaquettaire)

- Hémorragies cutanéomuqueuses :
 - Epistaxis
 - Gingivorragies
 - Bulles hémorragiques intrabuccales
 - Purpura dit thrombopénique : non infiltré et disséminé
 - Ecchymoses
 - Ménorragies et métrorragies
 - Hémorragie sous-conjonctivale
- Saignements longs aux coupures
- Bulle hémorragique intrabuccale



⇒ Trouble de l'hémostase secondaire (coagulation plasmatique)

- Hématomes profonds (avec en particulier l'hématome du psoas)
- Hématurie
- Hémarthrose

⇒ Signes pouvant être rencontrés aussi bien devant un trouble de l'hémostase primaire que secondaire

- Hémorragies provoquées (intervention chirurgicale, chute d'escarre)
- Hémorragies intracrâniennes
- Autres hémorragies extériorisées : hématurie, rectorragie, hémoptysie

1.3. Le syndrome infectieux

⇒ Généralités

- Atteinte des polynucléaires neutrophiles :
 - Infections essentiellement bactériennes (cocci Gram positif et bacille Gram négatif), aiguës et engageant rapidement le pronostic vital
 - Plus la neutropénie est profonde, plus le risque infectieux est important. Il commence en dessous de 500 PNN/mm³ et devient majeur en dessous de 200 PNN/mm³
 - Après 8 à 10 jours de neutropénie, il existe un risque important d'infection fongique
- Atteinte des lymphocytes B = immunodépression humorale :
 - Infections récurrentes, entre autres à germes encapsulés (pneumocoques, *Haemophilus*, méningocoque), à type de sinusite, pneumopathie, diarrhée infectieuse
 - Récurrences virales (surtout VZV et HSV)
 - Infections opportunistes (pneumocystose, toxoplasmose, candidose, aspergillose)

- Atteinte des lymphocytes T = immunodépression cellulaire :
 - Récurrences virales (surtout VZV et HSV)
 - Infections à germes intracellulaires
 - Infections opportunistes (pneumocystose, toxoplasmose, candidose, aspergillose)

➤ Signes généraux

- Fièvre
- Syndrome pseudo-grippal : asthénie, frissons, sensation de froid, céphalées, myalgies, arthralgies

➤ Tolérance

- Constantes vitales : TA, FC, saturation, FR, dextro
- Signes de choc septique, choc septique
- Signes de vasoconstriction périphérique : marbrures, froideur et cyanose des extrémités
- Il faut rechercher un purpura :
 - *Purpura fulminans* méningococcique ou pneumococcique
 - Purpura dans le cadre d'un sepsis avec CIVD (non lié au méningocoque ou au pneumocoque : on ne parle donc pas de « *purpura fulminans* »). Cela reste néanmoins un signe de gravité

➤ Rechercher un point d'appel infectieux

- Urinaire :
 - Signes fonctionnels urinaires
 - Bandelette urinaire positive
 - Douleur lombaire spontanée et/ou à la percussion
- ORL :
 - Douleur pharyngée ou sinusienne
 - Odynophagie
 - Rhinorrhée, pharynx érythémateux
 - Ecoulement purulent auriculaire
- Pneumologique :
 - Toux
 - Expectoration
 - Douleur thoracique
 - Foyer auscultatoire
- Digestif :
 - Douleur abdominale
 - Diarrhée
 - Vomissements
 - Douleur à la palpation abdominale
 - Syndrome d'irritation péritonéale

2. LE SYNDROME TUMORAL

➤ Généralités


- Il est décrit sur un schéma daté et signé
- Le syndrome tumoral clinique peut être divisé en :
 - Adénopathies
 - Syndrome tumoral médiastinal
 - Hépatomégalie
 - Splénomégalie
 - Syndrome tumoral ORL
 - Syndrome tumoral neurologique

- Syndrome tumoral ophtalmologique
- Syndrome tumoral testiculaire
- Syndrome tumoral cutané

➤ Adénopathies

Les adénopathies sont le plus souvent :

- Indolores
- Fermes
- Non inflammatoires
- Non compressives
- Il faut caractériser l'ensemble des adénopathies :
 - Nombre
 - Taille
 - Localisation :
 - › Aires cervicales :
 - Aires sous-mentales
 - Aires sous-maxillaires
 - Aires rétro-mandibulaires
 - Aires jugulo-carotidiennes
 - Aires spinales
 - Aires occipitales
 - Aires mastoïdiennes
 - Aires prétragiennes



- › Aires axillaires :
 - Aires sus-claviculaires
 - Aires sous-claviculaires
 - Aires axillaires centrales
 - Aires axillaires externes
 - Aires axillaires sous-scapulaires
 - Aires axillaires pectorales
- › Aires épi-trochléennes (au niveau de la trochlée, partie de l'articulation du coude)
- › Membre inférieur :
 - Aires inguinales
 - Aires rétro-crurales
- Aires poplitées :
 - Autres caractérisations :
 - › Forme
 - › Consistance
 - › Rénitente ou non