(a)

Biomass-adjusted (A × F × C + B)

Trait	Amount (A)	Frequency (F)	Composition (C)	Biomass (B)	A × F	A × C	F × C
N			7.1%	18.4%			11.1%
H	22.5%		10.9%	6.4%			
TB				7.9%			8.0%
R/S	5.4%	4.6%		23.9%			
SLA	10.3%		6.7%				
LDMC	5.8%		8.4%				8.1%
LNC	27.3%	15.5%			9.9%		
Leaf C:N	16.9%	11.3%					
Chl	17.1%				5.4%		
Ψosm							8.2%
SS	39.8%					4.6%	
SD	6.5%						
RDMC	28.5%	4.6%	11.2%				
SRL		7.9%					
RTD	16.6%		5.8%				7.2%
RNC		5.8%	9.7%				
Root C:N			11.9%				

(b)

Density-adjusted (A × F × C + D)

Trait	Amount (A)	Frequency (F)	Composition (C)	Density (D)	A × F	A × C	F × C
N	33.9%		3.4%			3.7%	7.9%
H	25.5%		7.3%				
TB	8.3%	6.1%					
R/S	12.1%				5.9%		
SLA	20.5%						
LDMC	8.9%						8.5%
LNC	50.4%	11.5%			6.3%		
Leaf C:N	32.3%	9.1%					
Chl	55.6%				4.3%		
PSIIeff	9.4%						
Ψosm	13.5%						5.9%
SS	71.1%					2.5%	
SD	21.8%						

(c)

Fully adjusted (A × F × C + B + D)

Trait	Amount (A)	Frequency (F)	Composition (C)	Biomass	Density	A × F	A × C	F × C
N				19.5%				11.4%
H	24.0%		10.5%	6.6%				
TB				7.4%				7.0%
R/S	4.9%	4.7%		23.9%				
SLA	11.0%							
LDMC	6.4%		5.8%					7.9%
LNC	27.8%	14.9%				10.0%		
Leaf C:N	17.3%	10.9%						
Chl	15.6%					5.3%		
Ψosm								7.5%
SS	40.0%						4.9%	
SD	7.7%							
RD	5.9%		8.1%		9.2%			
RDMC	29.4%	5.1%						
SRL		7.0%			7.4%			
RTD	16.7%							7.5%

(d)

Biomass substitution (A × F × B)

Trait	Frequency (F)	Biomass (B)	A × F	A × B	F × B	A × F × B
N		8.2%				
SD	6.5%	4.8%	8.8%	4.0%	9.5%	6.4%

Trait	Amount (A)	Frequency (F)	Composition (C)	Density (D)	A × F	A × C	F × C
RD	11.6%		7.2%	8.6%			
RDMC	46.2%	8.8%					
SRL		8.6%		7.2%			
SRA		9.2%					
RTD	29.5%	6.1%					5.6%
RNC	12.9%	11.8%					
Root C:N	9.5%						

Contribution to model-explained variance (%)

0 25 50 75 100