

ДГМУ 2026

Акушерство и гинекология

Акушерство ЛФ by students от 20.06.26

#1

Меры, которые необходимо предпринять при неявке беременной на приём к врачу в назначенный день:

посещение на дому патронажной акушеркой в ближайшие дни

посещение на дому патронажной акушеркой в ближайшие недели

ждать посещения беременной

пригласить на приём через почту

сообщить в полицию

#2

Роль смотровых гинекологических кабинетов поликлиник состоит, как правило:

в диспансеризации гинекологических больных

в обследовании и наблюдении беременных женщин

в проведении периодических медицинских осмотров

в патронаже беременных

в патронаже родильниц

#3

Первое прикладывание к груди матери здоровых новорожденных проводится обычно:

сразу после рождения

через 6 часов после рождения

через 8 часов после рождения

через 12 часов после рождения

через 30 мин после рождения

#4

Основным критерием живорождения является:

масса плода 1000 г и более

рост плода 35 см и более

наличие сердцебиения

наличие самостоятельного дыхания

срок беременности 28 недель и более

#5

Перинатальная смертность - это

смерть плода, начиная с 28-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 12-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 22-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 22-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 3 дней после рождения

смерть плода, начиная с 24-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

#6

Материнская смертность - это

смерть женщины во время беременности, в родах или в течение 7 дней после родов

смерть женщины начиная с 22 недели беременности и в родах

смерть женщины во время беременности, родов или в течение 42 дней после окончания беременности

смерть женщины начиная с 22 недели беременности, в родах или в течение 42 дней после окончания беременности

смерть женщины начиная с 37 недели беременности, в родах или в течение 42 дней после окончания беременности

#7

Минимальный интервал между родами, несоблюдение которого увеличивает материнскую и перинатальную смертность в 2 раза:

5 лет

4 года

3 года

1 год

6 лет