

Классификация профессиональных вредностей по природе:

{  
~%33.33333%физические  
~%33.33333%биологические  
~%33.33333%антропогенные  
~%-100%естественные  
}

Профессиональная болезнь: {

=болезни, которые не могут возникнуть без проф- вредностей  
~заболевание пожилого и старческого возраста  
~болезни, возникающие с возрастными изменениями  
~болезни, развивающиеся при большом стаже работы  
}

Профессиональные болезни развиваются: {

=при воздействии проф- вредностей превышающих гигиенические нормативы  
~при наличии в организме других заболеваний  
~при воздействии профессиональных экофакторов малой интенсивности  
~при воздействии факторов в пределах гигиенических нормативов  
}

Опасность профессиональной болезни зависит от: {

~%50%интенсивности профессиональной вредности  
~%50%состояния организма  
~%-50%возраста  
~%-50%ни от чего не зависит  
}

Острые профессиональные отравления развиваются: {

=при кратковременном воздействии высоких концентраций яда  
~при длительном воздействии токсикантов малой интенсивности  
~при кратковременном воздействии гигиенических нормативов токсиканта  
~при продолжительном воздействии высоких концентраций токсиканта  
}

Сан- технические средства защиты: {

=вентиляция  
~респиратор  
~противогаз  
~периодические медицинские осмотры  
}

Защита от профессиональных вредностей с помощью: {

~%33.33333%совершенствования технологии  
~%33.33333%робототехники  
~%33.33333%замены опасных элементов технологии на неопасные или менее опасные  
~%-50%психотерапии  
~%-50%замены пластмассовых элементов технологии на металлические  
}

Индивидуальные средства предназначены для защиты от профессиональных ядов: {

=одного рабочего  
~рабочих одного производственного участка  
~рабочих смежных участков  
~не могут защитить никого  
}

Предварительные медицинские осмотры целью оценить

здоровье рабочего: {  
=поступлением на работу  
~перед увольнением  
}

~при стаже работы 10-12 месяцев  
~перед очередным профсоюзным отпуском  
~перед направлением в профилакторий  
}

Площадь на основное стоматологическое кресло: {

=14 м<sup>2</sup>  
~7м<sup>2</sup>  
~10м<sup>2</sup>  
~15м<sup>2</sup>  
~15м<sup>2</sup>  
}

Периодические осмотры в условиях воздействия профессиональных вредностей имеют целью: {

~%50%ранней диагностики общих неспецифических заболеваний  
~%50%диагностики профессиональных болезней  
~%-33.33333%определение группы инвалидности по причине общей болезни  
~%-33.33333%выбора санаторно - курортного лечения  
~%-33.33333%диагностики профессиональных отравлений  
}

Профессиональные экологические факторы влияют на

эффективность фармакотерапии: {  
~%50%уменьшают из-за нарушения фармакокинетики  
~%50%снижают эффективность из-за иммунодепрессивного действия  
~%-50%повышают эффективность из-за оптимизации  
~%-50%не могут влиять фармакокинетики  
}

Патогенетическая профилактика профессиональных отравлений: {

=элиминационная терапия  
~профилактическая фармакотерапия болезней сердечно - сосудистой системы.  
~лечение заболеваний органов мочевой системы  
~симптоматическая терапия  
}

Дополнительное питание при работе с профессиональными вредностями назначается для: {

=компенсации энергетических затрат и уменьшения опасности проф - вредностей  
~увеличение массы тела  
~стимуляции функции желудочно - кишечного тракта  
~оптимизации функции печени  
}

Специфические признаки профессиональных болезней: {

=признаки присущие только конкретной профессиональной болезни  
~общие признаки профессиональных и не профессиональных заболеваний  
~нарушение функции эндокринной системы  
~нарушения, возникающие в скелете при дефиците фтора  
}

Специфические изменения в периферической крови при отравлении свинцом: {

~%50%увеличение количества эритроцитов с базофильной зернистостью  
~%50%альбуминат свинца  
~%-50%увеличение количества эритроцитов и тромбоцитов  
~%-50%ретикулоцитоз  
}

Высота стоматологических кабинетов не менее: {

=3 м  
~6 м  
}

~4 м  
~7 м  
~3,9 м  
}

Световой коэффициент стоматологического кабинета: {  
~%50%1:4  
~%50%1:5  
~%-33.33333%1:8  
~%-33.33333%1:6  
~%-33.33333%1:10  
}

Специфические клинические признаки отравления ртутью: {  
~%20%тремор пальцев рук, губ, языка, век  
~%20%тремор судороги пальцев ног  
~%20%изменение цвета кожи лица  
~%20%потеря массы тела, сна  
~%20%эмоциональная лабильность  
}

Специфические признаки отравления хромом: {  
=перфорация носовой перегородки  
~уменьшение количество эритроцитов и гемоглобина  
~остеопороз  
~повышение плотности скелета  
}

Коэффициент естественной освещенности  
стоматологического кабинета: {  
~%50%1,5%  
~%50%2,5%  
~%-50%1%  
~%-50%0,5%  
}

Основные методы диагностики пылевых заболеваний органов  
дыхания: {  
~%50%рентгенологические  
~%50%функциональные  
~%-33.33333%гематологические  
~%-33.33333%иммунологические  
~%-33.33333%морфофункциональные  
}

Дефицит микроэлемента меди в рационе питания вызывает:  
{  
=задержку дифференциации эритрона  
~рост костей  
~болезни кожи  
~нарушение функции ЦНС  
}

Профессиональные вредности химической природы и их  
влияние на эффективность фармакотерапии: {  
=не влияют  
~повышают эффективность  
~снижают  
~зависит от функции почек  
}

Механизм влияния химических токсикантов на  
фармакокинетику лекарственных препаратов: {  
=нарушают из-за роста свободно циркулирующего и  
выведения из организма части фармпрепарата  
~не влияют  
~оптимизируют через комплекс с транспортными белками  
~влияние зависит от фармпрепарата  
}

Концентрация токсиканта в воздушной среде измеряется: {  
=в мг/м<sup>3</sup>

~в мл / л  
~в см<sup>3</sup> / л  
~в мг / л  
~в мг/м<sup>2</sup>  
}

Первичная профилактика это: {  
=устранение причины заболевания  
~ранняя диагностика  
~диагноз, подтвержденный лабораторно-инструментальными  
методами  
~своевременная комплексное врачебное обследование  
~устранение причины осложнения основного заболевания  
}

Вторичная профилактика: {  
~%50%перевод заболевания в ремиссию  
~%50%ранняя диагностика и своевременное эффективное  
лечение  
~%-50%профилактические мероприятия, следующие за  
первичной профилактикой  
~%-50%вторичной профилактики нет  
}

Вынужденное положение тела на работе может привести к: {  
=профессиональной болезни  
~утомлению  
~переутомлению  
~не представляет опасности для здоровья  
~не представляет опасности для здоровья  
}

Опасность профессионального заболевания зависит от: {  
~%50%состояния организма  
~%50%профвредности  
~%-33.33333%погодных условий  
~%-33.33333%возраста  
~%-33.33333%пола  
}

Острые профессиональные отравления возникают при: {  
=кратковременном воздействии высоких концентрации ядов в  
воздухе  
~при длительном воздействии высоких концентраций ядов  
~при воздействии низких концентраций ядов в воздухе  
~при заболеваниях органов пищеварения  
}

Хронические профессиональные отравления развиваются при:  
{  
=продолжительном воздействии малых концентрации ядов  
~продолжительном воздействии на организм высоких  
концентраций ядов в воздухе рабочих мест  
~хронические профессиональные отравления не развиваются  
~развиваются только при сопутствующих заболеваниях  
}

Профессиональные болезни могут развиваться медицинских  
работников: {  
~%50%инфекционистов  
~%50%хирургов  
~%-33.33333%терапевтов  
~%-33.33333%окулистов  
~%-33.33333%акушер - гинекологов  
}

Профессиональные отравления по степени тяжести делятся на:  
{  
~%50%тяжелую степень  
~%50%средней степени тяжести  
~%-50%без степени тяжести, просто диагноз  
~%-50%промежуточную стадию  
}

}

Неопределенные патофизиологические сдвиги при  
воздействии проф - вредностей могут быть использованы при: {  
=профилактике нозологий  
~выборе методов лечения  
~оценке эффективности лечения  
~прогнозировании исхода заболевания  
}

Тропность промышленных ядов влияет на: {  
=избирательное выведение накопление в органах и тканях  
~равномерное распределение яда в организме  
~ускоренное выведение из организма  
~не оказывает заметного влияние на кинетику в организме  
}

На скорость выведение промышленных ядов из организма  
влияет: {  
~%33.3333%водорастворимость яда  
~%33.3333%заболевание почек  
~%33.3333%заболевание кожи и слизистых  
~%-50%жирорастворимость яда  
~%-50%заболевание скелета  
}

Промышленные яды попадают в организм через: {  
~%25%органы дыхания  
~%25%поврежденную и не поврежденную кожу  
~%25%слизистые  
~%25%желудочно-кишечный тракт  
}

Жирорастворимые промышленные яды поражают  
преимущественно: {  
=ЦНС  
~кожу и слизистые  
~органы дыхания  
~селезенку  
}

Промышленные яды могут вызвать: {  
~%25%заболевание (нозологию)  
~%25%врожденные пороки развития  
~%25%бесплодие  
~%25%мутагенный эффект  
}

Наследственные болезни могут быть вызваны: {  
=профессиональными вредностями  
~изомерным питанием  
~ОРЗ  
~климато- географическими условиями  
}

Является ли предметом гигиены труда изучение состояния  
здоровья работающих и их заболеваемости? {  
=да  
~нет  
}

Какое средство используется для профилактики судорожной  
болезни среди рабочих горячих цехов? {  
=подсоленная газированная  
~унитиол  
~дистиллированная вода  
~карбоген  
~кислород  
}

Какие шумы относятся к среднечастотным? {

=350-800 Гц  
~16-160 Гц  
~160-250 Гц  
~260-800 Гц  
~800-1200 Гц  
}

Какие средства защиты используются в целях профилактики  
неблагоприятного влияния вибрации? {  
~%50%спецодежда  
~%50%рукавицы с двойной прокладкой  
~%-33.3333%защитная краска  
~%-33.3333%респиратор  
~%-33.3333%пневмокостюм  
}

К какой группе пневмокониозов относится пневмокониоз  
электросварщиков? {  
=от смешанной пыли  
~силикоз  
~силикатозы  
~карбокониозы  
~от органической пыли  
}

Что называется аэрацией производственных помещений? {  
=естественная управляемая вентиляция  
~приточная механическая вентиляция  
~вытяжная механическая вентиляция  
~приточно-вытяжная механическая вентиляция  
~естественная неорганизованная вентиляция  
}

Какое количество часов рабочего времени в неделю  
выделяется цеховому врачу для проведения  
профилактической работы? {  
=9 часов  
~4 часа  
~6 часов  
~7 часов  
~11 часов  
}

Является ли физиология труда составной частью гигиены  
труда? {  
=да  
~нет  
}

Какие заболевания могут возникнуть у рабочих,  
подвергающихся действию инфракрасного излучения? {  
~%50%катаракта  
~%50%тепловой удар  
~%-33.3333%силикоз  
~%-33.3333%силикатоз  
~%-33.3333%радиоволновая болезнь  
}

Может ли шум интенсивностью в 100 дБ вызвать шумовую  
травму? {  
=нет  
~да  
~да при отсутствии шлемофона  
~да при отсутствии беруши  
~нет при низком атмосферном давлении  
}

Как называется явление совпадения частоты колебательных  
движений тканей человека с частотой внешней вибрации? {  
=резонанс  
~рефракция  
~реверберация

~дифракция  
~интерференция  
}

Какое питание используется специально в целях предупреждения профессиональных заболеваний? {  
=лечебно- профилактическое  
~лечебное  
~изомерное  
~сбалансированное  
~рациональное  
}

О чем свидетельствует узость зоны острого действия вещества при оценке его токсичности? {  
=большой возможности острых отравлений  
~малой возможности острых отравлений  
~сильной выраженности компенсаторных реакций организма  
~выраженности кумулятивных свойств  
~абсолютной летучести  
}

Кем по специальности должен быть цеховой участковый врач медико-санитарной части? {  
=гигиенист  
~эпидемиолог  
~хирург  
~невропатолог  
}

Верно ли, что одной из задач физиологии труда является разработка методов лечения утомления и переутомления? {  
=нет  
~да  
~да в возрасте до 15 лет  
~да в возрасте до 15 лет для мальчиков  
~да в возрасте до 17 лет для девочек  
}

Какие из лучей способны проникать через черепную коробку и воздействовать на мозговые оболочки? {  
=инфракрасные короткие  
~ультрафиолетовые короткие  
~инфракрасные длинные  
~ультрафиолетовые средние  
~ультрафиолетовые длинные  
}

Укажите специфические изменения, происходящие в организме под влиянием шума? {  
~%50%утомление слуха  
~%50%тугоухость  
~%-33.33333%головная боль  
~%-33.33333%головное головокружение  
~%-33.33333%ослабление памяти  
}

Какое вещество может быть причиной возникновения литейной лихорадки у рабочих? {  
=цинк  
~свинец  
~фтор  
~оксид углерода  
~сернистый газ  
}

Какое количество наружного воздуха на 1го работающего должна подавать система вентиляции в производственные помещения с объемом больше 20 3 на 1го человека? {  
=не < 20 м 3 час  
~не < 5 м 3 / час  
~не < 10 м 3 / час

~не < 15 м 3 час  
~не < 25 м 3 час  
}

Верно ли, что предметом гигиены труда является изучение трудовых процессов и вызываемых ими физиологических сдвигов в организме? {  
=да  
~нет  
}

Какой уровень интенсивности шума соответствует болевому порогу (порогу переносимости звуков)? {  
=140 дБ  
~40 дБ  
~70 дБ  
~100 дБ  
~170 дБ  
}

Укажите главные факторы, от которых в решающей степени зависит распространение вибрации в тканях организма: {  
~%33.33333%частота колебаний  
~%33.33333%место приложения вибрации  
~%33.33333%амплитуда колебаний  
~%-50%температура тканей  
~%-50%состояние организма  
}

Какие заболевания могут быть следствием напряжения отдельных органов организма при работе? {  
~%50%координаторные неврозы  
~%50%эмфизема легких  
~%-33.33333%силикоз  
~%-33.33333%хронический колит  
~%-33.33333%ботулизм  
}

К какой группе пневмокониозов относится сидероз? {  
=металлоконииозы  
~силикозы  
~карбонкониозы  
~пневмокониозы от смешанной пыли  
~пневмокониозы от смешанной пыли  
}

Создание в производственных помещениях воздушной среды с заданными параметрами называется: {  
=кондиционированием  
~рециркуляцией  
~воздушным душированием  
~аэрацией  
~инсоляцией  
}

По какому принципу осуществляется лечебно - профилактическое обслуживание промышленных рабочих медико - санитарными частями? {  
=цеховой участковости  
~краевой участковости  
~республиканской участковости  
~городской участковости  
~районной участковости  
}

Какие профессиональные вредности относятся к группе, обусловленных неправильной организацией трудового процесса? {  
~%25%статистические перегрузки  
~%25%динамические перегрузки  
~%25%вынужденное положение тела  
~%25%нервно- психические перегрузки

}

Верно ли, что положение сидя при работе с гигиенической точки зрения менее благоприятно, чем положение стоя? {  
=нет  
~да  
~да, если этот школьники начальных классов  
~да, для учащихся старших классов  
~да, для лиц преклонного возраста  
}

Подчеркните единицы измерения громкости звуков {  
~%50%фоны  
~%50%сонны  
~%-33.33333%белы  
~%-33.33333%децибелы  
~%-33.33333%герцы  
}

Как называется сочетание пневмокониоза с туберкулезом? {  
=кониотуберкулез  
~ателектаз  
~пневмофиброз  
~легочной гранулематоз  
~туберкулема  
}

Для марганцевого паркинсонизма наиболее характерны: {  
~%33.33333%насищенный смех  
~%33.33333%изменение походки  
~%33.33333%нарушение равновесия  
~%-50%снижение остроты слуха  
~%-50%кровотечения из носа и десен  
}

Какие условия согласно ГОСТу 20445-75 необходимо выполнять для правильного измерения уровней шума на рабочих местах в помещениях промышленных предприятий? {  
~%33.33333%измерить шум не менее чем в трех точках  
~%33.33333%микрофон шумомера направить в сторону источника шума  
~%33.33333%микрофон шумомера расположить на высоте 1,5 м от пола  
~%-100%отключить систему вентиляции помещения на время измерения  
}

Врачебные здравпункты организуются на промышленных предприятиях с числом работающих не менее: {  
=1000 человек  
~500 человек  
~700 человек  
~800 человек  
~900 человек  
}

Какие заболевание могут быть следствием вынужденного положения тела при работе? {  
~%33.33333%плоскостопие  
~%33.33333%варикозное расширение вен нижних конечностей  
~%33.33333%геморрой  
~%-50%писчий спазм  
~%-50%эмфизема легких  
}

Верно ли, что кондукция - это теплопроводение путем соприкосновения тела человека с окружающим его воздухом? {  
=да  
~нет  
}

}

Укажите неспецифические изменения, происходящие в организме под влиянием шума {  
~%33.33333%нарушение сна  
~%33.33333%снижение внимания  
~%33.33333%изменение частоты пульса  
~%-50%утомление слуха  
~%-50%тугоухость  
}

Какие различают вибрации по способу передачи человеку? {  
=общие, местные  
~горизонтальные, вертикальные  
~постоянные, непостоянные  
~периодические, аperiodические  
~среднечастотные, высокочастотные  
}

ПДК оксида углерода в воздухе рабочей зоны? {  
=20 мг/м<sup>3</sup>  
~0,07 мг/м<sup>3</sup>  
~0,1 мг/м<sup>3</sup>  
~0,2 мг/м<sup>3</sup>  
~2 мг/м<sup>3</sup>  
}

Как классифицируется производственная вентиляция по месту действия? {  
~%50%местная  
~%50%общая  
~%-33.33333%приточная  
~%-33.33333%вытяжная  
~%-33.33333%механическая  
}

Как часто цеховые участковые врачи МСЧ предприятий должны проводить анализ заболеваемости с ВУТ рабочих? {  
=1 раз в месяц  
~1 раз в два месяца  
~1 раз в квартал  
~1 раз в полугодие  
~1 раз в год  
}

Верно ли слуховой анализатор человека воспринимает звуковые колебания с частотой от 16 Гц до 20000 Гц? {  
=да  
~нет  
}

Наибольшей фиброгенной активностью обладает пыль размерами {  
=8-10 мкм  
~больше 10 мкм  
~6-7 мкм  
~0,3-5 мкм  
~меньше 0,25 мкм  
}

Какой из рационов лечебно - профилактического питания способствует выделению из организма депонированного свинца? {  
=рацион № 3  
~рацион № 1  
~рацион № 2  
~рацион № 4  
~рацион № 5  
}

О чем свидетельствует широкая зона хронического действия вещества при оценке его токсичности? {

~%33.33333%выраженной возможности хронических интоксикаций  
~%33.33333%выраженности кумулятивных свойств  
~%33.33333%выраженности компенсаторных реакций организма  
~%-50%слабой возможности хронических интоксикаций  
~%-50%слабой выраженности кумулятивных свойств  
}

Как классифицируется производственная вентиляция по способу перемещения воздуха? {  
~%50%естественная  
~%50%механическая  
~%-33.33333%приточная  
~%-33.33333%вытяжная  
~%-33.33333%приточно - вытяжная  
}

Специфическим проявлением влияния производственных вредностей являются: {  
=профессиональные заболевания  
~эндокринные заболевания  
~алиментарные заболевания  
~эндемические заболевания  
~пищевые отравления  
}

Верно ли, что при температуре внешней производственной сред выше температуры тела единственно возможный путь теплоотдачи - это теплоиспарение? {  
=да  
~нет  
}

Укажите относительные единицы измерения интенсивности (силы) звука, шума {  
~%50%бел  
~%50%децибел  
~%-33.33333%герц  
~%-33.33333%фон  
~%-33.33333%сон  
}

Верно ли, что положительными электрическими зарядами характеризуется неметаллическая пыль и кислотные окислы? {  
=да  
~нет  
}

В каких органах и тканях организма, как правило, депонируется свинец? {  
~%33.33333%кости  
~%33.33333%нервы  
~%33.33333%почки  
~%-50%мышцы  
~%-50%печень  
}

Как классифицируется производственная вентиляция по назначению? {  
~%33.33333%приточно- вытяжная  
~%33.33333%вытяжная  
~%33.33333%общая  
~%-50%искусственная  
~%-50%приточная  
}

Верно ли, что в возникновении профессиональной тугоухости наибольшее значение имеют высокочастотные звуковые колебания по сравнению с низкочастотными? {  
=да

~нет  
}

Можно ли при механическом измельчении твердых веществ образовываться аэрозоль конденсации? {  
=нет  
~да  
~да при высокой температуре  
~да при работающей вытяжной вентиляции  
~да при отсутствии вентиляции  
}

Форма пылевых частиц оказывает влияние на {  
~%50%скорость оседания пыли из воздуха  
~%50%глубину проникновения пыли в дыхательные пути  
~%-33.33333%электростатическая заряженность пыли  
~%-33.33333%растворимость пыли  
~%-33.33333%дисперсность пыли  
}

ПДК марганца в воздухе рабочей зоны составляет {  
=0,3 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,12 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,2 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,4 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,5 мг/ м<sup>3</sup>  
}

Что входит состав современной медико - санитарной части, обслуживающей промышленных рабочих? {  
~%50%поликлиника  
~%50%фельдшерский здравпункт  
~%-33.33333%стационар с отделениями различного профиля  
~%-33.33333%врачебный здравпункт  
~%-33.33333%профилакторий  
}

Может ли шум называться постоянным, если уровни его во времени измеряются от 5 до 10 дБ? {  
=нет  
~да  
~да если изменения наступают в течение 2 часов  
~да если изменения наступают в течение 30 минут  
~да если изменения наступают в течение 3 часов  
}

Верно ли, что электростатически заряженная пыль задерживается в дыхательных путях больше, чем нейтральная {  
=да  
~нет  
}

Как классифицируется пыль по механизму образования? {  
=аэрозоль дезинтеграции, аэрозоль конденсации  
~органическая, неорганическая, смешанная  
~видимая, микроскопическая, ультрамикроскопическая  
~электростатически заряженная, нейтральная  
~растворимая, нерастворимая  
}

Какие из мероприятий по предупреждению профессиональных отравлений относятся к лечебно - профилактическим? {  
~%50%предварительные медосмотры рабочих  
~%50%периодические медосмотры рабочих  
~%-33.33333%гигиеническое нормирование  
~%-33.33333%замена ядовитого вещества менее ядовитым  
~%-33.33333%вентиляция рабочих помещений  
}

ПДК свинца в воздухе рабочей зоны? {  
=0,01 мг/ м<sup>3</sup>

~0,1 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,05 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,5 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,15 мг/ м<sup>3</sup>  
}

Укажите приборы для отбора проб воздуха на запыленность?

{  
~%50%эжекторный аспиратор  
~%50%электрический аспиратор  
~%33.33333%аспирационный психрометр  
~%33.33333%актинометр  
~%33.33333%крыльчатый анемометр  
}

Какое количество наружного воздуха на одного работающего должна подавать система вентиляции в производственные помещения с объемом меньше 20 м<sup>3</sup> на одного человека? {

=не менее 30 м<sup>3</sup> / час  
~не менее 10 м<sup>3</sup> / час  
~не менее 15 м<sup>3</sup> / час  
~не менее 20 м<sup>3</sup> / час  
~не менее 25 м<sup>3</sup> / час  
}

Верно ли, что пыль металлов и основных окислов заряжена электроотрицательно? {

=да  
~нет  
}

ПДК паров металлической ртути в воздухе рабочей зоны составляет: {

=0,01 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,05мг/ м<sup>3</sup>  
~0,1 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,2 мг/ м<sup>3</sup>  
~0,3 мг/ м<sup>3</sup>  
}

Какие вещества могут вызвать прободение носовой перегородки у рабочих при длительном воздействии? {

~%50%хром  
~%50%бензол  
~%33.33333%оксид углерода  
~%33.33333%ртуть  
~%33.33333%никель  
}

При вибрационной болезни наиболее резко нарушается чувствительность {

=вибрационная  
~болевая  
~тактильная  
~температурная  
}

Наиболее выраженное воздействие на организм при одинаковых уровнях громкости оказывает: {

=высоочастотный шум  
~низкочастотный шум  
~среднечастотный шум  
~низкочастотный постоянный шум  
~среднечастотный переменный шум  
}

Какая организация составляет и выдает санитарно - гигиеническую характеристику условий труда работающего? {

=центр государственного санэпиднадзора  
~фельдшерский здравпункт  
~врачебный здравпункт

~медико- санитарная часть  
~врачебно - трудовая экспертная комиссия  
}

В профилактике вибрационной патологии наибольшее значение имеют {

=технические мероприятия  
~средства индивидуальной защиты  
~предварительные медицинские осмотры  
~рациональный режим труда и отдыха  
~периодические медицинские осмотры  
}

Укажите абсолютные единицы измерения интенсивности (силы) звука, шума {

=децибел  
~фон  
~сон  
~люкс  
~ватт/ см<sup>2</sup>  
}

Координаторные невроты является следствием влияния: {

=перенапряжения отдельных органов и систем при работе  
~шума  
~ионизирующей радиации  
~общей вибрации  
~неблагоприятного климата  
}

Может ли охлаждающий микроклимат привести к возникновению судорожной болезни у рабочих? {

=нет  
~да  
}

Назовите заболевания, относящиеся к силикозам: {

~%25%талкоз  
~%25%каолиноз  
~%25%асбестоз  
~%25%цементоз  
}

Какое количество лабораторных животных необходимо для изучения каждой испытуемой дозы вещества при определении средних смертельных доз? {

=не менее шести  
~не менее четырех  
~не менее пяти  
~не менее семи  
~не менее десяти  
}

Утомление - это: {

=физиологический процесс  
~острое заболевание  
~хроническое заболевание  
~патологическое состояние  
}

Биссиноз вызывает пыль: {

~%50%хлопка  
~%50%льна  
~%33.33333%табака  
~%33.33333%талька  
~%33.33333%каменного угля  
}

Багассоз вызывает пыль: {

=сахарного тростника  
~талька  
~цемента

~железа  
~кремния  
}

Постоянным называют шум, уровень которого измеряется во времени не более чем: {

=5 дБ  
~2 дБ  
~3 дБ  
~7дБ  
~10 дБ  
}

Укажите эффекты комбинированного действия химических веществ на организм: {

~%50%антагонизм  
~%50%синергизм  
~%-33.33333%кумуляция  
~%-33.33333%адаптация  
~%-33.33333%ассимиляция  
}

Единицей измерения громкости звуков является: {

=фон  
~ватт / см  
~герц  
~бел  
~джоуль  
}

Время, затраченное на угасания звука называется: {

=реверберацией  
~рефракцией  
~резонансом  
~конвергенцией  
~амплитудой  
}

Акустические колебания частотой свыше 20000Гц называются: {

=ультразвуком  
~инфразвуком  
~резонансом  
~порогом слышимости  
~болевым порогом  
}

Суммирование токсичного эффекта ядов, действующих на организм, называют: {

=аддитивным действием  
~синергизмом  
~антагонизмом  
~независимым действием  
~комплексным действием  
}

Укажите причину судорожной болезни у рабочих горячих цехов: {

=большая потеря воды и соли с потом  
~низкая температура окружающей среды  
~низкая влажность окружающей среды  
~высокая скорость движение воздуха  
~хронический дефицит белков и питания  
}

Максимальное отклонение тела от положения устойчивого равновесия называется {

=амплитудой колебания  
~частотой колебания  
~периодом колебания  
~временем колебания  
~атаксией  
}

}

Весь диапазон громкостей, воспринимаемых человеком как звук укладывается в {

=0-140 дБ  
~0-40 дБ  
~0-60 дБ  
~0-80 дБ  
~0-100 дБ  
}

Как называются акустические колебания с частотой менее 16 Гц {

=инфразвук  
~ультразвук  
~шум  
~звук  
~болевого порог  
}

Эффект потенцирования токсичности одного вещества действием другого вещества называется {

=синергизмом  
~суммацией  
~антагонизмом  
~независимым действием  
~комплексным действием  
}

Какой рацион лечебно- профилактического питания применяются при работах с радионуклидами и источниками ионизирующих излучений {

=рацион № 1  
~рацион № 2  
~рацион № 3  
~рацион № 4  
~рацион № 5  
}

Какой рацион лечебно - профилактического питания применяется при работах с органическими и неорганическими соединениями свинца {

=рацион № 3  
~рацион № 5  
~рацион № 2  
~рацион № 1  
~рацион № 4  
}

Изменение наследственных свойств организма под воздействием химических веществ, проявляющихся у его потомства, называется {

=мутagenным действием  
~терратогенным действием  
~бластомогенным действием  
~канцерогенным действием  
~эмбриотоксическим действием  
}

Одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления называют {

=комбинированным действием  
~сочетанным действием  
~комплексным действием  
~комплексно - сочетанным действием  
~сочетано - комбинированным действием  
}

Укажите участок тела рабочего, подвергающегося воздействию локальной вибрации, на котором, как правило

проводится диагностическое капилляроскопическое исследование: {  
~около ногтевое ложе 4-го пальца левой руки  
~глазное дно  
~ладонная поверхность 2-го пальца правой руки  
~тыльная поверхность 2-го пальца левой руки  
~около ногтевое ложе 5-го пальца правой руки  
}

Концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при ингаляционном воздействии называется {  
~средней смертельной концентрацией  
~средней смертельной дозой  
~коэффициентом возможности ингаляционного отравления  
~зоной острого действия  
~зоной хронического действия  
}

Пневмокониоз, возникающий от вдыхания пыли минералов, содержащих двуокись кремния в связанном состоянии, называют {  
~силикатозом  
~силикозом  
~багассозом  
~биссинозом  
~карбокониозом  
}

Фиброз легких, вызванным вдыханием пыли свободной двуокиси кремния, называется {  
~силикозом  
~асбестозом  
~оливинозом  
~силикатозом  
~сидерозом  
}

Отдача тепла предметам, непосредственно соприкасающимися с поверхностью тела называется {  
~кондукцией  
~конвекцией  
~теплоиспарением  
~теплоизлучением  
~инверсией  
}

Как классифицируют пыль по механизму образования? {  
~аэрозоли дезинтеграции и конденсации  
~органическая, неорганическая  
~естественная искусственная  
~микроскопическая, видимая  
~электрозаряженная, нейтральная  
}

Какие свойства промышленных ядов определяют их способность проникать в организм через неповрежденную кожу? {  
~%50%малая летучесть  
~%50%хорошая растворимость в жирах  
~%-33.33333%высокая летучесть  
~%-33.33333%низкая растворимость в жирах  
~%-33.33333%удельный вес  
}

Укажите характерные диагностические признаки меркуриализма {  
~%50%тремор пальцев вытянутых рук  
~%50%синевато - фиолетовая кайма по краю десен  
~%-33.33333%лиловато - серая кайма по краю десен  
~%-33.33333%эритроциты с базофильной зернистостью  
~%-33.33333%маскообразность лица  
}

Укажите характерные диагностические признаки сатурнизма {  
~%50%лиловато - серая кайма по краю десен  
~%50%эритроциты с базофильной зернистостью  
~%-33.33333%синдром паркинсонизма  
~%-33.33333%нарушение болевой и тактильной чувствительности  
~%-33.33333%синевато - фиолетовая кайма по краю десен  
}

Как классифицируется шум по происхождению? {  
~механический, аэродинамический, гидродинамический  
~низко - средне и высокочастотный  
~широкополосный, непостоянный  
~импульсный, прерывистый  
}

Укажите источники общей вибрации {  
~виброплатформы, вибростенды, прессы  
~рубильные и отбойные молотки  
~перфораторы и пневмотрамбовки  
~электро - и бензомоторные пилы  
~шлифовальные и сверлильные машины  
}

Влияние хронических заболеваний верхних дыхательных путей на поведение аэрозолей в органах дыхания: {  
~%50%увеличивается количество аэрозолей, задерживающихся в органах дыхания  
~%50%увеличивают опасность пылевых частиц любых размеров  
~%-33.33333%не влияет на кинетику аэрозолей в органах дыхания  
~%-33.33333%влияют только на крупнодисперсные пылевые частицы  
~%-33.33333%увеличивают опасность пылевых частиц только средних размеров  
}

Пылевые частицы делятся на: {  
~%33.33333%растворимые  
~%33.33333%нерастворимые  
~%33.33333%слаборастворимые  
~%-100%нет деления пылевых частиц по растворимости  
}

Из перечисленных признаков в крови свинцовой интоксикации специфичны: {  
~%33.33333%базофильная зернистость эритроцитов  
~%33.33333%альбуминат свинца  
~%33.33333%гематопорфирины  
~%-100%лейкоцитоз  
}

Специфические признаки поступления свинца в организм по анализу мочи: {  
~%50%повышенное количество уропорфирина  
~%50%увеличение количества свинца в моче  
~%-50%рост количества лейкоцитов в моче  
~%-50%эритроциты в моче  
}

Патогенетическая профилактика отравления свинцом, другими тяжелыми металлами и попавшими в организм радионуклидами: {  
~%33.33333%элиминационная терапия комплексонами  
~%33.33333%повышенная энергетическая ценность рациона питания  
~%33.33333%обогащенный пектинами рацион питания  
~%-100%2-х кратное повышение количества потребляемой воды  
}

}

Ранние признаки интоксикации ртутью: {  
~%50%тремор пальцев вытянутых рук  
~%50%тремор губ, век, языка  
~%50%расстройство ЖКТ  
~%50%незаживающие язвы слизистых и кожи  
}

Первичная профилактика: {  
=устранение причины заболевания  
~лечение на ранних стадиях заболевания  
~лечение сопутствующих заболеваний  
~использование современных лабораторно-инструментальных методов диагностики  
}

Вторичная профилактика: {  
~%50%ранняя диагностика и адекватное лечение  
~%50%эффективное лечение  
~%50%самолечение без консультации врача  
~%50%высокая точность диагноза  
}

Дисперсность аэрозолей измеряется: {  
=мг/куб.см  
~в см  
~мм  
~в мг  
}

Концентрация проф. ядов в воздушной среде измеряется: {  
=мг./куб. метр  
~мл/куб. метр.  
~см. куб / куб. метр.  
~см./куб. метр.  
}

Из попавших в органы дыхания аэрозолей в легких здорового человека остается: {  
=25,0%  
~100%  
~75,0%  
~50,0%  
~10,0%  
}

Для определения нагрузки проф. ядов на организм необходимо знать {  
=концентрацию яда  
~массу тела  
~ЖЕЛ  
~нельзя определить  
~условия производственного микроклимата  
}

Через неповрежденную кожу в организм могут проникнуть яды {  
=жирорастворимые  
~водорастворимые  
~в виде тумана  
~через неповрежденную кожу не могут попасть в организм никакие яды  
}

Кинетика профессиональных ядов это: {  
=пути попадания, распределение и выведение из организма  
~технология их (ядов) образования  
~концентрация в воздушной среде  
~влияние на поведение ядов в организме возраста и пола  
~образование метаболитов токсикантов  
}

Аддитивное действие экологических факторов {  
=суммация биологического действия 2-х или нескольких экологических факторов  
~патогенное действие  
~укрепляющее здоровье действие  
~уменьшение повреждающего действия одного из факторов при воздействии 2-х факторов  
~суммация массы воздействующих факторов  
}

Комбинированное воздействие экологических факторов {  
=воздействие факторов сходной природы  
~одновременное воздействие нескольких факторов разной природы  
~воздействие одного и того же фактора разными путями  
~воздействие двух и больше факторов, уменьшающих патогенное действие друг друга  
}

Сочетанное действие экологических факторов {  
=воздействие факторов разной природы  
~воздействие факторов одинаковой природы  
~воздействие факторов через органы дыхания  
~сочетанное действие факторов не существует в реальной жизни  
~периодическое воздействие одинаковых факторов  
}

Потенцирование действия экологических факторов, в том числе и лекарственных препаратов {  
=совместное действие нескольких факторов превосходит сумму эффектов каждого фактора  
~снижение биологических эффектов при воздействии нескольких факторов  
~повреждающие эффекты такие же, как при воздействии каждого фактора (лекарства) в отдельности  
~опасность для здоровья такая же, как при воздействии наиболее опасного из них  
~отсутствие эффекта от воздействия  
}

Ингибирующий эффект: {  
~%50%один лекарственный препарат или проф. яд уменьшает эффект другого  
~%50%биологический эффект, ниже, чем ожидаемый от раздельного воздействия факторов (лекарственных препаратов)  
~%50%при одновременном воздействии нескольких факторов (лек.препаратов) усиливается биологический эффект одного из факторов  
~%50%ингибирующий эффект в промышленной токсикологии и фармакотерапии исключается  
}

Поведение аэрозольных частиц в альвеолах: {  
~%50%мигрируют через межальвеолярные перегородки  
~%50%фагоцитируются альвеолярными макрофагами  
~%33.3333%удаляются через дыхательные пути  
~%33.3333%растворяются  
~%33.3333%накапливаются в альвеолах  
}

Какие аэрозоли по химическому составу опаснее для здоровья? {  
~%50%содержащие двуокись кремния в свободном виде  
~%50%содержащие двуокись кремния в связанном виде  
~%33.3333%органические  
~%33.3333%смешанные  
~%33.3333%металлсодержащие  
}

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Органические аэрозоли вызывают: {<br>=аллергии<br>~силикатозы<br>~заболевания ЖКТ<br>~заболевания периферических нервов<br>~заболевания печени<br>}                                                                                                                                                                                                                         | ПДК фенола в воздухе рабочей зоны (мг/м куб.) {<br>=0,3 мг/м куб.<br>~0,1 мг/м куб.<br>~0,2 мг/м куб.<br>~0,4 мг/м куб.<br>~0,5 мг/м куб.<br>}                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Какой дисперсности бывают аэрозоли? {<br>~%33.33333%10 мкм и больше<br>~%33.33333%5 - 10 мкм<br>~%33.33333%меньше 5 мкм<br>~%-50%30 мкм и больше<br>~%-50%20 мкм<br>}                                                                                                                                                                                                       | Естественная неорганизованная вентиляция осуществляется через: {<br>=не плотности внешних строительных ограждений<br>~оконные проемы<br>~форточки и фрамуги<br>~специальные проемы<br>}                                                                                                                                                                                                                        |
| Основные свойства возбудителя ботулизма {<br>=вырабатывает экзотоксин<br>~аэроб<br>~не образует споры<br>~не вырабатывает токсин<br>}                                                                                                                                                                                                                                       | Освещенность естественным светом нормируется {<br>=по коэффициенту естественного освещения<br>~в ваттах м/с<br>~в люксах<br>~по величине освещенности в рабочем помещении<br>}                                                                                                                                                                                                                                 |
| Собственно пылью называют: {<br>=аэрозоли, в которой дисперсной средой является воздух, а дисперсной фазой твердые частицы<br>~дисперсную систему, в которой дисперсной средой являются твердые частицы, а дисперсной фазой - воздух<br>~аэрозоли дезинтеграции с твердой и жидкой дисперсной фазой<br>~аэрозоли конденсации и дезинтеграции с жидкой дисперсной фазой<br>} | При нормировании искусственного освещения учитываются {<br>=все выше указанные варианты<br>~примененные системы освещения<br>~источники света<br>~характеристика фона<br>~величина контраста объекта различия фона<br>}                                                                                                                                                                                        |
| Кварцевая пыль, содержащая свободную двуокись кремния до 90% оказывает действие {<br>=фиброгенное<br>~канцерогенное<br>~мутагенное<br>~аллергенное<br>}                                                                                                                                                                                                                     | Вентиляционная система предназначена для удаления {<br>=возможных сочетаний этих факторов<br>~избыточного тепла и влаги<br>~паров и газов химич. веществ<br>~пыли<br>}                                                                                                                                                                                                                                         |
| Эффективное средство борьбы с пылью при шлифовке: {<br>~%50%увлажнение<br>~%50%вентиляция вытяжная местная<br>~%-50%вентиляция приточная местная<br>~%-50%вентиляция общая<br>}                                                                                                                                                                                             | Какая может быть производственная вентиляция в зависимости от способа организации воздухообмена: {<br>~%50%местная<br>~%50%общеобменная<br>~%-50%механическая<br>~%-50%приточно- вытяжная<br>}                                                                                                                                                                                                                 |
| Мероприятия, являющиеся наиболее радикальными при борьбе пылью {<br>=технологические<br>~лечебно - профилактические<br>~средства индивидуальной защиты<br>~санитарно - технические<br>}                                                                                                                                                                                     | Кондиционирование воздуха это: {<br>=вентиляционная установка поддерживающая воздухообмен в помещении и микроклимат независимо от метео. условий<br>~вентиляционная установка поддерживающая микроклимат помещения<br>~вентиляционная установка поддерживающая в помещении постоянный воздухообмен<br>~вентиляционная установка поддерживающая воздухообмен и микроклимат в зависимости от метео. условий<br>} |
| Содержание ПДК бензола в воздухе рабочей зоны (мг/м куб.) {<br>=5,0 мг/м куб.<br>~0,1 мг/м куб.<br>~1,0 мг/м куб.<br>~20 мг/м куб.<br>}                                                                                                                                                                                                                                     | Создание оптимальных и допустимых параметров микроклимата производственных помещений достигается {<br>=комплексом указанных мероприятий<br>~технологическими мероприятиями<br>~архитектурно строительными решениями<br>~системой вентиляции<br>}                                                                                                                                                               |
| ПДК аммиака в воздухе рабочей зоны (мг/м куб.) {<br>=20 мг/м куб.<br>~0,1 мг/м куб.<br>~1,0 мг/м куб.<br>~5,0 мг/м куб.<br>}                                                                                                                                                                                                                                                | Какой метод определения концентрации пыли является стандартным: {<br>=весовой<br>~счетный<br>~счетно-весовой<br>}                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Фиброгенную активность пыли увеличивает от содержания в ней: {  
=свободной двуокиси кремния.  
~асбеста  
~угольной пыли  
~талька  
}

Какие виды промышленности являются источником образования производственной пыли? {  
~%25%горнорудная  
~%25% угольная  
~%25% машиностроительная  
~%25%металлургическая  
}

Какие свойства пыли обуславливают ее вредное воздействие на организм? {  
~%33.3333%дисперсность  
~%33.3333%химический состав  
~%33.3333% электрический заряд  
}

Как классифицируют производственную пыль по происхождению? {  
~%50% органическая  
~%50% неорганическая  
~%-50%комбинированная  
~%-50%смешанная  
}

Как классифицируют производственную пыль по способу образования? {  
~%50%аэрозоли дезинтеграции  
~%50%аэрозоли конденсации  
}

Как образуются аэрозоли дезинтеграции? {  
~%50%при механическом разрушении и дроблении твердых веществ  
~%50%при механической обработке изделий  
~%-100%при термических процессах возгонки твердых веществ  
}

Как образуются аэрозоли конденсации? {  
=при термических процессах возгонки твердых веществ  
~при механическом разрушении и дроблении твердых веществ  
~при механической обработке изделий  
}

Как классифицируется производственная пыль в зависимости от дисперсности? {  
~%33.3333% видимая  
~%33.3333%микроскопическая  
~%33.3333%ультрамикроскопическая  
}

Какие группы заболеваний может вызывать промышленная пыль? {  
~%50% специфические  
~%50%неспецифические  
}

Жирорастворимые промышленные яды поражают преимущественно: {  
= ЦНС  
~кожу и слизистые  
~органы дыхания

~селезенку  
}

Промышленные яды могут вызвать: {  
~%25%заболевание (нозологию)  
~%25%врожденные пороки развития  
~%25%бесплодие  
~%25%мутагенный эффект  
}

Наследственные болезни могут быть вызваны: {  
=профессиональными вредностями  
~изомерным питанием  
~ОРЗ  
~климато- географическими условиями  
}

Сколько всего рационов лечебно- профилактического питания рабочих установлено в настоящее время? {  
=пять  
~три  
~семь  
~шесть  
~девять  
}

По каким показателям производится оценка токсичности вещества в условиях острого воздействия? {  
~%25%средняя смертельная концентрация  
~%25%средняя смертельная доза  
~%25%коэффициент возможности ингаляционного отравления  
~%25%порог острого действия  
}

Для марганцевого паркинсонизма наиболее характерны: {  
~%33.3333%насищенный смех  
~%33.3333%изменение походки  
~%33.3333%нарушение равновесия  
~%-50%снижение остроты слуха  
~%-50%кровотечения из носа и десен  
}

Какой из рационов лечебно - профилактического питания способствует выделению из организма депонированного свинца? {  
=рацион № 3  
~рацион № 1  
~рацион № 2  
~рацион № 4  
~рацион № 5  
}

О чем свидетельствует широкая зона хронического действия вещества при оценке его токсичности? {  
~%33.3333%выраженной возможности хронических интоксикаций  
~%33.3333%выраженности кумулятивных свойств  
~%33.3333%выраженности компенсаторных реакций организма  
~%-50%слабой возможности хронических интоксикаций  
~%-50%слабой выраженности кумулятивных свойств  
}

Отдалённые последствия влияния химических веществ, используемых в промышленности? {  
~%33.3333%эмбриотоксическое  
~%33.3333%канцерогенное  
~%33.3333%мутагенно  
~%-50%гепатотропное  
~%-50%рентоксическое

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>~%33.33333%свинец</li> <li>~%33.33333%бериллий</li> <li>~%33.33333%уран</li> <li>~%-100%никель</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Пути выделения токсических веществ из организма? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%20% лёгкие</li> <li>~%20%почки</li> <li>~%20%желудочно-кишечный тракт</li> <li>~%20% с грудным молоком</li> <li>~%20%кожа</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                 | <p>Какие вещества депонируются в паренхиматозных органах (печень, почки)? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%33.33333%ртуть</li> <li>~%33.33333%кадмий</li> <li>~%33.33333%марганец</li> <li>~%-100%хром</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <p>Сколько классов опасности вредных химических веществ, согласно классификации, существует в России? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>=4</li> <li>~2</li> <li>~3</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <p>Промышленные яды могут вызвать: {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25%заболевание (нозологию)</li> <li>~%25%врожденные пороки развития</li> <li>~%25%бесплодие</li> <li>~%25%мутагенный эффект</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <p>В каких органах накапливается свинец? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25% печень</li> <li>~%25% почки</li> <li>~%25%поджелудочная железа</li> <li>~%25%кости</li> <li>~%-100%язык</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <p>Наследственные болезни могут быть вызваны: {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>=профессиональными вредностями</li> <li>~изомерным питанием</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Классы опасности вредных химических веществ? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25%чрезвычайно опасные</li> <li>~%25% высоко опасные</li> <li>~%25%умеренно опасные</li> <li>~%25%малоопасные</li> <li>~%-100%не опасные</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                      | <p>Жирорастворимые промышленные яды поражают преимущественно: {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= ЦНС</li> <li>~кожу и слизистые</li> <li>~ органы дыхания</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p>Какие группы показателей опасности различают? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%50%показатели потенциальной опасности</li> <li>~%50%показатели реальной опасности</li> <li>~%-100%показатели виртуальной опасности</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                           | <p>Температуру и влажность воздуха на рабочем месте можно измерить {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= психрометром Ассмана</li> <li>~актинометром</li> <li>~актинометром или радиометром</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <p>Какие патологические процессы могут развиваться при воздействии промышленных ядов? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25%воспаление</li> <li>~%25%дистрофия</li> <li>~%25%сенсibilизация</li> <li>~%25%фиброз</li> <li>~%-100%канцерогенный эффект</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                            | <p>У работающих в условиях нагревающего микроклимата отмечается {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%33.33333%повышение температуры открытых участков кожи</li> <li>~%33.33333%повышение влагопотерь</li> <li>~%33.33333%расширение сосудов кожи</li> <li>~%-50%понижение температуры открытых участков кожи</li> <li>~%-50%понижение влагопотерь</li> <li>}</li> </ul> |
| <p>Какие факторы окружающей среды способствуют увеличению токсического действия химических веществ, используемых в промышленности? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25%высокая температура</li> <li>~%25%повышенная влажность</li> <li>~%25%изменение барометрического давления</li> <li>~%25%понижение температуры</li> <li>~%-100%отсутствие шума и вибрации</li> <li>}</li> </ul> | <p>Допустимые параметры микроклимата рабочей зоны устанавливаются с учетом: {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>=степени тяжести работы;</li> <li>~степени напряженности работы;</li> <li>~степени тяжести и напряженности работы.</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                 |
| <p>Показатели потенциальной опасности: {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25% летучесть</li> <li>~%25%растворимость в воде</li> <li>~%25%растворимость в жирах</li> <li>~%25% дисперсность</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <p>При нормировании микроклимата в соответствии с норматив-ными документами выделяют категории работ: {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>=легкой тяжести;</li> <li>~малой тяжести;</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <p>Показатели реальной опасности? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%33.33333%токсичность</li> <li>~%33.33333%зона острого действия</li> <li>~%33.33333%зона хронического действия</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <p>Классы опасности вредных химических веществ? {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~%25%чрезвычайно опасные</li> <li>~%25% высоко опасные</li> <li>~%25%умеренно опасные</li> <li>~%25%малоопасные</li> <li>~%-100%не опасные</li> <li>}</li> </ul>                                                                                                                     |
| <p>Какие вещества депонируются в костях? {</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Классификация промышленных ядов по химическим классам соединений: {  
~%33.33333%органические  
~%33.33333% неорганические  
~%33.33333%элементоорганические  
~%-100%синтетические  
}

=степени тяжести работы;  
~времени суток работы;  
~гендерных различий.  
}

Специфическим проявлением влияния производственных вредностей являются: {  
=профессиональные заболевания  
~эндокринные заболевания  
~алиментарные заболевания  
~эндемические заболевания  
~пищевые отравления  
}

Аддитивное действие - феномен суммированных эффектов, при котором суммарный эффект {  
=равен сумме эффектов действующих компонентов  
~больше простой суммы  
~меньше простой суммы  
}

К отдаленным эффектам воздействия ядов на организм относятся {  
~%33.33333% гонадотропный  
~%33.33333%эмбриотропный  
~%33.33333%мутагенный  
~%-100%нефрогенный  
}

Производственные яды по степени токсичности подразделяются на {  
~%25% чрезвычайно токсичные  
~%25% высокотоксичные  
~%25% умеренно токсичные  
~%25% малотоксичные  
~%-100%нетоксичные  
}

Наследственные болезни могут быть вызваны: {  
=профессиональными вредностями  
~изомерным питанием  
}

Жирорастворимые промышленные яды поражают преимущественно: {  
= ЦНС  
~кожу и слизистые  
~ органы дыхания  
}

Температуру и влажность воздуха на рабочем месте можно измерить {  
= психрометром Ассмана  
~актинометром  
~актинометром или радиометром  
}

У работающих в условиях нагревающего микроклимата отмечается {  
~%33.33333%повышение температуры открытых участков кожи  
~%33.33333%повышение влаготеперь  
~%33.33333%расширение сосудов кожи  
~%-50%понижение температуры открытых участков кожи  
~%-50%понижение влаготеперь  
}

Допустимые параметры микроклимата рабочей зоны устанавливаются с учетом: {