

Средства для ингаляционного наркоза {

~%50%Эфир.

~%-33.33333%Гексенал.

~%-33.33333%Пропанидид.

~%50%Фторотан.

~%-33.33333%Кетамин.

}

Механизм действия средств для ингаляционного наркоза {

~%33.33333%Нарушают синаптическую передачу.

~%33.33333%Адсорбируются на пре- и постсинаптической мембране.

~%-50%Проникают в митохондрии, разобщают процессы окислительного фосфорилирования.

~%33.33333% Связываются с белками мембран, нарушая выделение медиатора в синаптическую щель.

~%-50%Нарушают образование макроэргических связей.

}

Характерно для ингаляционного наркоза {

~%33.33333%Наркоз легко управляем.

~%33.33333%Выражена стадийность наркоза.

~%33.33333% Взрывоопасность.

~%-50%Не требуется специальной аппаратуры.

~%-50%Используется в качестве базиса для основного наркоза.

}

Средство для наркоза повышает чувствительность β -адренорецепторов сердца к катехоламинам {

~Закись азота.

~Пропанидид

=Фторотан

~Оксибутират натрия

~Тиопентал-натрий.

}

Средства для неингаляционного наркоза {

~%-50%Эфир.

~%33.33333%Гексенал.

~%33.33333%Пропанидид.

~%-50%Фторотан.
~%33.33333%Кетамин.
}

Производные барбитуровой кислоты, использующиеся в качестве средств для неингаляционного наркоза {

~%-25%Фторотан.
~%-25%Фенобарбитал.
~%50%Гексенал.
~%50%Тиопентал натрия.
~%-25%Этаминал натрия.
~%-25%Пропанидид.
}

Механизм действия средств для неингаляционного наркоза {

~%33.33333%Нарушают синаптическую передачу.
~%-50%Адсорбируются на пре- и постсинаптической мембране.
~%33.33333%Проникают в митохондрии, разобщают процессы окислительного фосфорилирования.
~%-50%Связываются с белками мембран, нарушая выделение медиатора в синаптическую щель.
~%33.33333%Нарушают образование макроэргических связей.
}

Свойства этилового спирта использующиеся в практической медицине {

~%-50%Угнетение ЦНС.
~%-50%Мочегонное действие.
~%25%Противошоковое действие.
~%25%Влияние на терморегуляцию.
~%25%Дубящее действие.
~%25% Противомикробное действие.
}

Фармакологические эффекты морфина {

~%25%Уменьшает болевую чувствительность.
~%-33.33333%Увеличивает секрецию желез.
~%-33.33333% Вызывает мидриаз.
~%25%Способствует возникновению обстипации.
~%25%Урежает дыхание.

~%25%Вызывает брадикардию.
~%-33.33333%Вызывает диарею.
}

Влияние морфина на ЦНС {

~%20%Угнетает таламические центры болевой чувствительности.
~%-50%Возбуждает дыхательный центр.
~%20%Угнетает дыхательный центр.
~%20%Возбуждает центры блуждающих нервов.
~%20%Стимулирует центр положительных эмоций.
~%-50% Уменьшает образование медиаторов боли.
~%20%Понижает температуру тела.
}

Показания к применению морфина {

~%25%Травматические боли.
~%-25%Мышечные боли.
~%-25%Зубная боль.
~%-25%Головная боль.
~%25%Боли при злокачественных опухолях.
~%25% Боли при инфаркте миокарда.
~%25% Для премедикации.
~%-25%Суставные и невралгические боли.
}

Основные симптомы острого отравления морфином {

~%%Психомоторное возбуждение.
~%25%Коматозное состояние.
~%25%Миоз.
~%25%Угнетение дыхания.
~%-50%Судороги.
~%-50%Мидриаз.
~%25%Ортостатический коллапс.
}

Фармакологические эффекты, характерные для промедола {

~%33.33333%Оказывает анальгетическое действие.
~%-50%Угнетает дыхание сильнее морфина.
~%33.33333%Усиливает сократимость миометрии.

~%50%Плохо всасывается из ЖКТ.
~%33.33333%Понижает тонус бронхов, мочеточников.
}

Основные свойства пентазоцина {
~%25%Обладает анальгетическим действием.
~%25%Редко вызывает лекарственную зависимость.
~%25%Хорошо всасывается из ЖКТ.
~%25%Слабо угнетает дыхательный центр.
~%50%Вызывает брадикардию.
~%50%Понижает артериальное давление.
}

Препарат, являющийся специфическим антагонистом морфина {
=Налоксон.
~Диазепам.
~ Флумазенил.
~Трамадол.
~ Кофеин.
}

Противоэпилептические средства, применяемые при больших судорожных припадках {
~%33.33333%Фенобарбитал.
~%25%Циклодол.
~%33.33333%Дифенин.
~%25%Пентазоцин.
~%33.33333%Карбамазепин.
~%25%Леводоба.
~%25%Карбидоба.
}

Основные фармакологические эффекты дифенина {
~%50%Стимуляция ЦНС.
~%25%Угнетение передачи возбуждения с пирамидных путей на мотонейроны спинного мозга.
~%50%Способен купировать судороги.
~%25%Вследствие раздражающего действия может вызывать тошноту и рвоту.
~%25%Способствует накоплению в мозге ГАМК.

~%25%Может кумулировать.
}

Препарат, применяемый при эпилептическом статусе {
~Вальпроат натрия.
=Диазепам.
~ Карбамазепин.
~ Этосуксимид.
}

Типичные нейролептики {
~%20%Галоперидол.
~%20%Дроперидол.
~%-33.33333%Клозапин.
~%-33.33333%Хлозепид.
~%-33.33333%Сульпирид.
~%20%Трифтазин.
~%20%Левомепромазин.
~%20%Аминазин.
}

Нетипичные нейролептики {
~%-20%Галоперидол.
~%-20%Дроперидол.
~%50%Клозапин.
~%-20%Хлозепид.
~%50%Сульпирид.
~%-20%Трифтазин.
~%-20%Левомепромазин.
}

Фармакологические эффекты, характерные для действия нейролептиков {
~%25%Антипсихотический.
~%25%Седативный.
~%-50%Увеличение двигательной активности.
~%25%Противорвотное действие.
~%-50% Противокашлевое действие.
~%25% Потенцирование действия наркотических средств.
}

Показания к применению нейролептиков {

~%25%Психозы.

~%-33.33333%Паркинсонизм.

~%25%Психомоторное возбуждение.

~%25%Рвота центрального происхождения.

~%25% Нейролептанальгезия.

~%-33.33333% Передозировка наркотических средств.

~%-33.33333%Анафилактический шок.

}

Нейролептик, использующийся для нейролептанальгезии {

~Трифтазин.

~Левомепромазин.

=Дроперидол.

~Сульпирид.

~ Хлозепид.

~Клозапин.

}

Побочные явления, возникающие при использовании нейролептиков {

~%-33.33333%Лекарственная зависимость.

~%20%Психическая депрессия.

~%20% Двигательные нарушения.

~%20%Лекарственный паркинсонизм.

~%-33.33333% Гипертензия.

~%-33.33333% Бронхоспазм.

~%20%Аллергические реакции.

~%20%Каталепсия.

}

Анксиолитики - производные бензодиазепина {

~%-33.33333%Галоперидол.

~%25%Диазепам.

~%-33.33333%Клозапин.

~%25%Хлозепид.

~%25% Нитразепам.

~%-33.33333%Трифтазин.

~%25%Феназепам.

{

Небензодиазепиновые анксиолитики {

~%-25%Диазепам.

~%-25%Тиоридазин.

~%-25%Трифтазин.

~%33.33333%Мепротан.

~%33.33333%Амизил.

~%-25%Хлозепид.

~%33.33333%Триоксазин.

}

Побочные явления при использовании анксиолитиков {

~%33.33333%Ослабление мышечного тонуса.

~%-50%Психоз.

~%-50%Экстрапирамидные нарушения.

~%33.33333%Лекарственная зависимость.

~%33.33333%Сонливость и слабость.

}

Показания для применения анксиолитиков {

~%33.33333%Эпилепсия.

~%33.33333%Неврозы и неврозоподобные состояния.

~%-33.33333%Психические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями.

~%-33.33333% Спастические параличи центрального происхождения.

~%-33.33333%Передозировка наркотических средств.

~%33.33333%Купирование судорог.

{

Препараты, относящиеся к седативным средствам {

~%-25%Аминазин.

~%-25%Трифтазин.

~%-25%Тиоридазин.

~%-25%Хлозепид.

~%33.33333%Натрия бромид.

~%33.33333%Настойка валерианы.

~%33.33333%Настойка пустырника.

}

Препарат, используемый для отмены эффектов бензодиазепинов {
~Налоксон.
~Налтрексон.
~Диазепам.
= Флумазенил.
~Леводопа.
}

Психомоторные стимуляторы {
~%-25%Аминалон.
~%-25%Амитриптилин.
~%33.33333%Кофеин.
~%-25%Пирацетам.
~%33.33333%Фенамин.
~%33.33333%Сиднокарб.
~%-25%Элеутерококк.
}

Эффекты, характерные для пирацетама {
~%-50%Повышение артериального давления.
~%33.33333%Улучшение регионарного кровотока в ишемизированных участках мозга.
~%33.33333%Улучшение умственной работоспособности, восстановление внимания, речи.
~%-50%Возбуждение дыхательного и сосудодвигательного центров.
~%33.33333%Повышение устойчивости к гипоксии.
}

Явления, наблюдающиеся при длительном применении психостимулирующих средств? {
~%25%Толерантность.
~%25%Кумуляция.
~%25%Привыкание.
~%-100%Повышение чувствительности к психостимулирующим средствам.
~%25%Лекарственная зависимость.
}

Механизм действия ноотропных средств {
~Стимуляция дофаминовых рецепторов головного мозга.

~Прямое возбуждающее влияние на клетки коры головного мозга.
=Влияние на энергетические процессы, связанные с метаболическими эффектами ГАМК.
~Активация норадренергических систем мозга.
~Вмешательство в обмен цАМФ и антагонизм с аденозином.
}

Показания к применению психостимуляторов {
~%-100%При психических нарушениях, сопровождающихся бредом, галлюцинациями.
~%33.33333%При нарколепсии.
~%33.33333%При астении.
~%33.33333%Для временного повышения умственной и физической работоспособности.
}

Показания к применению ноотропных средств {
~%50%Для устранения умственной недостаточности, связанной с нарушением мозгового кровообращения.
~%-50%Для временной стимуляции работоспособности.
~%50%Для лечения детей с умственной отсталостью.
~%-50%Для повышения физической работоспособности.
}

Антидепрессивные препараты {
~%-25%Кофеин.
~%25%Амитриптилин.
~%-25%Сиднокарб.
~%-25%Пирацетам.
~%25%Пиразидол.
~%25%Имипрамин.
~%-25%Аминалон.
~%25%Ниаламид.
}

Показания к применению analeptиков {
~%33.33333%Острое расстройство кровообращения при понижении сосудистого тонуса и ослаблении дыхания.
~%-100% Для потенцирования действия наркотических средств.

~%33.33333%При асфиксии новорожденных.

~%33.33333%При отравлении веществами, угнетающими витальные функции организма.

{

Отметить анксиолитик, агонист серотониновых рецепторов {

~аминазин

~диазепам

~галоперидол

=буспирон

~амизил

}

К "дневным анксиолитикам" относятся {

~диазепам

~феназепам

~флумазенил

=мезапам

~мидазолам

}

Какими свойствами, в отличие от всей группы бензодиазепиновых производных, обладают "дневные анксиолитики" {

~обладают более выраженным снотворным действием

~обладают выраженным анксиолитическим действием

=обладают минимальным седативно-гипнотическим действием

~обладают выраженной противосудорожной активностью

~способны подавлять кашлевой рефлекс

}

Все утверждения, касающиеся побочных эффектов анксиолитиков бензодиазепинового ряда, правильны, за исключением {

~нарушают координацию движения

~вызывают сонливость

~снижают тонус скелетной мускулатуры

~вызывают лекарственную зависимость

=вызывают экстрапирамидные расстройства

}

Отметить механизм действия флумазенила – специфического антагониста бензодиазепинов {

- ~ограничивает всасывание бензодиазепинов в кишечнике
- ~индуцирует синтез микросомальных ферментов печени, ускоряя биотрансформацию бензодиазепинов
- ~ускоряет выведение метаболитов и конъюгатов почками
- =блокирует бензодиазепиновые рецепторы и устраняет центральные эффекты бензодиазепиновых анксиолитиков
- ~связывает бензодиазепины, образуя с ними комплексы

Для бупирона характерны все нижеперечисленные эффекты, кроме {

- ~обладает выраженной анксиолитической активностью
- ~эффект развивается медленно (1-2 недели)
- =обладает кратковременным действием
- ~лишен седативного, противосудорожного, мышечно-расслабляющего действия
- ~почти не вызывает привыкания и лекарственную зависимость

К седативным средствам относятся {

- ~50% препараты валерианы
- ~50% препараты пустырника
- ~33.33333% препараты белладонны
- ~33.33333% препараты танина
- ~33.33333% препараты кофеина

Причиной бромизма – хронического отравления бромидом является {

- =медленное выведение препаратов из организма
- ~медленное всасывание препаратов в кишечнике
- ~накопление препаратов в костной ткани
- ~нарушение процессов метаболической трансформации
- ~накопление препаратов в ЦНС

Укажите снотворное средство из группы производных барбитуровой кислоты {

- ~нитразепам

~золпидем
~зопиклон
~хлоралгидрат
=фенобарбитал
}

Какое снотворное средство существенно изменяет "структуру" сна{

~нитразепам
~феназепам
=фенобарбитал
~хлоралгидрат
~зопиклон
}

Укажите препарат, не влияющий на "быстрый" сон{

=хлоралгидрат
~диазепам
~этаминал-натрий
~нитразепам
~фенобарбитал
}

Основная направленность действия снотворных средств бензодиазепинового ряда связана с{

~влиянием на кору головного мозга
=влиянием на лимбическую систему
~влиянием на ядра гипоталамуса
~влиянием на ретикулярную формацию
~влиянием на ядра экстрапирамидной системы
}

Отметить побочные эффекты, ограничивающие применение золпидема и зопиклона{

~сердечные аритмии
~тремор и ригидность мышц
~бронхоспазм
~повышение внутриглазного давления
=привыкание и лекарственная зависимость
}

Для зопиклона (имован) характерны все нижеперечисленные побочные эффекты, кроме{

- ~аллергические реакции
 - ~нарушение аккомодации
 - =экстрапирамидные расстройства
 - ~металлический горький вкус
 - ~психические и поведенческие расстройства
- }

Укажите снотворное средство, не относящееся к бензодиазепинам, но обладающее сродством к бензодиазепиновым рецепторам{

- ~нитразепам
 - =зопиклон
 - ~фенобарбитал
 - ~хлоралгидрат
 - ~этаминал - натрий
- }

Какие из перечисленных ниже препаратов вызывают клинически значимую индукцию микросомальных ферментов печени{

- =фенобарбитал
 - ~сибазон
 - ~морфин
 - ~аминазин
 - ~фтороторан
- }

Какой из перечисленных ниже снотворных средств, наиболее часто вызывает явление последействия{

- ~этаминал - натрий
 - =фенобарбитал
 - ~нитразепам
 - ~хлоралгидрат
 - ~зопиклон
- }

Какое действие вызывают барбитураты при их повторном применении{

- =материальную кумуляцию
- ~идиосинкразию
- ~ортостатическую гипотензию

~ригидность мышц и тремор
~тахифилаксию
}

Фенобарбитал обладает всеми ниже перечисленными эффектами, кроме{
=антипсихотическим
~седативным
~снотворным
~противосудорожным
~индуцирует синтез микросомальных ферментов печени
}

Для острого отравления барбитуратами характерны все ниже перечисленные признаки, кроме{
=возбуждение
~коматозное состояние
~угнетение дыхания
~понижение рефлекторной активности
~снижение артериального давления
}

Какой из analeptиков используется при легких формах отравления барбитуратами{
~кордиамин
~камфора
=бемегрид
~этимизол
~кофеин
}

Все ниже перечисленные средства используют для ингаляционного наркоза, кроме{
~эфир для наркоза
~фторотан
=кетамин
~энфлуран
~азота закись
}

Указать наркозное средство, выделяющееся легкими в неизменном виде {
=эфир для наркоза
~фторотан
~кетамин
~тиопентал натрий
~натрия оксибутират
}

Рефлекторное урежение дыхания и ритма сердечных сокращений,
гиперсекреция бронхиальных и слюнных желез при использовании эфира
предупреждается введением {
~адреналина
~дителина
~дроперидола
~гигрония
=атропина
}

Указать наркозное средство, опасное в пожарном отношении {
~фторотан
~закись азота
~энфлуран
=эфир для наркоза
~изофлуран
}

Какое прессорное средство следует ввести при снижении артериального
давления на фоне фторотана {
~адреналин
~норадреналин
~эфедрин
=мезатон
~дофамин
}

Какое наркозное средство может быть использовано при инфаркте миокарда
в качестве болеутоляющего средства {
~эфир для наркоза
=азота закись

~фторотан
~пропанидид
~гексенал
}

Какое средство для неингаляционного наркоза обладает ультракоротким действием{

=пропанидид
~гексенал
~тиопентал натрий
~натрия оксибутират
~кетамин
}

Какое из перечисленных ниже наркозных средств дает "диссоциативную" анестезию{

=кетамин
~фторотан
~дроперидол
~тиопентал натрий
~пропанидид
}

Указать причину кратковременности наркотического эффекта тиопентала натрия{

~быстрая инаktivация вещества ферментами печени
~быстрое выведение вещества из организма почками
=быстрое снижение концентрации тиопентала натрия в мозговой ткани и в крови за счет депонирования вещества в жировой ткани
~дезаминирование под влиянием моноаминоксидазы
~декарбоксилирование под влиянием дофа-декарбоксилазы
}

Для натрия оксибутирата характерны все нижеперечисленные свойства, кроме{

~седативное
~снотворное
~наркотическое
=антипсихотическое

~антигипоксическое
}

Указать наркозное средство, эффективное при приеме внутрь {
=натрия оксибутират
~тексенал
~кетамин
~тиопентал натрий
~пропанидид
}

Какие средства применяют для подготовки больного к операции (премедикации) {
~холиномиметические средства
=атропин и атропиноподобные средства
~адреномиметические средства
~кардиотонические средства
~психостимулирующие средства
}

Указать причину, не позволяющую использовать спирт этиловый в качестве средства для наркоза {
~раздражающее действие препарата
~ультракороткое действие
~недостаточное расслабление скелетной мускулатуры
~повышение артериального давления вовремя наркоза
=малая наркотическая широта
}

С чем связывают мочегонное действие спирта этилового {
~прямым влиянием на мочеобразование в почках
=снижением продукции антидиуретического гормона
~угнетением синтеза альдостерона
~устранением влияния альдостерона на почечные каналы
~повышением осмотического давления в просвете почечных канальцев
}

Указать препарат, используемый для лечения алкоголизма {
=тетурам

~бемегрид
~трилон Б
~унитиол
~изонитрозин
}

Отметить парциальные (частичные) агонисты опиоидных рецепторов {

~%-33.33333% анальгин
~%-33.33333% морфин
~%-33.33333% налоксон
~ %50% налбуфин
~ %50% буторфанол
}

Отметить универсальный антагонист наркотических анальгетиков,
превосходящий по активности налоксон {

~ пентазоцин
~ анальгин
~ бупрепорфин
=налтрексон
~ буторфанол
}

По какому диагностическому признаку можно отличить кокаиниста от
морфиниста, если оба находятся в коматозном состоянии {

~ по величине артериального давления
~ по частоте пульса
=по размеру зрачков
~ по частоте дыхательных движений
~ по тону скелетной мускулатуры
}

Отметить причины обстипации (запора), возникающей при введение
морфина {

~ %50% угнетение секреции поджелудочной железы и выделение желчи
~%-33.33333% расслабление гладкой мускулатуры кишечника
~ %50% повышение тонуса сфинктеров желудочно-кишечного тракта
~%-33.33333% усиление перистальтики кишечника
~%-33.33333%задерживает абсорбцию электролитов и воды в кишечнике

}

Каков механизм возникновения рвоты при введении морфина{

~ раздражение рецепторов слизистой оболочки желудка

~ прямое возбуждение нейронов рвотного центра

~ раздражение вестибулярного аппарата

=возбуждение хеморецепторов "пусковой зоны" рвотного центра

~ возникновение неприятных обонятельных и вкусовых ощущений

}

Применение каких наркотических анальгетиков показано при болях спастического характера (кишечные, печеночные, почечные колики){

~ 50% промедол

~ 33.33333% морфин

~ 50% омнопон

~ 33.33333% фентанил

~ 33.33333%налоксон

}

Наркотические анальгетики противопоказаны{

~ при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

=детям до 3 лет и в старческом возрасте

~ при инфаркте миокарда

~ при сильном кашле

~ при одышке, связанной с недостаточностью левого желудочка

}

С какими препаратами целесообразно сочетать промедол или омнопон при болях спастического характера{

~ 33.33333%дроперидол

~ 50% атропин

~ 33.33333% сибазон

~ 50% папаверин

~ 33.33333%налоксон

}

Отметить анальгетик со смешанным механизмом действия (опиоидным + неопиоидным){

~ промедол

=трамадол
~ фентанил
~ буторфанол
~ бупренорфин
}

К нейролептикам относятся все препараты, за исключением {
~аминазина
~трифтазина
~галоперидола
=диазепама
~клозапина
}

Основным отличием "атипичных" антипсихотических средств от "типичных" является {
~отсутствие седативного действия
~наличие антидепрессивной активности
=нарушение функций экстрапирамидной системы выражено в меньшей степени
~слабая антипсихотическая активность
~развитие лекарственной зависимости (физической)
}

Укажите эффекты аминазина, связанные с его влиянием на центральную нервную систему {
~50% антипсихотический
~33.33333% психостимулирующий
~33.33333% антигистаминный
~50% противорвотный
~33.33333% все ответы правильные
}

Какими из перечисленных ниже свойств обладает производное замещенных бензамидов – сульпирид {
~50% обладает антипсихотической активностью
~33.33333% обладает выраженным седативным действием
~50% вызывает незначительный седативный эффект
~33.33333% наиболее часто вызывает нарушение со стороны экстрапирамидной системы

~%-33.33333% оказывает прямое стимулирующее влияние на миокард
}

Отметить побочный эффект клозапина, ограничивающий его широкое использование{

~экстрапирамидные расстройства
~привыкание и лекарственная зависимость
~ортостатический коллапс
=лейкопения и агранулоцитоз
~бронхоспазм
}

Укажите основной механизм стимуляции моноаминергических процессов в ЦНС под влиянием трициклических антидепрессантов{

~блокирование дофаминовых рецепторов
~стимуляция дофаминовых рецепторов
~блокирование серотониновых рецепторов
=угнетение нейронального захвата моноаминов
~угнетение активности MAO
}

Укажите основной механизм стимуляции моноаминергических процессов в ЦНС под влиянием ниламида{

~блокирование дофаминовых рецепторов
~стимуляция дофаминовых рецепторов
~блокирование серотониновых рецепторов
~угнетение нейронального захвата моноаминов
=угнетение активности MAO
}

К антидепрессантам, угнетающим нейрональный захват моноаминов (неизбирательного действия) относятся{

~%50% имизин
~%-33.33333% ниламид
~%50% амитриптилин
~%-33.33333% аминазин
~%-33.33333% дроперидол
}

К антидепрессантам, избирательно блокирующим нейрональный захват серотонина, относится {

~имизин

~амитриптилин

=флуоксетин

~ниаламид

~дроперидол

}

К антидепрессантам, избирательно блокирующим нейрональный захват норадреналина, относится {

~имизин

=мапротилин

~ниаламид

~амитриптилин

~аминазин

}

В каких случаях применяют соли лития {

~для лечения психозов

~для лечения паркинсонизма

=для лечения и профилактики маний

~для купирования психомоторного возбуждения

~для лечения неврозов

}

Для солей лития характерны все нижеперечисленные свойства, кроме {

~медленное развитие эффекта (2-3 недели)

~вводятся энтерально

~обладают малой терапевтической широтой

~обладают избирательным действием в отношении маний

=вводятся только парентерально

}