

Отметить противогрибковый антибиотик {
=амфотерицин В
~миконазол
~метронидазол
~декамин
~клотримазол
}

Какой препарат применяют при кандидомикозе, вызываемых условно патогенными грибами {
~гризеофульвин
~гризеофульвин
~пиперазин
=миконазол
~калия йодид
}

Что характерно для амфотерицина В {
~обладает низкой токсичностью
=обладает высокой токсичностью
~назначается внутрь
~проникают через гематоэнцефалический барьер
~эффективен в отношении вирусов
}

Механизм действия амфотерицина В {
=нарушает проницаемость клеточной мембраны грибов
~угнетает синтез белков рибосомами
~нарушает синтез РНК
~нарушает синтез клеточной стенки
~разрушает ядерный аппарат клетки
}

Что характерно для нистатина {
~обладает широким спектром действия
~назначается парентерально
~обладает высокой токсичностью
=обладает низкой токсичностью
~используют для лечения системных микозов

}

Что характерно для миконазола {

~по спектру соответствует нистатину

=обладает более широким спектром антигрибкового действия чем нистатин

~назначается только местно

~побочные эффекты минимальные

~применяется для лечения кандидомикозов

}

Амфотерицин В назначают {

~внутрь

=внутривенно

~ингаляционно

~внутримышечно

~местно

}

Какими путями можно вводить нистатин {

~подкожно

~внутривенно

~внутримышечно

~ингаляционно

=местно

}

Побочное действие нистатина при приеме внутрь проявляется {

=диспептическими расстройствами

~нарушением функции почек

~нейротоксическим действием

~гепатотоксическим действием

~анемией

}

Направленность противовирусного действия мидантана и ремантадина {

=угнетает процесс высвобождения (депротеинизации) вирусного генома

~угнетает синтез нуклеиновых кислот

~угнетает "сборку" вирионов

~угнетает синтез ранних вирусных белков

~угнетает адсорбцию вируса на клетке
}

Указать механизм действия препаратов: ацикловир, зидовудин, видарабин {
=угнетают синтез нуклеиновых кислот, ингибируя ДНК-полимеразу
~угнетают синтез "ранних" вирусных белков - ферментов
~угнетают "сборку" вирионов
~угнетают синтез "поздних" вирусных белков
~угнетают процесс высвобождения вирусного генома
}

Указать механизм действия метисазона {
=угнетает "сборку" вирионов, угнетая синтез вирусного структурного белка
~угнетает адсорбцию вируса на клетке
~угнетает синтез "ранних" вирусных белков
~угнетает синтез "поздних" вирусных белков
~угнетает высвобождение вирусного генома
}

Какой из ниже перечисленных противовирусных средств является биологическим веществом, продуцируемым клетками макроорганизма {
~саквинавир
~мидантан
=интерферон
~арбидол
~метисазон
}

Отметить противовирусное средство, производное пептидов, ингибитор протеаз ВИЧ {
=саквинавир
~арбидол
~фоскарнет
~мидантан
~метисазон
}

Отметить средство, используемое для профилактики гриппа типа А {
~арбидол

~фоскарнет
=ремантадин
~метисазон
~ацикловир
}

Отметить противовирусное средство (аналог нуклеозидов), обладающее противогерпетической активностью {

~зидовудин
~мидантан
=ацикловир
~фоскарнет
~метисазон
}

Указать основное применение осельтамивира {

~лечение ВИЧ-инфекции
~лечение гриппа типа А
=профилактика гриппа типа А и В
~лечение цитомегаловирусной инфекции
~лечение простого герпеса
}

Что характерно для арбидола {

=обладает интерферогенной активностью и применяется для лечения и профилактики гриппа типа А и В
~применяется для профилактики оспы
~подавляет иммунитет
~вызывает эйфорию
~вводится парентерально
}

Что характерно для оксолина {

~эффективен в отношении вируса оспы
~эффективен при цитомегаловирусной инфекции
~вводится внутривенно
=применяется местно для профилактики гриппа
~высокотоксичен (подавляет лейкопоэз)
}

Какими свойствами помимо противовирусной активности обладают интерфероны {

- ~противоаллергической активностью
 - =иммуномодулирующей, противоопухолевой активностью
 - ~антигистаминным действием
 - ~антиоксидантным, антигипоксическим действием
 - ~антирахитическим действием
- }

Какой из перечисленных средств действует на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) {

- =зидовудин
 - ~оксолин
 - ~ремантадин
 - ~интерферон
 - ~метисазон
- }

Отметить синтетические противотуберкулезные средства {

- ~0-33.33333% циклосерин
 - ~0-33.33333% канамицин
 - ~ 50% изониазид
 - ~ 50% этамбутол
 - ~0-33.33333% леворин
- }

Что характерно для синтетических противотуберкулезных препаратов {

- ~0-33.33333% имеют широкий спектр антимикробного действия
 - ~0-33.33333% оказывают бактерицидное действие
 - ~ 50% оказывают в основном бактериостатическое действие
 - ~ 50% действует только на микобактерии туберкулеза
 - ~0-33.33333% влияют и на прочие микроорганизмы
- }

Отметить антибиотики, применяемые при лечении туберкулеза {

- ~0-33.33333% левомецитин
- ~ 50% стрептомицина сульфат
- ~0-33.33333% бензилпенициллин
- ~ 50% рифампицин

~%-33.33333% тетрациклин
}

Основные принципы назначения противотуберкулезных препаратов {
~ %50% комбинируют 2-3 препарата
~%-33.33333% назначают только 1 эффективный препарат
~%-33.33333% химиотерапию назначают после результатов
бактериологических исследований
~ %50% химиотерапию назначают не дожидаясь результатов
бактериологических исследований
~%-33.33333% назначают ударными дозами
}

Отметить побочные эффекты характерные для противотуберкулезных
препаратов {
~ %50% гепатотоксичность
~ %50% нефротоксичность
~%-33.33333% лекарственная зависимость
~%-33.33333% аритмии сердца
~%-33.33333% лекарственный паркинсонизм
}

Что характерно для изониазида {
=обладает высокой активностью в отношении микобактерий туберкулеза
~действует только на внутриклеточное расположение микобактерий
туберкулеза
~ эффективен в лечении малярии
~ эффективен в отношении гонококков
~ эффективен в отношении пневмококков
}

Чем обусловлено, назначение одновременно с изониазидом, пиридоксина {
~ пиридоксин усиливает противотуберкулезную активность изониазида
~ в сочетании с пиридоксином изониазид хорошо всасывается в ЖКТ
=пиридоксин предупреждает развитие невритов, вызываемых изониазидом
~ тем, что пиридоксин является активным противотуберкулезным средством
~ тем, что пиридоксин препятствует выведению изониазида из организма и
тем самым способствует накоплению бактерицидных концентраций
препарата

}

Какой препарат из группы антибиотиков действует на микобактерии туберкулеза бактерицидно {

~ ампициллин

~ цефаклор

~ изониазид

~ этамбутол

=рифампицин

}

Что характерно для стрептомицина {

~%-33.33333% является антибиотиком узкого спектра действия

~%-33.33333% влияет преимущественно на грамм (+)флору

~ %50% активен в отношении микобактерий туберкулеза

~%-33.33333% хорошо всасывается из ЖКТ

~ %50%эффективен в отношении возбудителей туляремии и чумы

}

Какое осложнение может возникнуть при применения препаратов стрептомицина {

~ гемералопия

=снижение слуха и вестибулярные нарушения

~ гемолиз

~ угнетение кроветворения

~ экстрапирамидные нарушения

}

Что характерно для этионамида {

~ имеет широкий спектр антимикробного действия

=активен в отношении микобактерии туберкулеза

~ активен в отношении возбудителя сифилиса

~ резистентность микобактерий к нему развивается медленно

~ плохо всасывается из ЖКТ

}

Что характерно для канамицина {

~%-33.33333% является препаратом выбора при туберкулезе

- ~ %50% механизм действия связан с угнетением синтеза белка в бактериальной клетке
 - ~ %50% оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие
 - ~%-33.33333% резистентность к нему бактерий развивается медленно
 - ~%-33.33333% обладает противоспирохетозной активностью
- }

Отметить механизм действия ПАСК {

=конкурентный антагонизм с парааминобензойной кислотой, необходимой для роста и размножения микобактерий туберкулеза

- ~ угнетение синтеза белка рибосомами бактерий
 - ~ нарушение проницаемости мембран клеток
 - ~ угнетает синтез миколовых кислот, являющийся компонентом клеточной стенки микобактерий
 - ~ нарушение синтеза РНК в ядерном аппарате бактериальной клетки
- }

Какие из препаратов относятся к I группе (наиболее эффективных) противотуберкулезных средств {

- ~%-33.33333% циклосерин
 - ~ %50% изониазид
 - ~ %50% рифампицин
 - ~%-33.33333% канамицин
 - ~%-33.33333% ПАСК
- }

Отметить противотуберкулезные препараты II группы (средней эффективности) {

- ~%-33.33333% изониазид
 - ~ %50% этамбутол
 - ~%-33.33333% ПАСК
 - ~ %-33.33333% рифампицин
 - ~%50% циклосерин
- }

Механизм антимикробного действия рифампицина {

- ~ нарушает синтез миколовых кислот, являющихся компонентом клеточной стенки микобактерий
- ~ нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны

=нарушает синтез РНК, за счет ингибирования РНК - полимеразы
~ угнетает синтез белка в клетках микобактерий
~ является конкурентным антагонистом ПАБК, необходимой для роста бактерий
}

Отметить синтетические противотуберкулезные средства III группы с умеренной эффективностью {
~%-33.33333% рифампицин
~%-33.33333% изониазид
~ %50% ПАСК
~ %50%тиоацетазон
~%-33.33333% канамицин
}

К антибактериальным средствам относятся следующие группы {
~ %50% антибиотики
~%50% сульфаниламиды
~%-33.33333% противопаркинсонические
~%-33.33333% противовирусные
~%-33.33333% противогрибковые
}

Назвать группу антибиотиков, механизм антимикробного действия которой связан с нарушением проницаемости цитоплазматической мембраны {
~ тетрациклины
~ пенициллины
~ аминогликозиды
=полимиксины
~ макролиды
}

Какое побочное действие наблюдается наиболее часто, при использовании препаратов бензилпенициллина {
~агранулоцитоз
~ анемия
=аллергия
~ снижение слуха
~ поражение почек

}

К группе тетрациклинов относятся все препараты, кроме {

~ окситетрациклина

~ тетрациклина

~ метациклина

~ доксициклина

=метициллина

}

Что характерно для эритромицина и олеандомицина {

~ по спектру действия соответствует бензилпенициллину

=действует на те же микроорганизмы, что и бензилпенициллин, а так же риккетсии и хламидии

~устойчивость микроорганизмов к действию препаратов развивается медленно

~ действует бактерицидно

~ хорошо и полностью всасывается в ЖКТ

}

Назвать препарат, одним из осложнений которого является угнетение функций VIII пары черепно-мозговых нервов {

~ тетрациклин

~ бензилпенициллин

~ левомицетин

~ олеандомицин

=стрептомицин

}

Назвать группу антибиотиков, механизм антимикробного действия которых, в основном, связан с нарушением синтеза клеточной стенки {

~ аминогликозиды

~ макролиды

~ тетрациклины

=цефалоспорины

~ полимиксины

}

Назвать антибиотик, оказывающий преимущественно бактериостатическое действие {

- ~ стрептомицин
 - ~ оксациллин
 - ~ бензилпенициллин
 - ~ гентамицин
 - =эритромицин
- }

Отметить биосинтетический пенициллин {

- ~ метициллин
 - ~ карбенициллин
 - =бензилпенициллина натриевая соль
 - ~ оксациллин
 - ~ ампициллин
- }

Назвать препарат из группы пенициллинов, обладающий широким спектром действия {

- ~ бензилпенициллин
 - ~ метициллин
 - =ампициллин
 - ~ оксациллин
 - ~ бициллин
- }

Назвать антибиотик, образующий хелатные соединения с ионами магния, кальция {

- ~ бензилпенициллин
 - ~ левомицетин
 - ~ олеандомицин
 - =тетрациклин
 - ~ цефалоридин
- }

Что характерно для левомицетина {

- ~ действует преимущественно на грамположительные бактерии
- =имеет широкий спектр действия
- ~ плохо всасывается из ЖКТ

- ~ не связывается с белками плазмы
- ~ действует преимущественно на грамотрицательные бактерии
- }

Назвать препарат из группы цефалоспоринов, активный в отношении синегнойной палочки {

- ~ цефалотин
- =цефоперазон
- ~ цефатоксим
- ~ цефалексин
- ~ цефаклор
- }

Назвать антибиотик, оказывающий преимущественно бактерицидное действие {

- =цефалоридин
- ~ эритромицин
- ~ олеандомицин
- ~ тетрациклин
- ~ левомицетин
- }

Назвать препарат, устойчивый к действию пенициллиназы {

- ~ бензилпенициллин
- ~ ампициллин
- ~ бициллин
- =оксациллин
- ~ карбенициллин
- }

К группе аминогликозидов относятся все препараты, кроме {

- ~ стрептомицина
- ~ неомицина
- ~ гентамицина
- ~ канамицина
- =полимиксина М
- }

Какой из антибиотиков устойчив к кислой среде желудка {

~ бензилпенициллин
=ампициллин
~ метициллин
~ карбенциллин
~ бициллин
}

Назовите антибиотики, к которым развивается быстрая устойчивость микроорганизмов{

~%-33.33333% левомецетин
~ %50% стрептомицин
~ %50%рифампицин
~%-33.33333% пенициллин
~%-33.33333% олеандомицин
}

Какие из побочных эффектов неаллергической природы характерны для пенициллина{

~ %50% воспаление слизистой языка и ротовой полости
~%-33.33333% угнетение кроветворения
~%-33.33333% угнетение функций почек
~ %50% суперинфекция
~%-33.33333% угнетение функций VIII пары черепно-мозговых нервов
}

Какие из следующих пенициллинов являются плохо растворимыми солями и действуют длительно{

~ %50% бензилпенициллина новокаиновая соль
~ %50% бициллины
~%-33.33333% бензилпенициллина натриевая соль
~%-33.33333% ампициллин
~%-33.33333% феноксиметилпенициллин
}

К полусинтетическим пенициллинам, устойчивым к пенициллиназе относятся{

~ %50% оксациллина натриевая соль
~%-33.33333% бензилпенициллин
~%-33.33333% феноксиметилпенициллин

~ %50% диклоксациллин
~%33.33333% ампициллин
}

Какие из цефалоспоринов предназначены только для энтерального применения{
~%33.33333% цефепим
~%33.33333% цефотаксим
~ %50% цефаклор
~%33.33333% цефалотин
~ %50% цефиксим
}

В чём заключается механизм действия эритромицина{
~ нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны
~ нарушение синтеза РНК
=нарушение синтеза белка рибосомами микроорганизмов
~ нарушение синтеза клеточной стенки
~ разрушение ядерного аппарата клетки микроорганизма
}

Отметить полусинтетические пенициллины{
~%33.33333% бензилпенициллина натриевая соль
~%33.33333% бензилпенициллина новокаиновая соль
~ %50% оксациллин
~ %50% ампициллин
~%33.33333% бициллин
}

Отметить основные свойства цефалоридина{
~ %50% имеет широкий спектр действия
~ %50% действует бактерицидно
~%33.33333% действует бактериостатически
~%33.33333% разрушается бета-лактамазой
~%33.33333% применяется внутрь(per os)
}

Отметить инфекции, в отношении которых активны тетрациклины{
~ %50% бациллярная дизентерия

~ 50% брюшной тиф
~ 33.33333% малярия
~ 33.33333% грипп
~ 33.33333% кандидамикоз
}

С чем связан механизм действия тетрациклинов {
~ разрушением клеточной стенки микроорганизма
~ нарушением синтеза РНК
= угнетением внутриклеточного синтеза белка рибосомами бактерий
~ нарушением проницаемости цитоплазматической мембраны
~ разрушением ядерного аппарата клетки микроорганизмов
}

Что характерно для левомицетина {
~ 50% имеет широкий спектр действия
~ 33.33333% действует бактерицидно
~ 50% действует бактериостатически
~ 33.33333% из ЖКТ всасывается плохо
~ 33.33333% устойчивость микроорганизмов развивается быстро
}

Какие побочные эффекты характерны для левомицетина {
~ 50% угнетение кроветворения
~ 50% поражение кожных покровов (сыпь, дерматит)
~ 33.33333% тромбоцитопеническая пурпура
~ 33.33333% гемералопия (куриная слепота)
~ 33.33333% ксерофтальмия (сухость роговицы)
}

Какие из нижеперечисленных антибиотиков относятся к группе аминогликозидов {
~ 33.33333% бензилпенициллин
~ 33.33333% тетрациклин
~ 50% гентамицин
~ 50% стрептомицин
~ 33.33333% цефамизин
}

Какие из побочных эффектов наиболее характерны для стрептомицина {
~ экстрапирамидные расстройства
~ анемия
=поражение вестибулярной ветви VIII пары черепно-мозговых нервов
~ фотосенсибилизация
~ психозы
}

Отметить механизм антимикробного действия полимиксина М сульфата {
=повреждающее действие на цитоплазматическую мембрану
~ нарушение синтеза белка
~ нарушение синтеза клеточной стенки за счёт угнетения синтеза миколовых кислот
~ нарушение синтеза РНК
~ разрушение ядерного аппарата бактерий
}

Отметить препараты сульфаниламидов, применяемые для резорбтивного действия {
~ 33.33333% фталазол
~ 33.33333% сульгин
~ 50% этазол
~ 50% сульфадимезин
~ 33.33333% сульфазин серебряная соль
}

Какой препарат из сульфаниламидов оказывает сверхдлительное действие {
~ фталазол
~ сульфазин
=сульфален
~ уросульфан
~ сульфацил-натрий
}

Укажите препарат сульфаниламидов только для местного применения {
~ сульфапиридазин
~ этазол
=сульфацил - натрий
~ сульфален

~ уросульфан
}

Отметить механизмы антибактериального действия сульфаниламидов {
~ нарушения синтеза клеточной стенки микроорганизмов
~ изменения проницаемости мембраны клеток микроорганизма
=конкурентный антагонизм с парааминобензойной кислотой в процессе синтеза фолиевой кислоты
~ угнетение синтеза белка рибосомами бактериальной клетки
~ нарушения синтеза РНК
}

Чем объяснить, что фталазол применяется только для лечения кишечных инфекций (бактериальной дизентерии и энтероколитов) {
~ превосходит другие сульфаниламиды по активности в отношении кишечных инфекций
~ обладает только местным противовоспалительным эффектом
=препарат почти не всасывается в кровь, в связи с чем создаётся высокая концентрация его в ЖКТ
~ быстро снижается его концентрация в плазме за короткий период
~ медленно достигается бактериостатическая концентрация в крови
}

Почему уросульфан наиболее эффективен при инфекциях мочевыводящих путей {
~ превосходит другие сульфаниламиды по активности
~ не всасывается в ЖКТ
=выделяется в неизменном виде, быстро через почки, в связи с чем, в моче создаются высокие концентрации препарата
~ быстро биотрансформируется в печени
~ выделяется в неизменном виде через кишечник
}

Какие осложнения характерны для сульфаниламидов {
~ 50% анемия
~ 33.33333% снижение зрения
~ 50% кристаллурия
~ 33.33333% алоpecia (облысение)
~ 33.33333% снижение слуха

}

Отметить комбинированные препараты сульфаниламидов с триметопримом {

~ %-33.33333% сульфадимезин

~ %-33.33333% фталазол

~ %50% бисептол

~ %50% сульфатон

~ %-33.33333% сульгин

}

Почему триметоприм усиливает антибактериальную активность сульфаниламидов {

~ усиливает способность сульфаниламидов конкурировать с парааминобензойной кислотой

~ разрушает цитоплазматическую проницаемость мембраны микробной клетки

=угнетает дегидрофолатредуктазу, блокируя тем самым переход дегидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолевую

~ нарушает синтез белка на уровне рибосом

~ разрушает клеточную стенку бактерий

}

Какие препараты относятся к производным хинолона {

~ нитроксалин

~ фуродонин

=кислота налидиксовая

~ энтеросептол

~ диоксидин

}

Отметить препараты фторхинолонов {

~ неграм

~ бактрим

=офлоксацин

~ левомицетин

~ нистатин

}

Что характерно для фторхинолонов {

~%-33.33333% имеет узкий спектр антимикробного действия
~%-33.33333% высокая активность в отношении грамположительных бактерий
~ %50% высокая активность в отношении грамотрицательных бактерий
~%50% оказывает бактерицидное действие
~%-33.33333% оказывает бактериостатическое действие
}

Какой из препаратов относится к производным 8-оксихинолина {
~ фуразолидон
~ кислота налидиксовая
~ этамбутол
=нитроксолин
~ офлоксацин
}

Отметить противосифилитические препараты {
=бензилпенициллин
~ фуразолидон
~ невиврамон
~ нистатин
~ амфотерицин В
}

Что характерно для офлоксацина (таривид) {
~%-33.33333% является антибиотиком узкого спектра действия
~%-33.33333% является антибиотиком резерва
~ %50% обладает бактерицидным действием
~%-33.33333% обладает бактериостатическим действием
~ %50% механизм действия заключается в угнетении синтеза РНК
}

Противовирусные средства {
~%-20%Изониазид.
~%-20%Рифампицин.
~%-20%Фурадонин.
~%33.33333%Ремантадин.
~%33.33333%Интерферон.
~%-20%Фуразолидон.

~%-20%Кислота налидиксовая.
~%33.33333%Оксолиновая мазь.
}