

Местные анестетики производные сложных эфиров {
~%50%Танин.
~%50%Лидокаин.
~%50%Новокаин.
~%50%Анестезин.
}

Местноанестезирующие средства, относящиеся к группе замещенных амидов {
~%25%Ультракаин.
~%50%Новокаин.
~%25%Лидокаин.
~%50%Анестезин.
~%25%Тримекаин.
~%25%Пиромекаин.
}

Препараты, используемые для инфильтрационной анестезии {
~%50%Раствор новокаина 5%.
~%50% Раствор лидокаина 10%.
~%50%Тримекаин.
~%50% Раствор новокаина 0,5%.
}

Препараты, используемые для проводниковой анестезии {
~%50%Новокаин.
~%50%Лидокаин.
~%50%Анестезин.
~%50%Пиромекаин.
}

Показания к применению лидокаина {
~%100%Для внутривенного наркоза.
~%33.33333%Для инфильтрационной анестезии.
~%33.33333%При желудочковой экстрасистолии и тахикардии.
~%33.33333%Для проводниковой анестезии.
}

Характерно для токсического действия местноанестезирующих средств {

~%-50%Резкое повышение артериального давления.
~%33.33333%Урежение ритма сердечных сокращений
~%33.33333%Головокружение
~%33.33333%Аллергические реакции
~%-50%Резкие боли в животе.
}

Вяжущие и раздражающие вещества {
~%-50%Ментол
~%-50%Новокаин.
~%-50%Горчичники.
~%-50%Лидокаин.
}

Характерно для вяжущих средств {
~%-50%Образуют плотные альбуминаты на поверхности ткани
~%-50%Блокируют фермент холинэстеразу.
~%-50%Истощают депо медиатора в гранулах.
~%-50%Понижают проницаемость сосудистой стенки
}

Вещество, блокирующие одновременно М- и Н- холинорецепторы {
~Прозерин.
~Физостигмин.
~Дипироксим.
=Циклодол.
}

Выберите антихолинэстеразные вещества {
~%-50%Карбахолин.
~%-50%Тримекаин.
~%-50%Прозерин
~%-50%Галантамин
}

Антихолинэстеразное вещество необратимого действия {
~Прозерин.
~Физостигмин.
=Армин

~Дипироксим.
}

Антихолинэстеразные вещества обратимого действия {
~%50%Прозерин.
~%50%Дипироксим.
~%50%Галантамин
~%50%Мезатон
}

Вещества, стимулирующие одновременно М- и Н- холинорецепторы {
~%50%Карбахолин.
~%50%Танин.
~%50%Физостигмин.
~%50%Ацетилхолин.
}

Влияние антихолинэстеразных препаратов на глаз {
~%33.33333%Вызывают сужение зрачков.
~%33.33333%Повышают внутриглазное давление.
~%33.33333%Вызывают спазм аккомодации.
~%33.33333%Вызывают расширение зрачков.
~%33.33333%Вызывают паралич аккомодации.
~%33.33333%Снижают внутриглазное давление.
}

Показания к назначению антихолинэстеразных средств {
~%25%Миастения
~%25%Глаукома.
~%33.33333%Почечная колика.
~%25%Атония кишечника.
~%33.33333%Бронхиальная астма.
~%33.33333%Желчнокаменная болезнь.
~%25% Атония мочевого пузыря
}

Вещества, применяемые для лечения глаукомы {
~%50%Танин.
~%33.33333%Армин.

~%33.33333%Физостигмин.
~%50%Лидокаин.
~%33.33333%Прозерин
}

Реактиваторы холинэстеразы {
~%-33.33333%Гигроний.
~%-33.33333%Прозерин.
~%50%Дипироксим.
~%-33.33333%Галантамин.
~%50% Изонитрозин.
}

Вещества, относящиеся к группе М – холиноблокаторов {
~%-25%Пилокарпин.
~%25%Атропин.
~%25%Скополамин.
~%-25%Пентамин.
~%25%Метацин.
~%25%Платифиллин.
~%-25%Диплацин.
~%-25%Пахикарпин.
}

Эффекты, возникающие при действии М-холиноблокаторов {
~%25%Мидриаз и повышение внутриглазного давления.
~%-50%Спазм аккомодации.
~%25%Ослабление секреции желез.
~%25%Понижение тонуса гладкой мускулатуры.
~%25%Тахикардия.
~%-50%Бронхоспазм.
}

Показания для использования М-холиноблокаторов {
~%33.33333%Спазм гладких мышц внутренних органов.
~%-33.33333% Миастения.
~%-33.33333% Глаукома.
~%-33.33333% Атония кишечника.
~%33.33333%Брадикардия.

~%33.33333%Воспалительные заболевания глаза.
}

Симптомы, возникающие при отравлении атропином {
~%20%Двигательное и речевое возбуждение.
~%-33.33333%Сонливость.
~%-33.33333% Рвота.
~%20% Повышение температуры тела.
~%20%Сухость слизистых оболочек.
~%20%Галлюцинации.
~%-33.33333%Миоз.
~%20%Мидриаз.
}

Меры помощи при передозировке М – холиноблокаторов {
~%-100%Введение реактиваторов ацетилхолинэстеразы.
~%20%Введение антихолинэстеразных средств.
~%20%Промывание желудка.
~%20%Солевые слабительные.
~%20%Искусственное дыхание.
~%20% Назначение снотворных.
}

Локализация Н-холинорецепторов {
~%25%Окончания двигательных нервов.
~%-100%Окончания парасимпатических нервов.
~%25%Клубочки каротидных синусов.
~%25%Хромаффинные клетки надпочечников.
~%25%Центральная нервная система.
}

Вещества, относящиеся к группе Н – холиноблокаторов {
~%-20%Пилокарпин.
~%-20%Атропин.
~%-20%Скополамин.
~%33.33333%Пентамин.
~%-20%Метацин.
~%-20%Платифиллин.
~%33.33333%Диплацин.

~%33.33333%Пахикарпин.
}

Ганглиоблокирующие средства {
~%-50%Атропин.
~%20%Бензогексоний.
~%20%Пирилен.
~%-50%Платифиллин.
~%20%Гигроний.
~%20%Арфонад.
~%20%Пентамин.
}

Эффекты, которые наблюдаются при применении ганглиоблокаторов {
~%33.33333%Снижение артериального давления.
~%33.33333%Угнетение моторики ЖКТ.
~%-50%Миоз.
~%-50%Повышение тонуса гладкой мускулатуры.
~%33.33333%Понижение секреции желез.
}

Показания к применению ганглиоблокаторов {
~%-50%Ортостатический коллапс.
~%25%Спазм периферических сосудов.
~%-50%Атония кишечника.
~%25%Управляемая гипотония.
~%25%Гипертонический криз.
~%25%Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
}

Побочные эффекты ганглиоблокаторов {
~%-100%Гипертонический криз.
~%33.33333%Сухость слизистых оболочек.
~%33.33333%Атония кишечника.
~%33.33333%Ортостатический коллапс.
}

Миорелаксанты антидеполяризующего типа действия {
~%-20%Дитилин.

- ~%50%Панкурония бромид.
- ~%20%Метацин.
- ~%20%Платифиллин.
- ~%20%Арфонад.
- ~%20%Скополамин.
- ~%50%Тубокурарин.

}

Миорелаксанты деполяризующего типа действия {

- =Дитилин.
- ~Пирилен.
- ~Диплацин.
- ~Гигроний.
- ~Метацин.
- ~Тубокурарин.

}

Механизм действия дитилина {

- ~%50%Вызывает блокаду М-холинорецепторов.
- ~%50%Вызывает стойкую деполяризацию мембраны.
- ~%50%Нарушает нервно-мышечную передачу.
- ~%50% Блокирует Н-холинорецепторы по типу конкуренции с ацетилхолином.

}

Атропин устраняет брадикардию и АВ-блокаду, так как {

- =Блокирует М-холинорецепторы и уменьшает влияние блуждающего нерва на сердце
- ~Стимулирует β -адренорецепторы и повышает активность симпатической нервной системы.
- ~Блокирует медленные кальциевые каналы и снижает сократимость миокарда.
- ~Блокирует калиевые каналы и замедляет скорость реполяризации.

}

Противопоказанием к применению атропина является {

- ~Почечная колика.
- ~Язвенная болезнь желудка.
- ~Острый миокардит.

=Глаукома.
~Миастения.
}

Показанием к применению атропина в качестве средства неотложной помощи является {
~Анафилактический шок.
=АВ-блокада.
~Передозировка периферических миорелаксантов.
~Гипогликемическая кома.
~Гипертонический криз.
}

Нежелательным эффектом при применении атропина является {
=Сухость во рту.
~Бронхоспазм.
~Брадикардия.
~Повышение внутричерепного давления.
~Ортостатическая гипотензия.
}

α – адреномиметики {
~25%Эфедрин.
~25%Резерпин.
~25%Адреналин.
~33.33333%Мезатон.
~25%Метилдофа.
~33.33333% Галазолин.
~33.33333%Нафтизин
}

β -адреномиметики {
~25%Лобелин.
~33.33333%Орципреналин.
~25%Эфедрин.
~33.33333%Изадрин.
~25%Анаприлин.
~25% Резерпин.
~33.33333%Сальбутамол.

}

Данная группа веществ повышает АД, ЧСС, увеличивает АВ (атриовентрикулярную) проводимость, усиливает гликогенолиз, снижает тонус бронхов {

~М-холиноблокаторы.

~Симпатолитики.

= α - и β -адреномиметики.

~ α – адреномиметики.

~Ганглиоблокаторы.

}

Эффекты эфедрина {

~%50%Понижает артериальное давление.

~%25%Расширяет бронхи.

~%25%Расширяет зрачок.

~%50%Ослабляет работу сердца.

~%25%Повышает артериальное давление.

~%25%Возбуждает ЦНС.

}

Механизм действия резерпина {

~Блокирует ганглионарные синапсы адренергических нервов.

~Блокирует адренорецепторы.

~Усиливает выброс медиатора.

~Уменьшает обратный нейрональный захват медиатора.

=Истощает запасы медиатора в гранулах вследствие ускорения его утечки.

}

Фармакологические эффекты α -адреномиметиков {

~%50%Блокируют симпатические ганглии.

~%50%Повышают артериальное давление.

~%50%Расширяют бронхи.

~%50%Суживают сосуды.

}

Показания к применению α -адреноблокаторов {

~%50%Острая гипотензия.

~%25%Гипертоническая болезнь.

~%25%Расстройства периферического кровообращения.
~%25%Феохромоцитомы.
~%25%Мигрень.
~%-50%Бронхиальная астма.
}

Фармакологические эффекты изадрина {
~%-50%Повышает артериальное давление.
~%25%Расширяет бронхи.
~%25%Усиливает работу сердца.
~%-50%Расширяет зрачок.
~%25%Вызывает гипергликемию.
~%25%Снижает артериальное давление.
}

Показания для использования β -адреноблокаторов {
~%33.33333%Ишемическая болезнь сердца.
~%33.33333%Гипертоническая болезнь.
~%-33.33333% Бронхиальная астма.
~%-33.33333%Острая сосудистая недостаточность.
~%-33.33333%Стимуляция родовой деятельности.
~%33.33333%Нарушение ритма сердечных сокращений (тахикардия).
}

Нежелательным эффектом при применении адреналина является {
~Брадикардия.
=Артериальная гипертензия.
~Гипогликемия.
~Повышение внутриглазного давления.
~Отек слизистых оболочек.
}

Терапевтически значимым фармакологическим эффектом пропранолола является {
=Понижение силы и частоты сокращений сердца.
~ Повышение продукции внутриглазной жидкости.
~Понижение тонуса бронхов.
~Повышение секреции ренина.

~ Повышение автоматизма и улучшение атриовентрикулярной проводимости в миокарде.
}

Показанием к применению адреналина как средства неотложной помощи является {
=Анафилактический шок.
~ Отек легких.
~Гипертонический криз.
~Пароксизмальная желудочковая тахикардия.
~Кетоацидотическая кома.
}

Терапевтически значимым фармакологическим эффектом α -адреноблокаторов является {
~Повышение АД.
~Повышение частоты сокращений сердца.
~Расслабление сфинктеров.
~Сужение зрачка.
=Понижение АД.
}

Что характерно для новокаина {
~%-33.33333% эффективность при всех видах анестезии
~%50% эффективность при инфильтрационной и проводниковой анестезии
~%-33.33333% высокая токсичность
~%50% низкая токсичность
~%-33.33333% эффективность при терминальной анестезии
}

Что характерно для лидокаина {
~ %50% эффективен при всех видах анестезии
~%-33.33333% неэффективен при терминальной анестезии
~ %50% анестезирующая активность выше, чем у новокаина
~%-33.33333% анестезирующая активность ниже, чем у новокаина
~%-33.33333% высокая токсичность
}

Что характерно для анестезина {

~%-33.33333% использование для всех видов анестезии
~%-33.33333% использование для инфильтрационной и проводниковой анестезии
~ %50% использование для терминальной анестезии
~%-33.33333% хорошая растворимость в воде
~ %50% плохая растворимость в воде
}

Отметить вещества, применяемые только для терминальной анестезии {
~%-33.33333% тримекаин
~%-33.33333% совкаин
~%-33.33333% лидокаин
~ %50% дикаин
~ %50% анестезин
}

Отметить вещества, применяемые для инфильтрационной анестезии {
~ %50% тримекаин
~%-33.33333% совкаин
~%-33.33333% анестезин
~%-33.33333% дикаин
~ %50% новокаин
}

Указать раздражающие средства {
~%-33.33333% слизь крахмала
~ %50% горчичники
~%-33.33333% уголь активированный
~ %50% ментол
~%-33.33333% висмута нитрат основной
}

Какие из этих препаратов относятся к группе обволакивающих средств {
~ цинка сульфат
~ меди сульфат
~ магния сульфат
~ серебра нитрат
=слизь крахмала
}

Указать раздражающее средство, входящее в состав таблеток применяемых для лечения стенокардии {

~ лидокаин

~ масло терпентинное очищенное

=ментол

~ висмута нитрат основной

~ анестезин

}

Средство для рефлекторной стимуляции дыхания {

=цититон

~пентамин

~пирилен

~атропина сульфат

~тропикамид

}

Какие препараты следует назначать при отравлении ФОС {

~%-33.33333% пилокарпин

~%-33.33333% ацетилхолин

~%50% атропина сульфат

~%-33.33333% адреналина гидрохлорид

~%50% дипироксим

}

Указать М-холиноблокирующие средства {

~ %50% метацин

~%-33.33333% дитилин

~%-33.33333% гигроний

~%50% платифиллин

~%-33.33333% армин

}

Какие препараты не относятся к группе М – холиноблокаторов {

~%-33.33333% цититон

~%50% тубокурарин

~%50% прозерин

~%-33.33333% скопаламин

~%-33.33333% платифилин

}

Указать побочные эффекты тубокурарина{

~%50% снижение артериального давления

~%-33.33333% повышение артериального давления

~%-33.33333% аритмия сердечных сокращений

~%-33.33333% мышечные боли в послеоперационном периоде

~%50% бронхоспазм

}

Применение атропина перед оперативным вмешательством связано с его способностью{

~%50% подавлять секрецию слюнных, носоглоточных, трахеобронхиальных желез

~%50% предупреждать отрицательные рефлексy блуждающего нерва на сердце

~%-33.33333% сужение зрачков и снижение внутриглазного давления

~%-33.33333% угнетать нервно-мышечную проводимость

~%-33.33333% вызывать миопию

}

Указать побочные эффекты дитилина{

~%50% аритмия сердечных сокращений

~%50% мышечные боли в послеоперационном периоде

~%-33.33333% бронхоспазм

~%-33.33333% фотофобия

~%-33.33333% повышение температуры тела

}

Указать курареподобное средство короткого действия{

=дитилин

~тубокурарин

~пипекуроний

~панкуроний

~атракурий

}

Укажите бронхолитическое средство из группы М –холиноблокаторов{

~мезатон

~мукалтин
=метацин
~метагид
~метиндол
}

Ганглиоблокатор, показанный при гипертоническом кризе {
=пентамин
~пентагастрин
~парацетамол
~пентоксил
~пирантел
}

Курареподобное средство, антагонистом, которого является прозерин {
~дителин
~диоксоний
=тубокурарин
~пентамин
~бензогексоний
}

Средство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки из группы М-холиноблокаторов {
~дителин
~гигроний
~арфонад
=пирензепин
~бензогексоний
}

Какими свойствами обладает атропин, в отличие от всей группы М-холиноблокаторов {
~стимулирует дыхательный центр
~оказывает седативное действие
=вызывает самый длительный миоз и паралич аккомодации
~расширяет бронхи
~предупреждает рефлекторную брадикардию
}

Какие из перечисленных препаратов вызывают обострение язвенной болезни {

- ~%-33.33333% атропин
 - ~%-33.33333% бензогексоний
 - ~%50% галантамин
 - ~%50% октадин
 - ~%-33.33333% пентамин
- }

Отметить М -холиномиметические средства {

- ~%50% ацеклидин
 - ~%-33.33333% галантамин
 - ~%-33.33333% цититон
 - ~%50% пилокарпин
 - ~%-33.33333% физостигмин
- }

Отметить показания к назначению М – холиномиметиков {

- ~%-33.33333% миастения
 - ~%50% глаукома
 - ~%50% атония кишечника
 - ~%-33.33333% бронхиальная астма
 - ~%-33.33333% почечная колика
- }

Какие эффекты М - холиномиметиков имеют фармакотерапевтическую ценность {

- ~%-33.33333% расширение зрачков
 - ~%50% снижение внутриглазного давления
 - ~%-33.33333% спазм аккомодации
 - ~%50% повышение тонуса кишечника и мочевого пузыря
 - ~%-33.33333% усиление секреции бронхиальных желез
- }

Указать вещество, возбуждающее только М – холинорецепторы {

- =ацеклидин
- ~скополамин
- ~платифилин
- ~метацин

~лобелин
}

Указать вещества, возбуждающие только Н – холинорецепторы {
~%-33.33333% атропина сульфат
~%50% цититон
~%-33.33333% пилокарпин
~%50% лобелин
~%-33.33333% платифилин
}

Отметить антихолинэстеразное средство {
~карбахолин
~пилокарпин
~ацеклидин
=прозерин
~атропина сульфат
}

Какие эффекты возникают при применении антихолинэстеразных средств в терапевтических дозах {
~%50% сужение зрачков и снижение внутриглазного давления
~%-33.33333% расширение зрачков и повышение внутриглазного давления
~%-33.33333% тахикардия и повышение артериального давления
~%50% брадикардия и снижение артериального давления
~%-33.33333% угнетение нервно- мышечной передачи
}

Отметить показания к назначению антихолинэстеразных средств {
~ %50% миастения
~%-33.33333% отравление М-холиномиметиками
~%-33.33333% почечная колика
~%-33.33333% бронхиальная астма
~%50% атония кишечника и мочевого пузыря
}

Какие вещества применяют при лечении атонии кишечника и мочевого пузыря {
~%-33.33333% цититон

~%-33.33333% пилокарпин
~%50% прозерин
~%50% физостигмина салицилат
~%-33.33333% армин
}

Отметить антихолинэстеразные средства обратимого действия{

~%50% физостигмина салицилат
~%-33.33333% армин
~%-33.33333% фосфакол
~%50% прозерин
~%-33.33333% ацеклидин
}

Отметить антихолинэстеразные средства необратимого действия{

~%-33.33333% ацеклидин
~%50% фосфакол
~%-33.33333% прозерин
~%50% армин
~%-33.33333% карбахолин
}

При отравлении ФОС целесообразно назначать{

~%50% М -холиноблокаторы
~%50% реактиваторы холинэстеразы
~%-33.33333% адреноблокаторы
~%-33.33333% М - холиномиметики
~%-33.33333% ганглиоблокаторы
}

Отметить антихолинэстеральное средство, проникающее через гемато-энцефалический барьер{

~прозерин
=галантамин
~физостигмин
~оксазил
~эдрофоний
}

Отметить средство, облегчающее нервно - мышечную передачу{

~карбахолин

=прозерин

~цититон

~атропина сульфат

~адреналина гидрохлорид

}

Указать эффекты, связанные с возбуждением бета2 – адренорецепторов{

~%-33.33333% усиление сокращений сердца

~%-33.33333% ослабление сокращений сердца

~%50% расширение кровеносных сосудов

~%-33.33333% спазм бронхов

~%50% расслабление мышц бронхов

}

Какие вещества возбуждают преимущественно альфа –адренорецепторы{

~%-33.33333% адреналин

~%50% норадреналин

~%50% нафтизин

~%-33.33333% изадрин

~%-33.33333% сальбутамол

}

Указать основной механизм действия эфедрина{

~угнетение моноаминооксидазы

~непосредственное возбуждение адренорецепторов

=усиление освобождения норадреналина из окончаний адренергических волокон

~угнетение освобождения норадреналина из окончаний адренергических волокон

~возбуждение альфа и бета -адренорецепторов

}

Указать механизм действия изадрина{

~возбуждение альфа и бета -адренорецепторов

~блокада альфа и бета - адренорецепторов

~преимущественное возбуждение бета1 -адренорецепторов

~преимущественное возбуждение бета2 -адренорецепторов

=возбуждение бета1 и бета2 -адренорецепторов
}

Указать механизм действия сальбутамола: {
~возбуждение альфа и бета -адренорецепторов
~блокада альфа и бета - адренорецепторов
~преимущественное возбуждение бета1 -адренорецепторов
=преимущественное возбуждение бета2 -адренорецепторов
~возбуждение бета1 и бета2-адренорецепторов
}

В каких случаях применяют адреналин {
~%33.33333% при атонии кишечника
~%33.33333% при гипертонической болезни
~%50% при анафилактическом шоке
~%50% при бронхиальной астме
~%33.33333% при облитерирующем эндартериите
}

Какие препараты относятся к группе альфа- адреномиметиков {
~%50% нафтизин
~%33.33333% адреналина гидрохлорид
~%50% галазолин
~%33.33333% фенотерол
~%33.33333% добутамин
}

Перечислите препараты, относящиеся к бета – адреномиметикам {
~%33.33333% мезатон
~%50% изадрин
~%33.33333% норадреналина гидротартрат
~%33.33333% галазолин
~%50% тербуталин
}

Какие вещества применяют при бронхиальной астме {
~%33.33333% анаприлин
~%50% сальбутамол
~%33.33333% атенолол

~%50% фенотерол
~%-33.33333% норадреналин
}

Какие вещества применяют местно при ринитах{

~%-33.33333% анаприлин
~%50% нафтизин
~%50% галазолин
~%-33.33333% изадрин
~%-33.33333% салбутамол
}

Укажите адреноблокирующие средства{

~%-33.33333% адреналин
~%50% фентоламин
~%-33.33333% норадреналин
~%50% анаприлин
~%-33.33333% изадрин
}

Укажите средства, блокирующие альфа – адренорецепторы{

~%-33.33333% окспренолол
~%50% празозин
~%-33.33333% талинолол
~%50% доксазозин
~%-33.33333% фенотерол
}

Укажите средства, блокирующие бета – адренорецепторы{

~%-33.33333% празозин
~%50% метопролол
~%-33.33333% нафтизин
~%50% анаприлин
~%-33.33333% лабеталол
}

Укажите средства, блокирующие бета1 и бета2 –адренорецепторы{

~%-33.33333% метопролол
~%-33.33333% талинолол

☐ 50% анаприлин
☐ 33.33333% атенолол
☐ 50% окспренолол
{

Укажите средства, стимулирующие альфа и бета – адренорецепторы {
☐ 33.33333% изадрин
☐ 33.33333% нафтизин
☐ 50% адреналин
☐ 50% норадреналин
☐ 33.33333% талинолол
}

Укажите средства, блокирующие альфа и бета –адренорецепторы {
☐ адреналин
☐ мезатон
☐ фенотерол
☐ лабеталол
☐ норадреналин
}

Какие из перечисленных ниже препаратов, показаны при стенокардии {
☐ 50% анаприлин
☐ 33.33333% адреналин
☐ 50% метапролол
☐ 33.33333% фентоламин
☐ 33.33333% мезатон
}

Отметить побочные эффекты анаприлина {
☐ 33.33333% тахикардия
☐ 50% сердечный блок
☐ 33.33333% снижение тонуса периферических сосудов
☐ 50% бронхоспазм
☐ 33.33333% все ответы верны
}

Показания к применению метопролола {
☐ 50% артериальная гипертензия

~%-33.33333% артериальная гипотония
~%50% сердечные аритмии, стенокардия
~%-33.33333% при кардиогенном и геморрагическом шоке
~%-33.33333% бронхиальная астма
}

Отметить адреномиметик непрямого действия{
~октадин
~резерпин
=эфедрин
~адреналин
~норадреналин
}

Отметить симпатолитик{
=октадин
~адреналин
~эфедрин
~атеналол
~лабеталол
}

Отметить механизм действия октадина{
~%50% уменьшение содержания норадреналина (НА) в варикозных утолщениях
~%-33.33333% увеличение содержания НА в варикозных утолщениях
~%50% нарушение процесса депонирования НА в везикулах
~%-33.33333% блокирует альфа и бета адренорецепторы
~%-33.33333% стимулируют альфа и бета -адренорецепторы
}

Отметить механизм действия резерпина{
~%50% уменьшение содержания норадреналина (НА) в варикозных утолщениях
~%-33.33333% увеличение содержания НА в варикозных утолщениях
~%50% нарушение процесса депонирования НА в везикулах
~%-33.33333% блокирует альфа1 и бета2 -адренорецепторы
~%-33.33333% блокирует бета1 и бета2 -адренорецепторы
}

Отметить побочные эффекты резерпина {
~%-33.33333% бессонница
~%-33.33333% тахикардия
~%50% брадикардия
~%50% отеки
~%-33.33333% ортостатический коллапс
}

Наиболее длительное гипотензивное действие отмечается при применении {
~бензогексония
=резерпина
~фентоламина
~анаприлина
~арфонада
}

Наиболее избирательно влияет на бронхи {
~адреналин
~эфедрин
~изадрин
=сальбутамол
~резерпин
}

Указать препарат, который вызывает наиболее длительное расширение
зрачков глаз {
~скополамин
~эфедрин
~платифиллин
=атропин
~адреналин
}

Какой препарат из группы адrenoблокаторов используется для лечения
глаукомы {
~октадин
=анаприлин
~резерпин
~лабеталол

~празозин

}

Отметить препараты, применяемые при AV – блоке{

~%-33.33333% празозин

~%50% изадрин

~%-33.33333% пентамин

~%50% атропин

~%-33.33333% гигроний

}

Укажите механизм действия празозина{

~блокада альфа1 и альфа2 -адренорецепторов

=преимущественная блокада альфа1 -адренорецепторов

~преимущественная блокада альфа2 -адренорецепторов

~блокада альфа и бета - адренорецепторов

~блокада бета1 и бета2 -адренорецепторов

}

Указать механизм действия анаприлина{

~преимущественная блокада бета1 -адренорецепторов

~преимущественная блокада бета2 -адренорецепторов

=блокада бета1 и бета2 -адренорецепторов

~блокада альфа1 и альфа2 -адренорецепторов

~блокада альфа и бета – адренорецепторов

}

Указать механизм действия метопролола{

=преимущественная блокада бета1 -адренорецепторов

~преимущественная блокада бета2 -адренорецепторов

~блокада бета1 и бета2 -адренорецепторов

~блокада альфа и бета - адренорецепторов

~блокада альфа1 и альфа2 -адренорецепторов

}

Основной путь введения норадреналина{

~подкожный

~внутримышечный

=внутривенный капельный

~внутри через ЖКТ
~эффективен при любом пути введения
}

Отметить побочные эффекты норадреналина {
~%50% брадикардия, ухудшение кровоснабжения тканей
~%50% возможность некроза на месте введения
~%-33.33333% судороги
~%-33.33333% возможно развитие синдрома "отдачи"
~%-33.33333% нарушение кроветворения
}

Отметить показания к применению веществ, возбуждающих бета2 –
адренорецепторы {
~%-33.33333% артериальная гипотензия
~%50% бронхиальная астма
~%-33.33333% сердечные аритмии
~%50% блокада атриовентрикулярной проводимости
~%-33.33333% анафилактический шок
}

Указать механизм действия фентоламина {
=блокада альфа1 и альфа2 -адренорецепторов
~преимущественная блокада альфа1 -адренорецепторов
~преимущественная блокада альфа 2 -адренорецепторов
~блокада альфа и бета - адренорецепторов
~возбуждение альфа1 и альфа2 -адренорецепторов
}

К какому препарату с бронхолитическим действием быстро возникает
явление тахифалаксии {
~атропина сульфат
~адреналина гидрохлорид
=эфедрин
~сальбутамол
~изадрин
}