

В каких растениях содержатся сердечные гликозиды {

~%25%Наперстянка пурпуровая.

~%-50%Опийный мак.

~%-50%Красавка.

~%25%Строфант.

~%25%Горицвет весенний.

~%25%Майский ландыш.

}

Препараты наперстянки {

~%-25%Строфантин К.

~%-25%Коргликон

~%33.33333%Дигитоксин.

~%-25%Новокаинамид.

~%33.33333%Целанид.

~%-25%Аспаркам.

~%33.33333%Дигоксин.

}

Фармакологические препараты, применяемые при интоксикации сердечными гликозидами {

~%25%Калия хлорид.

~%25%Панангин.

~%-33.33333%Строфантин.

~%-33.33333%Гексенал.

~%-33.33333%Пентамин.

~%25%Унитиол.

~%25%Динатриевая соль ЭДТА.

}

Почему под действием сердечных гликозидов систолические сокращения становятся более энергичными и быстрыми {

~%-33.33333%Возбуждаются β -адренорецепторы.

~%25%Повышается уровень свободного ионизированного кальция в клетке и связывается тропонин-тропомиозиновый комплекс.

~%-33.33333%Нарушается трансмембранный транспорт Ca^{2+} внутрь клетки и расслабляются сосуды.

~%25%Способствуют освобождению внутриклеточного Ca^{2+} .

~%25%Увеличивают проникновение Ca^{2+} внутрь клетки.

~%-33.33333%Возбуждают пресинаптические альфа-адренорецепторы.

~%25%Активируют миозиновую АТФ-азу и способствуют взаимодействию актина и миозина.

}

К сердечным гликозидам относят {

~Допамин.

=Дигоксин.

~Адреналин.

~Пропранолол.

~Амлодипин.

}

К противоаритмическим средствам 1 класса (блокаторам натриевых каналов) относят {

~Верапамил.

~Пропранолол.

=Прокаинамид.

}

Верапамил вызывает {

~Блокаду α -адренорецепторов.

~ Блокаду натриевых каналов.

=Противоаритмическое и антигипертензивное действие.

~Синдром «отмены».

}

Лекарственное средство, являющееся блокатором медленных кальциевых каналов {

~Прокаинамид.

=Верапамил.

~Лидокаин.

}

Для купирования желудочковой аритмии при остром инфаркте миокарда применяют {

=Лидокаин.

~Атропин.

~Пропранолол.

~Верапамил.

~Адреналин.

}

Средство рефлекторного действия, устраняющее коронарospазм {

~Эуфиллин.

~Нитроглицерин.

~Сустан.

~ Нитросорбид.

~ Ретаболил.

=Валидол.

~Дипиридамон.

}

Вещества, улучшающие доставку кислорода к миокарду {

~%-50%Атенолол.

~%20%Сустан.

~%20%Нитроглицерин.

~%20%Валидол.

~%20%Верапамил.

~%-50%Анаприлин.

~%20%Нитросорбид.

}

Препараты, которые одновременно улучшают коронарный кровоток и снижают потребность миокарда в кислороде {

~%20%Сустан.

~%-50%Валидол.

~%-50%Дигоксин.

~%20%Нитроглицерин.

~%20% Нитросорбид.

~%20%Верапамил.

~%20%Нифедипин.

}

Средства, применяемые для купирования приступов стенокардии {

~%-20%Дифенин.

~%50%Нитроглицерин.

~%50%Нитросорбид.

~%-20%Папаверин.

~%-20% Ивабрадин.

~%-20%Но-шпа.
~%-20%Анаприлин.
}

Средства, снижающие потребность миокарда в кислороде {
~%-33.33333%Анаприлин.
~%-33.33333%Папаверин.
~%-33.33333%Сустак.
~%-33.33333%Но-шпа.
~%-33.33333% Ивабрадин
~%-33.33333% Метопролол
}

Характерно для клонидина {
~%-33.33333%Эффект развивается через несколько часов.
~%-33.33333%Истощает запасы медиатора в адренергических синапсах.
~%-25%Возбуждает пресинаптические α_2 -адренорецепторы.
~%-25%Обладает центральным антиадренергическим действием.
~%-25%Применяют при тяжелых формах гипертензии.
~%-25%Обладает психоседативным действием.
~%-33.33333%Применяется при коллапсе.
}

Группы препаратов, снижающих артериальное давление за счет влияния на периферический отдел нервной системы {
~%-33.33333%Альфа-адреномиметики.
~%-33.33333%Симпатолитики.
~%-33.33333%Бета-адреномиметики.
~%-33.33333%Ганглиоблокаторы.
~%-33.33333%Симпатомиметики.
~%-33.33333%Альфа-адреноблокаторы.
}

Антигипертензивные средства миотропного действия {
~%-50%Ангиотензинамид.
~%-20%Папаверин.
~%-20%Дибазол.
~%-50%Этакриновая кислота.
~%-20%Магния сульфат

~%20%Верапамил.
~%20%Нифедипин.
}

Препараты, снижающие артериальное давление за счет влияния на ренин-ангиотензиновую систему {

~%25%Каптоприл.
~%-33.33333%Ангиотензинамид.
~%25%Эналаприл.
~%-33.33333%Мезатон.
~%-33.33333%Адреналин.
~%25%Анаприлин.
~%25%Лозартан.
}

Препараты каких групп снижают артериальное давление, ограничивая работу сердца {

~%-33.33333%Бета-адреномиметики.
~%-33.33333%Симпатомиметики.
~%33.33333%Антагонисты кальция.
~%33.33333%Симпатолитики.
~%33.33333% Бета- адреноблокаторы.
~%-33.33333%Альфа- адреномиметики.
}

Каптоприл {

~Блокирует β -адренорецепторы.
=Ингибирует ангиотензин превращающий фермент.
~Может вызывать артериальную гипертензию.
~Применяют для лечения бронхиальной астмы.
~Противопоказан при сердечной недостаточности.
}

Дилтиазем {

~Блокирует α -адренорецепторы.
~Блокирует натриевые каналы.
=Оказывает противоаритмическое и антигипертензивное действие.
~Вызывает «синдром отмены».
~ Суживает бронхи.

}

Развитие ортостатической гипотензии возможно при введении {

~Гидрохлоротиазида.

~Пропранолола.

~Верапамила.

=Празозина

~Амиодарона.

}

Для купирования гипертонического криза применяют {

~Пропранолол.

=Клонидин.

~Гидрохлоротиазид.

~Резерпин.

~Амлодипин.

}

Механизм действия фуросемида {

~%25%Угнетает реабсорбцию ионов натрия в толстом сегменте восходящей петли нефрона.

~%25%Угнетает реабсорбцию ионов натрия в проксимальных канальцах.

~%25%Повышает секрецию ионов калия.

~%25%Усиливает почечный кровоток.

~%-100%Ингибирует карбоангидразу.

}

Указать механизм диуретического действия спиронолактона {

~Способствует выведению ионов калия из организма.

~Угнетает синтез альдостерона.

~Усиливает выведение ионов хлора.

=Конкурентно взаимодействует с альдостероновыми рецепторами почек.

~Повышает осмотическое давление в просвете почечных канальцев.

}

Диуретик, обладающий слабым эффектом {

~Циклометиазид.

~Торасемид

=Ацетазоламид.

~Этакриновая кислота.
~Фуросемид.
~Спинолактон.
~Гидрохлортиазид.
}

Указать препарат, применяемый для форсированного диуреза {
~Ацетазоламид.
~Циклометиазид.
~Триамтерен.
~Спинолактон.
=Фуросемид.
~Гидрохлортиазид.
}

Мочегонные средства, которые применяют для лечения гипертонической болезни {
~%20%Гидрохлортиазид.
~%20%Фуросемид.
~%20%Индапамид.
~%-100%Маннит.
~%20%Спинолактон.
~%20%Триамтерен.
}

Механизм диуретического действия спинолактона обусловлен {
~Блокадой карбоангидразы.
~Усилением клубочковой фильтрации.
~Угнетением синтеза альдостерона.
=Устранением влияния альдостерона на почечные каналы.
~Повышением осмотического давления в почечных каналах.
}

Диуретическое средство, действующее преимущественно в области петли Генле {
~Спинолактон.
~ Маннитол.
=Фуросемид.
~Индапамид.

~Гидрохлортиазид.
}

Как изменяется чувствительность миометрия к окситоцину при увеличении срока беременности {
~Снижается.
=Повышается.
~Не изменяется.
}

Показания к применению окситоцина {
~%25%Индукция родов.
~%25%Усиление родовой деятельности.
~%-100%Прерывание беременности.
~%25% Остановка послеродовых маточных кровотечений.
~%25% Ускорение инволюции матки в послеродовом периоде.
}

Препараты, применяемые для остановки маточных кровотечений {
~%50%Метилэргометрин.
~%-33.33333% Динопростон.
~%-33.33333%Салбутамол.
~%50% Окситоцин
~%-33.33333%Динопрост.
}

Препараты токолитического действия {
~%50%Прогестерон.
~%50%Партусистен.
~%-50%Динопрост.
~%-50%Окситоцин.
}

Препараты, стимулирующие эритропоэз {
~%-50%Цитрат натрия.
~%-50%Гепарин.
~%25%Цианокобаламин.
~%25%Фолиевая кислота.
~%25%Железа закисного сульфат.

~%25%Ферковен.

}

Осложнения, возникающие при использовании препаратов железа {

~%25%Прилив крови к лицу.

~%25%Боли за грудиной.

~%25%Запоры.

~%25% Диарея.

~%-50%Судороги.

~%-50%Повышение температуры тела.

}

Препараты используют местно для остановки кровотечения {

~%-33.33333%Гепарин.

~%-33.33333%Кальция хлорид.

~%33.33333%Перекись водорода.

~%33.33333%Адреналин.

~%33.33333%Тромбин.

~%-33.33333%Аминокапроновая кислота.

}

Препараты относятся к антикоагулянтам прямого действия {

~%-33.33333%Викасол.

~%33.33333%Гепарин.

~%-33.33333%Фолиевая кислота.

~%-33.33333%Стрептолиаза.

~%33.33333%Клексан.

~%33.33333% Далтепарин.

}

Механизм действия гепарина {

~%25%Понижает активность протромбиназы.

~%-50%Участвует в транспорте железа.

~%25%Понижает активность протромбина.

~%25%Нарушает адгезию и агрегацию тромбоцитов.

~%25%Активирует фибринолиз.

~%-50%Образует комплексы с ионами Ca^{2+} .

}

Характерно для низкомолекулярных гепаринов {

~%25% Усиливают угнетающее действие антитромбина III на переход протромбина в тромбин.

~%25% На фоне действия препаратов не происходит угнетение активности тромбина.

~%-100% На фоне действия препаратов активность тромбина угнетается в большей степени, чем на фоне действия гепарина.

~%25% Обладают выраженной антиагрегантной активностью.

~%25% Действуют более продолжительно, чем гепарин.

}

Механизм антиагрегантного действия клопидогрела {

~ Блокирует тромбоксановые рецепторы тромбоцитов.

~Ингибирует циклооксигеназу и нарушает образование тромбоксана.

~Стимулирует простагланциновые рецепторы тромбоцитов.

=Блокирует пуриновые рецепторы тромбоцитов и препятствует действию на них АДФ.

}

Стимуляторы дыхания, действующие преимущественно рефлекторно {

~%50%Цититон.

~%-20%Бемегрид.

~%-20%Кордиамин.

~%50%Лобелин.

~%-20%Камфора.

~%-20% Кофеин.

~%-20%Либексин.

}

Вещества, оказывающие преимущественно прямое действие на центр дыхания {

~%-50%Цититон.

~%33.33333%Бемегрид.

~%-50%Лобелин.

~%33.33333%Кофеин.

~%33.33333%Этимизол.

}

Эффекты, характерные для кодеина {

~%20%Обладает выраженной противокашлевой активностью.

~%20%Угнетает дыхательный центр.

~%-50%Стимулирует дыхательный центр.

~%20%Оказывает болеутоляющее действие.

~%-50%Вызывает понос.

~%20%Вызывает запор.

~%20%Вызывает лекарственную зависимость.

}

Препараты, относящиеся к отхаркивающим средствам прямого действия {

~%-50%Препараты термопсиса.

~%33.33333%Трипсин кристаллический.

~%33.33333%Натрия гидрокарбонат.

~%-50%Препараты ипекакуаны.

~%33.33333%Препараты корня алтея.

}

Препараты, относящиеся к отхаркивающим средствам рефлекторного действия {

~%-25%Изадрин.

~%50%Препараты ипекакуаны.

~%-25%Трипсин кристаллический.

~%-25%Кордиамин.

~%50%Препараты термопсиса.

~%-25%Ацетилцистеин.

}

Характерно для сальбутамола {

~%20%Расширяет бронхи.

~%20%Преимущественно стимулирует β_2 -адренорецепторы.

~%-100% В равной степени стимулирует β_1 и β_2 -адренорецепторы.

~%20%В терапевтических дозах практически не влияет на частоту и ритм сердечных сокращений.

~%20%Применяется для купирования бронхоспазмов.

~%20% Применяется для предупреждения бронхоспазма.

}

Обуславливает терапевтическое действие этилового спирта при отеке легких

{

~Наркотическое действие.

~Дегидратирующее действие.
= Противовспенивающее действие.
~Понижение давления в малом круге кровообращения.
}

Характерно для либексина {
~Подавляет кашлевой центр.
~По эффективности сопоставим с кодеином.
~Вызывает привыкание и развитие лекарственной зависимости.
~Повышает возбудимость чувствительных окончаний.
=Подавляет кашлевой рефлекс, действуя периферически.
}

С чем связано бронхолитическое действие изадрина {
~Блокада М-холинорецепторов гладких мышц бронхов.
~Непосредственное влияние на гладкие мышцы бронхов.
~Возбуждение лейкотриеновых рецепторов.
=Возбуждение β -адренорецепторов гладких мышц бронхов.
}

Средство, обладающее анорексигенным действием {
~Настойка полыни.
~Инсулин.
=Сибутрамин
~Алмагель.
}

Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной железы {
~%-33.33333%Аэрон.
~%50%Панкреатин.
~%-33.33333%Оксафенамид.
~%50%Апротинин.
~%-33.33333%Инсулин.
}

Антацидные средства, нейтрализующие хлористоводородную кислоту желудочного сока без образования CO_2 {
~%-33.33333%Натрия гидрокарбонат.

~%33.33333%Магния окись.
~%33.33333%Алюминия гидроокись.
~%-33.33333%Касторовое масло.
~%33.33333%Алмагель.
~%-33.33333%Бисакодил.
}

Группы веществ, угнетающих моторику желудочно-кишечного тракта {
~%-25%M-холиномиметики.
~%33.33333%M-холиноблокаторы.
~%33.33333%Ганглиоблокаторы.
~%-25%Антихолинэстеразные средства.
~%-25%Симпатолитики.
~%33.33333%Спазмолитики миотропного действия.
~%-25%Нейролептики.
}

Характерно для омепразола {
~%25% Выраженно снижает секрецию желез желудка.
~%25% Избирательно действует на париетальные клетки желудка.
~%-50% Блокирует гистаминовые H₂-рецепторы.
~%25% Ингибирует протонный насос.
~%25% Применяется при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.
~%-50% Применяется при гипоацидном гастрите.
}

Ранитидин уменьшает продукцию соляной кислоты в желудке, потому что {
~Блокирует М-холинорецепторы.
~Блокирует гистаминовые рецепторы первого типа.
=Блокирует гистаминовые рецепторы второго типа.
~Блокирует рецепторы к соматотропному гормону.
~Блокирует рецепторы к гастрину.
}

Препарат, обладающий противорвотным действием {
~Диазепам.
=Галоперидол.
~Кофеин.
~Пирацетам.
~Фенобарбитал.
}

Указать механизм антиагрегантного действия кислоты ацетилсалициловой {
=угнетает циклооксигеназу и препятствует образованию тромбоксана
~ угнетает циклооксигеназу
~ блокирует фосфодиэстеразу тромбоцитов
~ стимулирует аденилатциклазу тромбоцитов
~ препятствует агрегации тромбоцитов и вызывает выраженную
вазоконстрикцию
}

Отметить препарат, применяемый для лечения гиперхромной анемии {
~ цианокобаламин
~ железа лактат
~ фолиевая кислота
~ коамид
=цианокобаламин + фолиевая кислота
}

Отметить механизм антифибринолитического действия аминокaproновой кислоты {
~ действует непосредственно на фибрин, стабилизируя его
=тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин
~ обладает антипротеазной активностью
~ способствует синтезу протромбина в печени
~ ингибирует фибринолизин и протеолитические ферменты.
}

Указать антагонист гепарина {
~ желатин
~ фибриноген
~ витамин К
=протамина сульфат
~ викасол
}

Указать средство для лечения гипохромных анемий {
~ пентоксил
=ферковен
~ цианокобаламин

- ~ кислота фолиевая
- ~ натрия нуклеинат

}

Отметить вещество, стимулирующее лейкопозз{

- ~ ферковен
- ~ коамид
- ~ феррум - лек
- =метилурацил
- ~ фолиевая кислота

}

Отметить вещество, уменьшающее агрегацию тромбоцитов{

- =дипиридабол
- ~ контрикал
- ~ амбен
- ~ кислота аминапроновая
- ~ неодикумарин

}

Отметить основное свойство гепарина{

- ~ эффективен при приеме внутрь
- =действие развивается практически сразу после введения и продолжается 3-6 часов
- ~ действие развивается через 18-24 часа и продолжается несколько суток
- ~ кумулирует
- ~ антагонистом является витамин К

}

Отметить механизм действия урокиназы{

- ~ стимулирует активность плазмина
- ~ подавляет активность плазмина
- =катализирует процесс перехода плазминогена в плазмин
- ~ действует непосредственно на фибрин стабилизируя его
- ~ ингибирует процесс перехода плазминогена в плазмин

}

Что характерно для неодикумарина{

- ~ вводят парентерально

~ действие развивается сразу и продолжается 3-6 часов
~ задерживает свертывание крови в пробирке
~ не стимулирует фибринолиз
=вызывает материальную кумуляцию
}

Указать средство, применяемое для лечения анемии при беременности {
~ пентоксил
~ метилурацил
~ стрептокиназа
~ натрия нуклеинат
=ферковен
}

Укажите средство, применяемое при лейкопении и агранулоцитозе {
=натрия нуклеинат
~ коамид
~ фолиевая кислота
~ цианокоболамин
~ ферковен
}

Отметить препараты железа для парентерального введения {
~%-33.33333% железа лактат
~ %50% феринжент
~%-33.33333% коамид
~%-33.33333% гемостимулин
~ %50% феррум - лек
}

Указать средство, применяемое при полицитемии (эритремии) {
~ пентоксил
~ метилурацил
=раствор натрия фосфата, меченного фосфором - 32
~ натрия нуклеинат
~ коамид
}

Отметить основные средства, применяемые при лечении гипохромной анемии {

~ 50% ферроплекс

~ 50% феррум - лек

~ 33.33333% фолиевая кислота

~ 33.33333% цианокобаламин

~ 33.33333% фолиевая кислота + цианокобаламин

}

Указать антикоагулянты для перорального применения {

~ 33.33333% гепарин

~ 50% прадакса

~ 33.33333% урокиназа

~ 50% ксарелто

~ 33.33333% стрептодеказа

}

Для тромбксана А2 характерны все свойства, кроме одного {

~ повышает агрегацию тромбоцитов

~ вызывает выраженную вазоконстрикцию

~ синтезируется в тромбоцитах

=препятствует агрегации тромбоцитов и вызывает вазодилатацию

~ механизм связан с влиянием на тромбксановые рецепторы и стимуляцией фосфолипазы С

}

Антиагрегантное средство тиклопидин (тиклид) имеет следующее основное действие {

=снижает риск развития инфаркта миокарда, уменьшает частоту инсультов, снижает процессы тромбоцитарных осложнений

~ потенцирует действие аденозина

~ блокирует тромбксановые рецепторы тромбоцитов

~ нарушение синтеза циклически хэндпероксидов

~ стимулирует аденилатциклазу

}

Перечислить препараты новой группы антикоагулянтов -низкомолекулярных гепаринов {

~ протамина сульфат

~ натрия гидроцитрат
~ синкумар
~ фенилин
=эноксапарин
}

Что не характерно для тканевого активатора плазминогена (алтеплазы){
~ получают методом генной инженерии
=применяют местно для остановки кровотечений
~ действие направлено на профибринолизин
~ способствует реканализации тромбированных сосудов
~ вводят внутривенно, дозируют в ЕД, антигенностью не обладает
}

Кардиотонические эффекты наиболее характерны для {
~ 50% сердечных гликозидов
~ 33.33333% альфа - и бета- адреномиметиков
~ 50% бета- адреномиметиков
~ 33.33333% симпатомиметиков
~ 33.33333% М -холиноблокаторов
}

Изменения в сердечно-сосудистой системе под влиянием сердечных гликозидов связаны с {
~ 33.33333% уменьшением ударного объёма
~ 50% увеличением минутного объёма
~ 50% снижением венозного давления
~ 33.33333% повышением артериального давления
~ 33.33333% все ответы правильные
}

Все препараты сердечных гликозидов могут быть назначены перорально, кроме {
~ 33.33333% дигитоксина
~ 33.33333% дигоксина
~ 33.33333% целанида
~ 50% коргликона
~ 50% строфантина
}

Максимальной материальной кумуляцией обладает {

- ~ целанид
- ~ изоланид
- ~ дигоксин
- ~ строфантин
- =дигитоксин

}

Противопоказанием к применению сердечных гликозидов служит наличие у больного{

- ~ %50% полного атриовентрикулярного блока
- ~ %50% брадикардии
- ~%-33.33333% тахикардии
- ~%-33.33333% отеков
- ~%-33.33333%запоров

}

Противоаритмическое действие сердечных гликозидов обусловлено{

- =повышением тонуса блуждающего нерва и угнетением проводимости
- ~повышением тонуса симпатического нерва и усилением сократимости миокарда
- ~ повышением тонуса блуждающего нерва и угнетением автоматизма синусного узла
- ~ повышением тонуса симпатического нерва и улучшением проводимости
- ~ все перечисленное верно

}

При лечении сердечными гликозидами наблюдаются следующие изменения в деятельности сердца{

- ~ %50% усиление и укорочение систолы
- ~%-33.33333% укорочение диастолы
- ~ %50% увеличение минутного объёма
- ~%-33.33333% увеличение частоты сердечных сокращений
- ~%-33.33333% всё перечисленное

}

Назовите препараты, связывающие ионы Ca^{2+} {

- ~ %50% ЭДТА (трилон Б)
- ~ %50% натрия цитрат
- ~%-33.33333% лидокаин

~%-33.33333% анаприлин
~%-33.33333%изонитрозин
}

Лечение сердечными гликозидами приводит к следующим изменениям в системе кровообращения{

~%-33.33333% повышению венозного давления
~ %50% нормализации артериального давления
~ %50% улучшению коронарного кровообращения
~%-33.33333% увеличению объёма циркулирующей крови
~%-33.33333% всё перечисленное верно
}

Назовите препарат, используемый для лечения острой сердечной недостаточности{

~ дигитоксин
=строфантин
~ адонизид
~ настой травы весеннего горицвета
~ настойку ландыша
}

Для уменьшения токсичности сердечные гликозиды назначают вместе с{

=препаратами калия
~ препаратами кальция
~ препаратами натрия
~ препаратами йода
~ препаратами магния
}

Какие препараты усиливают токсичность сердечных гликозидов{

~ препараты калия
=препараты кальция
~ препараты магния
~ препараты йода
~ препараты меди
}

В неизменном виде из организма выделяются препараты{

~%-33.33333% дигитоксин
~ %50% строфантин
~%-33.33333% целанид
~ %50% коргликон
~%-33.33333% адонизид
}

Причина смерти при интоксикации сердечными гликозидами {
~ паралич дыхательного центра
~ паралич сосудодвигательного центра
=мерцание желудочков (фебриляция желудочков)
~ мерцание предсердий (мерцательная аритмия)
~ всё перечисленное
}

Для лечения хронической сердечной недостаточности применяются препараты {
~ %50% дигитоксин
~%-33.33333% анаприлин
~ %50% эналаприл
~%-33.33333% лидокаин
~%-33.33333% атропин
}

Ограничивают применение кардиотонических средств "негликозидной" структуры следующие эффекты {
=тахикардия
~ увеличение А/Д
~ уменьшение А/Д
~ брадикардия
~ диспептические
}

Какие эффекты связаны с возбуждением бета1 – адренорецепторов {
~ расширение кровеносных сосудов
~ сужение кровеносных сосудов
~ спазм бронхов
~ расслабление мышц бронхов
=повышение автоматизма сердца
}

Перечислите средства, усиливающие сократительную активность миометрия{

- ~%-33.33333% атропина сульфат
 - ~%-33.33333% экстракт спорыньи густой
 - ~ %50% окситоцин
 - ~ %50% динопростон
 - ~%-33.33333% эрготал
- }

Перечислите средства, ослабляющие сократительную активность миометрия{

- ~%-33.33333% пропранолол
 - ~ %50% сальбутамол
 - ~%-33.33333% добутамин
 - ~ %50% тербуталин
 - ~%-33.33333% окситоцин
- }

Чем отличается динопростон (PgE2) от динопроста(PgF2a){

- ~ повышает артериальное давление
 - =понижает артериальное давление
 - ~ суживает легочные сосуды
 - ~ повышает тонус бронхов
 - ~ повышает перистальтику пищеварительного тракта
- }

Отметить нежелательные эффекты динопроста(PgF2a){

- ~%-33.33333% понижение тонуса бронхов
 - ~ %50% сужение легочных сосудов
 - ~%-33.33333% снижение перистальтики кишечника
 - ~ %50% увеличение сердечного выброса, аритмии
 - ~%-33.33333% все перечисленное
- }

Отметить показания к применению эргометрина{

- ~%-33.33333% слабость родовой деятельности
- ~ %50% маточные кровотечения
- ~ %50% субинволюция матки в послеродовом периоде

~%-33.33333% преждевременная отслойка плаценты
~%-33.33333% отсутствие лактации
}

Перечислите побочный эффект, возможный при приёме фенотерола у беременных {
~ флебиты
~ диспепсические расстройства
=гипергликемия у плода
~ судороги
~ повышение артериального давления
}

Перечислите признаки острого отравления препаратами спорыньи {
~%-33.33333% снижение давления
~%-33.33333% гипергликемия у плода
~%-33.33333% флебиты
~ %50% судороги
~ %50% гангрена
}

Какие осложнения могут развиваться при применении простагландинов {
~%-33.33333% гипергликемия
~%50% тахикардия
~%-33.33333% боли в эпигастральной области
~%50% чрезмерная стимуляция сократительной активности миометрия
~%-33.33333% отёки
}

С какой целью назначают гестагены {
=для предупреждения преждевременных родов
~ для стимуляции родов
~ для повышения тонуса миометрия
~ для понижения тонуса шейки матки
~ всё перечисленное
}

Перечислите препараты растительного происхождения, используемые для остановки маточных кровотечений {

~ 50% эрготал
~ 33.33333% александрийский лист
~ 33.33333% корень солодки
~ 50% эргометрина малеат
~ 33.33333% экстракт мужского папоротника
}

Когда следует принимать М-холиноблокаторы при язвенной болезни 12-перстной кишки {

~ через 30 мин после еды
~ через 1-2 часа после еды
= за 30 мин до еды
~ только на ночь
~ во время приёма пищи
}

Подберите характеристику препарата алмагель {

~ блокатор H₂ -гистаминорецепторов
~ холиноблокатор
= антацид
~ миотоник
~ вяжущее вещество
}

Какое средство применяется для подавления активности ферментов поджелудочной железы {

~ алмагель
~ атропин
~ циметидин
= трасилол
~ пирензепин
}

Укажите механизм действия настойки полыни {

= рефлекторное повышение возбудимости центра голода
~ непосредственное стимулирующее влияние на центр голода
~ угнетение центра насыщения
~ увеличение уровня глюкозы в крови
~ механизм не ясен

}

Препараты из каких фармакологических групп усиливают аппетит{

~%-33.33333% холиноблокаторы

~ %50% анаболические стероиды

~%-33.33333% гипертензивные средства

~ %50% антисеротониновое средство (перитол)

~%-33.33333% все перечисленные группы

}

При лечении ожирения для уменьшения ощущения голода применяют{

~ %50% фепранон

~%-33.33333% фторфеназин

~ %50% орлистат

~%-33.33333% метронидазол

~%-33.33333% метеразин

}

Какие вещества усиливают секрецию желез желудка{

~%-33.33333% секретин, холецистокинин

~ %50% гистамин

~%-33.33333% вазоактивный пептид кишечника

~%-33.33333% пептид, угнетающий секрецию желудка

~ %50% гастрин

}

Какие из перечисленных веществ угнетают секрецию желез желудка{

~ %50% вазоактивный пептид кишечника

~%-33.33333% серотонин

~%-33.33333% гистамин

~ %50% простагландин E2

~%-33.33333% гастрин

}

С диагностической целью для оценки секреторной функции желудка применяются{

~ %50% гастрин

~ %50% гистамин

~%-33.33333% ацетилхолин

~%-33.33333% адреналин
~%-33.33333%
}

При недостаточности желез желудка применяют{
~%-33.33333% фамотидин
~ %50% искусственный желудочный сок
~ %50% ацедин-пепсин
~%-33.33333% фенамин
~%-33.33333% атропин
}

Какой из препаратов, понижающих секрецию желез желудка, является пролекарством{
=омепразол
~ фамотидин
~ пирензепин
~ ранитидин
~ проглумид
}

Пирензепин блокирует М -холинорецепторы, локализирующиеся в{
~ %50% энтерохромаффиноподобных клетки
~ %50% парасимпатических ганглиях желудка
~%-33.33333% циркулярных гладкомышечных волокнах
~%-33.33333% сфинктерах
~%-33.33333% ЦНС
}

Длительность действия омепразола{
~ 30 мин
~ 2-3 часа
~ 6-8 часов
~ до 24 часов
=до 2-3 суток
}

Омепразол приводит к{
~ %50% уменьшению секреции хлористоводородной кислоты
~%-33.33333% уменьшению секреции фактора Касла

~ %50% уменьшению секреции пепсиногена
~%-33.33333% уменьшает секрецию слизи
~%-33.33333% уменьшает синтез простагландинов в слизистой желудка
}

Укажите эффекты, наблюдаемые при приёме пирензепина{
~%-33.33333% повышение высвобождения гастрина
~ %50% снижение секреции хлористоводородной кислоты
~%-33.33333% повышение секреции слюнных желез
~ %50% повышение устойчивости клеток слизистой оболочки желудка к повреждению
~%-33.33333% все перечисленное верно
}

Какие препараты из группы антацидных средств вызывают при длительном приёме системный алкалоз{
~ %50% натрия гидрокарбонат
~ %50% кальция карбонат
~%-33.33333% магния окись
~%-33.33333% алюминия гидроокись
~%-33.33333% фосфалюгель
}

В состав какого препарата из группы антацидных средств входит местный анестетик{
~ смекта
~ алмагель
~ фосфалюгель
=алмагель - А
~ алюминия гидроокись
}

Какой из препаратов не приводит к нарушению фосфатного буфера в организме при длительном приёме{
=фосфалюгель
~ алмагель
~ алмагель - А
~ алюминия гидроокись
~ все перечисленные препараты

}

Укажите препарат из группы антацидных средств, который обладает максимальной нейтрализующей активностью {

=магния окись

~ алюминия гидроокись

~ кальция карбонат

~ магния трисаликат

~ алмагель

}

Для защиты слизистой оболочки желудка применяют {

~ 50% вяжущие средства

~ 33.33333% холиномиметики

~ 33.33333% антацидные средства

~ 50% гастропротекторы

~ 33.33333% антигистаминные средства

}

В основе гастропротекторного действия сукральфата лежат следующие эффекты {

~ 50% образование геля на поверхности слизистой оболочки

~ 50% образование простагландинов в слизистой желудка и SH -веществ

~ 33.33333% нейтрализация хлороводородной кислоты

~ 33.33333% уменьшение секреции гастрина

~ 33.33333% уменьшение секреции пепсиногена

}

Укажите побочные эффекты сукральфата {

=сухость в ротовой полости, запоры

~ поносы

~ возбуждение ЦНС, бессонница

~ угнетение ЦНС, апатия

~ метгемоглобинемия

}

Гастропротекторы способствуют {

~ 33.33333% нормализации pH желудочного содержимого

~ 33.33333% снижению кислотности желудочного сока

~%-33.33333% повышению кислотности желудочного сока
~ %50% увеличению синтеза простагландинов E2и I2 в слизистой желудка
~ %50% заживлению язв желудка и 12-перстной кишки
}

Стимулируют процесс регенерации язв желудка и 12-перстной кишки следующие препараты{

~%-33.33333% аскорбиновая кислота
~ %50% солкосерил
~ %50% анаболические стероиды
~%-33.33333% витамин К
~%-33.33333% супрастин
}

При задержке эвакуации содержимого из желудка и при гастроэзофагеальном рефлюксе применяют препараты{

~ %50% церукал
~ %50% мотилиум
~%-33.33333% папаверина гидрохлорид
~%-33.33333% имодиум
~%-33.33333% но-шпу
}

При повышенной моторике желудка применяют препараты{

~%-33.33333% супрастин
~ %50% платифиллина гидротартрат
~%-33.33333% лактулозу
~ %50% но-шпу
~%-33.33333% все перечисленные
}

Под влиянием рвотных средств рвота возникает вследствие{

~ %50% рефлекторного возбуждения центра рвоты
~ %50% стимуляции рвотного центра
~%-33.33333% увеличение давления в полости желудка
~%-33.33333% влияние на M1-холинорецепторы желудка
~%-33.33333% все перечисленное верно
}

Апоморфин неэффективен при{

~ при переедании

=при отравлении веществами, угнетающими рвотный центр

~ при пищевых отравлениях

~ при алкогольном опьянении

~ во всех перечисленных случаях

}

При рвоте "укачивания" показано применение{

~33.33333% фенотерола

~ 50% М-холиноблокаторов

~33.33333% празозина

~ 50% дипразина

~33.33333% всех перечисленных препаратов

}

Метоклопрамид (церукал) оказывает противорвотный эффект, так как он{

~33.33333% возбуждает Д2 - дофаминовые рецепторы пусковой зоны рвотного центра

~ 50% угнетает Д2 - дофаминовые рецепторы пусковой зоны рвотного центра

~33.33333% возбуждает серотониновые рецепторы пусковой зоны рвотного центра

~ 50% угнетает серотониновые рецепторы пусковой зоны рвотного центра

~33.33333% угнетает М1-холинорецепторы пусковой зоны рвотного центра

}

К противорвотным средствам, производным бензамина, относится{

~ торекан

=церукал

~ этаперазин

~ трифтазин

~ аэрон

}

К противорвотным средствам, производным фенотиазина относятся{

~ 50% торекан (тиэтилперазин)

~ 50% этаперазин

~%-33.33333% церукал
~%-33.33333% ондансетрон
~%-33.33333% скополамин
}

К противорвотным средствам, угнетающим серотониновые 5 НТЗ - рецепторы, относятся{

~%-33.33333% атропин
~%-33.33333% этаперазин
~ %50% ондансетрон
~ %50% трописетрон
~%-33.33333% тиэтилперазин
}

При использовании, каких препаратов из группы противорвотных средств возможны нарушения со стороны экстрапирамидной системы{

~%-33.33333% таблетки "Аэрон"
~ %50% церукал
~ %50% этаперазин
~%-33.33333% ондансетрон
~%-33.33333% димедрол
}

К средствам, стимулирующим образование желчи, относятся{

~%-33.33333% атропин
~%-33.33333% маалокс
~ %50% холосас
~ %50% оксафенамид
~%-33.33333% ципрофлоксацин
}

К средствам, снимающим спазм желчных путей, относятся{

~ %50% атропина сульфат
~%-33.33333% кислота дегидрохолевая
~ %50% папаверина гидрохлорид
~%-33.33333% оксафенамид
~%-33.33333% прозерин
}

Желчегонным действием обладает гормон {

~ гастрин

=холецистокинин

~ липокаин

~ глюкагон

~ секретин

}

Для исследования внешнесекреторной функции печени при дуоденальном зондировании применяют {

~ холосас

=магния сульфат

~ оксафенамид

~ атропина сульфат

~ папаверина гидрохлорид

}

Секрецию поджелудочной железы стимулируют гормоны {

~%33.33333% гастрин

~ %50% секретин

~%33.33333% липокаин

~ %50% холецистокинин

~%33.33333% глюкагон

}

Для заместительной терапии при недостаточности функции поджелудочной железы применяется {

~%33.33333% гивискон

~ %50% панзинорм

~%33.33333% ранитидин

~ %50% мезим

~%33.33333% холосас

}

Антидиарейное действие имеет {

=лоперамид

~ александрийский лист

~ кора 5крушины

~ вазопрессин

~ эритромицин
}

На протяжении всего кишечника действуют следующие препараты из группы слабительных средств{

~ 50% магнезия сульфат
~ 50% масло касторовое
~ 33.33333% изафенин
~ 33.33333% таблетки ревеня
~ 33.33333% экстракт крушины сухой
}

При хронических запорах назначаются слабительные средства, действующие преимущественно на толстый кишечник{

~ 33.33333% магнезия сульфат
~ 50% таблетки ревеня
~ 33.33333% масло касторовое
~ 50% сеннаде
~ 33.33333% натрия сульфат
}

Какие гипотензивные препараты действуют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему регуляции АД{

~ 33.33333% верапамил
~ 50% анаприлин
~ 50% каптоприл
~ 33.33333% празозин
~ 33.33333% нитропруссид
}

Укажите длительность гипотензивного действия разовой дозы клофелина при приёме внутрь{

~ 1-2 часа
~ 6-8 часов
= 6-12 часов
~ 20-24 часа
~ до 3-х суток
}

Каптоприл противопоказан больным{

~ с циррозом печени

=с хронической почечной недостаточностью

~ с лёгочным сердцем

~ с сахарным диабетом

~ с язвенной болезнью

}

На фоне гипертонического криза (А/Д -220/140 мм рт. ст.) какой препарат показан{

~ резерпин

~ апрессин

~ дигоксин

=фуросемид

~ верошпирон

}

Какой из нижеперечисленных препаратов нельзя назначать больному с гипертонической болезнью, у которого имеется бронхиальная астма{

~ диротон

~ капотен

=анаприлин

~ гипотиазид

~ дибазол

}

Какой из перечисленных лекарственных препаратов необходимо назначить в качестве гипотензивной терапии больному с первичным

гиперальдостеронизмом{

~ гипотиазид

~ анаприлин

~ клофелин

=спиронолактон

~ триамтерен

}

Вазоконстрикторами являются все перечисленные вещества, кроме{

= празозин

~ адреналин

~ ангиотензин II
~ вазопрессин
~ простагландин F2a
}

Вазодилататорами являются все перечисленные вещества, кроме {
~ ацетилхолин
~ брадикинин
~ гистамин
~ окись азота
=простагландин F2a
}

К средствам, угнетающим тонус вазомоторного центра, относятся все препараты, кроме {
~ метилдофа
~ моксонидин
=эналаприл
~ клофелин
~ гуанфацин
}

Празозин блокирует {
~ пост- и пресинаптические альфа -адренорецепторы
~ постсинаптические альфа2 -адренорецепторы
=постсинаптические альфа1 -адренорецепторы
~ бета1 и бета2 -адренорецепторы
~ внесинаптические альфа2 -адренорецепторы
}

Кардиоселективные бета –адреноблокаторы {
~%-33.33333% анаприлин
~ %50% метопролол
~ %50% атенолол
~%-33.33333% окспренолол
~%-33.33333% соталол
}

Донатором окиси азота является {
~дилтиазем

=натрия нитропруссид
~диазоксид
~миноксидил
~магния сульфат
}

Гипотензивное действие клофелина связано с {
~ %50% стимуляцией постсинаптических альфа2-адренорецепторов ядер солитарного тракта
~ %50% стимуляцией J1 –имидазольных рецепторов ядер солитарного тракта
~%-33.33333%блокадой симпатических ганглиев
~%-33.33333%увеличением диуреза
~%-33.33333%нарушением проницаемости ионных каналов
}

Все перечисленные эффекты клофелина способствуют снижению АД,
кроме {
~уменьшение тонуса вазомоторных центров
=задержка Na⁺, Cl⁻ в организме
~повышение тонуса блуждающего нерва
~седативный, снотворный
~снижение высвобождения ренина
}

Отметить гипотензивное средство, которое с осторожностью назначают с
препаратами, угнетающими центральную нервную систему {
~октадин
~пентамин
~каптоприл
=клофелин
~анаприлин
}

Какой из перечисленных препаратов, применяемый для лечения
гипертонической болезни, вызывает лекарственный паркинсонизм и
депрессию {
~клофелин
~моксонидин
=метилдофа
~гуанфацин

~эналаприл

}

С какой целью применяют главным образом ганглиоблокаторы {

=создание управляемой гипотензии

~лечение язвенной болезни желудка

~лечение гипертонической болезни

~лечение облитерирующих заболеваний сосудов конечностей

~лечение язвенной болезни 12-перстной кишки

}

Гипотензивный эффект бета - адреноблокаторов включает все компоненты, кроме {

~снижение сердечного выброса

~снижение общего периферического сопротивления сосудов

=угнетение вазомоторного центра

~уменьшение секреции ренина

~брадикардия

}

Укажите препарат, одновременно обладающий α и β - адреноблокирующей активностью {

~анаприлин

=лабеталол

~талинолол

~метопролол

~атенолол

}

Какой из гипотензивных препаратов может быть рекомендован больным с феохромоцитомой для нормализации А/Д {

~клофелин

~атенолол

=фентоламин

~каптоприл

~пентамин

}

Какой из перечисленных препаратов оказывает прямое ингибирующее действие на ренин {

~каптоприл
=алискирен
~эналаприл
~моноприл
~лизиноприл
}

Какой из перечисленных ингибиторов АПФ обладает наибольшей длительностью действия {

~каптоприл
~эналаприл
~лизиноприл
~периндоприл
=трандолаприл
}

Конкурентными антагонистами ангиотензивных рецепторов типа AT1 являются {

~ 50% лозартан
~ 33.33333% каптоприл
~ 50% валсартан
~ 33.33333% периндоприл
~ 33.33333% лизиноприл
}

С чем связано возникновение бронхоспазма при длительном лечении ингибиторами АПФ {

~с влиянием гистамина на мускулатуру бронхиол
~с влиянием медленно реагирующей субстанции анафилаксии (MPC –A) на мускулатуру бронхиол
=с влиянием брадикинина на мускулатуру бронхиол
~с влиянием ацетилхолина на мускулатуру бронхиол
~с влиянием простагландина E2 и простаглицлина на тонус бронхиол
}

При назначении какого препарата из группы гипотензивных средств может быть осложнение – гирсутизм {

=миноксидил
~фенигидин

~каптоприл
~резерпин
~анаприлин
}

Какой из неблагоприятных эффектов диазоксида препятствует его систематическому приёму{

=задержка в организме Na^+ , H_2O

~гипогликемия
~увеличение объёма циркулирующей крови
~увеличение уровня мочевой кислоты в крови
~ортостатическая гипотония при внутривенном введении
}

Длительность действия, какого из гипотензивных средств равна 1-2 мин. {

=натрия нитропруссид

~гигроний
~нитроглицерин
~арфонад
~фентоламин
}

Для магния сульфата характерны все эффекты, кроме {

~успокаивающий
~противосудорожный
~наркотический
~затруднение нервно-мышечной передачи
=облегчение нервно-мышечной передачи
}

При введении магния сульфата внутрь наблюдается эффект {

~гипотензивный
~седативный
~противосудорожный
=слабительный
~наркотический
}

Механизм гипотензивного действия салуретиков {

~уменьшение секреции ренина

~уменьшение тонуса симпатической нервной системы
~уменьшение работы сердца
~уменьшение тонуса вазомоторных центров
=уменьшение объема экстрацеллюлярной жидкости и циркулирующей крови
}

При лечении гипертонического криза может использоваться диуретик {
~дихлотиазид
=фуросемид
~спиронолактон
~триампур
~диакарб
}

Какой из препаратов (группа: блокаторы кальциевых каналов) обладает наибольшей продолжительностью действия {
=фелодипин
~исрадипин
~фенигидин
~изоптин
~дилтиазем
}

Отметить особенности фармакодинамики дихлотиозида {
~уменьшает выделение K^+ из организма
~увеличивает осмотическое давление в просвете канальцев
~ослабляет действия гипотензивных средств
~вызывает ацидоз
=угнетает реабсорбцию ионов Na^+ , K^+ , HCO_3^-
}

Что характерно для фуросемида {
~%33.33333% эффективность фуросемида зависит от колебаний кислотно-щелочного равновесия
~%50% вызывает алкалоз
~%33.33333% вызывает ацидоз
~ %50% вызывает гипокалиемию
~%33.33333% действует 10-12 часов
}

Указать механизм диуретического действия спиронолактона {
~угнетает действие альдостерона
=устраняет влияние альдостерона
~нарушает кислотно-щелочное равновесие
~выводит ионы калия
~вызывает накопление мочевой кислоты
}

С какой целью дихлотиазид или фуросемид комбинируют со спиронолактоном {
=для коррекции нарушений ионного баланса
~для коррекции нарушений кислотно-щелочного состояния
~для потенцирования диуретического действия
~для предупреждения поражения паренхимы почек
~для предупреждения угнетения синтеза альдостерона
}

Отметить диуретик с длительностью действия 24-48 часов {
~триамтерин
~дихлотиазид
~диакарб
~фуросемид
=клопамид
}

Отметить особенности действия триамтерена {
~способствует выведению ионов K^+
=задерживает ионы K^+
~является антагонистом альдостерона
~устраняет влияние альдостерона на функции почечных канальцев
~обладает высокой диуретической активностью
}

Что характерно для маннита {
~ 50% используется как мочегонное средство
~ 50% используется как дигидратирующее средство
~ 33.33333% первично нарушает реабсорбцию ионов в почечных канальцах
~ 33.33333% повышает содержание остаточного азота

~%-33.33333% проникает через гематоэнцефалический барьер
}

Какой эффект салуретиков усиливает кардиотоксическое действие сердечных гликозидов{

~усиление выделения ионов Na^+
~усиление выделения ионов Cl^-
=усиление выделения ионов K^+
~усиление выделения ионов HCO_3^-
~усиление выделения ионов Ca^{2+}
}

Какое мочегонное средство усиливает аритмогенное (гипокалиемическое) действие сердечных гликозидов{

~спиронолактон
~триамтерен
~маннит
~амилорид
=фуросемид
}

Какое мочегонное средство принимают при лечении гипертонической болезни{

=дихлотиазид
~маннит
~мочевина
~амилорид
~триамтерен
}

Отметить свойства спиронолактона{

~способствует выведению ионов K^+
~задерживает выведение ионов Na^+
=задерживает выведение ионов K^+
~способствует выведению HCO_3^-
~значительно усиливает диурез
}

Укажите калийсберегающее средство, не влияющее на действие альдестерона {

~спиронолактон

~клопамид

~циклометиазид

=триамтерен

~бринальдикс

}

Укажите диуретическое средство, увеличивающее выведение ионов калия {

=дихлотиазид

~спироналоктон

~каптоприл

~эуфиллин

~триамтерен

}

Укажите мочегонное средство - антагонист альдостерона {

~амилорид

=спиронолактон

~бринальдикс

~триамтерен

~клопамид

}

Укажите особенности фармакодинамики индапамида (арифона) {

~используется только как мочегонное средство

~используется как дегидратирующее средство

=используется как антигипертензивное средство

~повышает содержание остаточного азота

~проникает через клеточные мембраны и гематоэнцефалический барьер

}

Какие диуретические средства оказывают прямое влияние на функцию эпителия почечных канальцев {

~ 50% дихлотиазид

~ 33.33333% мочевины

~ 50% кислота этакриновая

~ 33.33333% маннит

~%-33.33333% спиронолактон

}

Что характерно для фуросемида{

~%-33.33333% медленное развитие эффекта

~ %50% быстрое развитие эффекта

~ %50% непродолжительное действие 2-4 ч.

~%-33.33333% действует 10-12 ч. и более

~%-33.33333% умеренная диуретическая активность

}

Бронхолитическое действие эуфиллина объясняется{

=спазмолитическим, миотропным действием

~снижением секреции бронхиальных желёз

~противоаллергическим действием

~адреномиметическим действием

~антигистаминным действием

}

Какой из перечисленных препаратов не является муколитиком{

~ацетилцистеин

~йодид калия

=бромид натрия

~трипсин

~мукалтин

}

Для лечения бронхоспазма могут применяться все нижеперечисленные препараты, кроме{

~теофиллин

~сальбутамол

~эуфиллин

~беротек

=протеолитические ферменты

}

Препарат с выраженным противовоспалительным и иммунодепрессивным действием для лечения бронхиальной астмы{

~атропин

~салбутамол
~интал
=преднизолон
~мукалтин
}

Каков механизм действия эуфиллина {
~угнетение вагусных влияний
~блокада медиаторов аллергических реакций
=угнетение фосфодиэстеразы
~активация адренорецепторов
~угнетение дыхательного центра
}

Каков механизм действия салбутамола {
~снижение тонуса вагуса
=стимуляция бета2 - адренорецепторов
~блокада альфа- адренорецепторов
~блокада гистаминовых рецепторов
~непосредственное действие на гладкую мускулатуру бронхов
}

Концентрацию теофиллина (за счет индукции микросомальных ферментов)
снижают все указанные препараты, кроме {
~фенобарбитала
~карбамазепина
~феназепам
=нифедипина
~нитразепам
}

Назовите препарат из группы ксантинов длительного действия {
~пентоксифиллин
~диафиллин
~аминофиллин
~теофиллин
=теотард
}

Укажите начало действия, максимум действия и длительность действия фенотерола (беротека){

~немедленно. 10 мин, 6 часов

~15 мин, 30 мин, 6 часов

~2-3 мин, 20 мин, 2,5 часа

=5-10 мин, 30 мин, 6 часов

~30-40 сек, 20 мин, 3-5 часов

}

Укажите наиболее частые побочные эффекты ингаляторных форм глюкокортикоидов{

~развитие остеопороза

~артериальная гипертония

=кандидоз полости рта и глотки

~ожирение

~"стероидный" диабет

}

Укажите бета2 -адреномиметик длительного действия{

~сальбутамол

~тербуталин

~фенотерол

=формотерол

~орципреналина сульфат

}

Бемегрид чаще применяют при{

=отравлении барбитуратами

~асфиксии новорожденных

~в посленаркозном периоде

~при лечении пневмоний

~отравлении угарным газом

}

Максимальный противокашлевой эффект имеет{

~кодеин

~либексин

=морфин

~глаувент

~тусупрекс
}

К противокашлевым средствам периферического действия относится {

~тусупрекс
=либексин
~глауцина гидрохлорид
~кодтерпин
~морфин
}

К отхаркивающим средствам рефлекторного действия относятся все препараты, кроме {

~препараты корня истода
~препараты ипекакуаны
~препараты термопсиса
=амброксол
~препараты корня солодки
}

Максимальный муколитический эффект имеет препарат {

~мукалтин
~бромгексин
~трипсин
=АЦЦ (ацетилцистеин)
~натрия гидрокарбонат
}

Какая из групп бронхолитических средств угнетает секрецию слизи бронхиальными железами {

~альфа и бета- адреномиметики
~бета - адреномиметики
=М-холиноблокаторы
~ксантины
~симпатомиметики
}

К какой группе бронхолитических средств очень быстро возникает устойчивость рецепторов бронхиол {

=М - холиноблокаторы
~симпатомиметики
~бета - адреномиметики
~альфа и бета- адреномиметики
~ксантины
}

Каков механизм бронхолитического действия zileutona {
~блокада М -холинорецепторов
~возбуждение бета2 – адренорецепторов бронхиол
~блокада аденозиновых рецепторов бронхиол
~торможение дегрануляции тучных клеток
=подавление эффектов лейкотриенов(угнетение 5-липоксигеназы)
}

Препараты какой группы наиболее эффективны при аспириновой астме {
=ингибиторы лейкотриеновых рецепторов
~М- холиноблокаторы
~симпатомиметики
~бета2 -адреномиметики
~альфа - и бета - адреномиметики
}

Какой из препаратов наиболее эффективен при респираторном дистресс -
синдроме у новорожденных {
~эуфиллин
~адреналин
~эфедрин
~метацин
=альвеофакт
}

При отёке лёгких применяются все перечисленные препараты, кроме {
=атропина
~фуросемид
~морфина
~кислорода
~нитроглицерина
}

Для отхаркивающих средств рефлекторного действия характерны все эффекты, кроме {

- ~раздражение слизистой желудка
 - ~увеличение секреции бронхиальных желез
 - ~увеличение активности мерцательного эпителия
 - ~усиление сократимости бронхов
 - =стимуляция дыхательного центра
- }

Развитие лекарственной зависимости при длительном приёме характерно для {

- ~либексина
 - ~тусупрекса
 - =кодеина
 - ~глауцина гидрохлорида
 - ~мукалтина
- }

Для бета2 -адреномиметиков характерны все побочные эффекты, кроме {
=увеличение А/Д

- ~тремор
 - ~тахикардия
 - ~аритмии
 - ~беспокойство
- }

Назовите М - холиноблокатор, применяемый в виде аэрозоля {

- ~атропина сульфат
 - =ипратропия бромид
 - ~метацин
 - ~платифилина гидротартрат
 - ~скополамина гидрохлорид
- }

Кромолин-натрия применяется {

- =ингаляционно
- ~внутрь (перорально)
- ~ректально

~внутримышечно
~внутривенно
}

Бронхолитическое средство для ректального введения {
~метацин
~салбутамол
=теофиллин
~эфедрин
~кромолин -натрий
}

К длительно действующим препаратам теофиллина относятся все препараты, кроме {
~теотард
~теотард
~дурофиллин
=диафиллин
~теобиолонг
}

Наркотические анальгетики широко применяются при отёке легких, так как они: {
=расширяют артерии и вены и уменьшают венозный возврат к сердцу
~сильные противокашлевые средства
~тонизируют центр вагуса
~имеют снотворное действие
~вызывают угнетение центра терморегуляции
}

Все препараты понижают давление в малом круге кровообращения, кроме {
~гигроний
~натрия нитропруссид
~фентоламин
~аминазин
=спирт этиловый
}

Недостатком спирта этилового, как пеногасителя, является {

=раздражение слизистых оболочек дыхательных путей
~раздражение слизистой оболочки полости рта
~раздражение слизистой оболочки желудка
~увеличение секреции HCl
~уменьшение секреции пепсиногена
}

Сердечные гликозиды применяются при лечении отёка легких во всех случаях, кроме {
=стеноз митрального клапана
~отравление химическими веществами
~цирроз печени
~отёк мозга
~декомпенсация почек
}

Какой из перечисленных препаратов является наиболее эффективным антиагрегантом {
~сустанг-форте
=ацетилсалициловая кислота
~фенилин
~дихлотиазид
~нифедипин
}

Больным, перенесшим инфаркт миокарда, назначают длительно ацетилсалициловую кислоту потому, что она {
~снижает тромбиновый индекс
=препятствует агрегации тромбоцитов
~лизует образовавшиеся тромбы
~ингибирует внутренний механизм свёртывания крови
~механизм неизвестен
}

Отметить антиангинальное средство, увеличивающее коронарный кровоток и снижающее потребность миокарда в кислороде {
~валидол
~корвалол
=нитроглицерин

~анаприлин
~предуктал
}

При лечении ишемической болезни сердца наряду с антиангинальными средствами могут применяться {
~%-33.33333% адреномиметики
~%-33.33333% кардиостимуляторы
~%50% антигипоксанты
~%50% антиагреганты
~%-33.33333% все перечисленные группы
}

Отметить средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и улучшающие его кровоснабжение {
~%50% органические нитраты
~%-33.33333% блокаторы Na^+ -каналов
~%50% блокаторы Ca^{2+} -каналов
~%-33.33333% препараты рефлекторного действия
~%-33.33333% ингибиторы ангиотензин превращающего фермента
}

Нитроглицерин расширяет не только коронарные сосуды, но и {
~%50% сосуды мозга и сетчатки
~%50% сосуды внутренних органов
~%-33.33333% сосуды поперечно-полосатой мускулатуры
~%-33.33333% сосуды кожи нижних конечностей
~%-33.33333% всё перечисленное
}

Нежелательные эффекты нитроглицерина наблюдаются после {
=первых приёмов препарата
~приёма препарата утром
~приёма препарата до еды
~приёма препарата вечером
~независимо от режима введения
}

При длительном непрерывном (8-24 часа и более) применении пластыря нитроглицерина развивается {

=привыкание

~кумуляция

~идиосинкразия

~индукция ферментов печени

~лекарственная зависимость

}

При передозировке нитроглицерина возможно развитие {

~кардиогенного шока

=коллапса

~гипертензивного криза

~гипогликемии

~гипергликемии

}

Эффект нитроглицерина сохраняется в течение {

~5 мин.

=30 мин.

~1 часа

~12 часов

~24 часов

}

Наиболее длительный эффект наблюдается при использовании нитроглицерина в следующей лекарственной форме {

~таблеток

~спиртового раствора

=пластыря

~пластинки на десну

~капсул

}

Назовите основной принцип антиангинального действия верапамила (фенигидина, дилтиазепама) {

=нарушение транспорта Ca^{2+}

~нарушение транспорта K^{+}

~нарушение транспорта Na^{+}

~нарушение иннервации сердца

~механизм неизвестен

}

Что приводит к снижению работы сердца при использовании блокаторов кальциевых каналов{

~%50% уменьшение использования энергии фосфатных связей для механической работы сердца

~%-33.33333% сужение коронарных сосудов

~%50% уменьшение "преднагрузки"

~%-33.33333% рефлексорная тахикардия

~%-33.33333% снижение проводимости

}

Как изменяют коронарный кровоток бета –адреноблокаторы{

~улучшают

=ухудшают

~не изменяют

~замедляют скорость кровотока

~увеличивают количество коллатералей

}

С чем связан антиангинальный эффект бета – адреноблокаторов{

~%50% с устранением адренергических влияний на сердце

~%-33.33333% с увеличением силы сердечных сокращений

~%-33.33333% с увеличением частоты сердечных сокращений

~%50% с удлинением диастолы и улучшением перфузии миокарда

~%-33.33333% со всем перечисленным

}

С чем связано благоприятное влияние дипиридамола на кровоснабжение миокарда{

~с блоком кальциевых каналов

~с активацией калиевых каналов

=с угнетением обратного захвата аденозина и ингибированием аденозиндезаминазы

~с блоком натриевых каналов

~с угнетением фосфодиэстеразы

}

Укажите противопоказание к назначению дипиридамола {
=атеросклероз коронарных сосудов
~спазм коронарных сосудов
~гипертоническая болезнь
~болезни печени
~болезни почек
}

К подгруппе IA (хинидин и хинидиноподобные вещества) относятся все препараты, кроме {
~ хинидина сульфат
~ новокаинамид
~ аймалин
=лидокаин
~ дизопирамид
}

К подгруппе IC мембраностабилизирующих средств относятся все препараты, кроме {
~ флекаинид
~ пропafenон
=лидокаин
~ этmozин
~ этаcизин
}

Отметить противоаритмический препарат, обладающий противозлептической активностью {
=дифенин
~ лидокаин
~ новокаинамид
~ этmozин
~ этаcизин
}

Фармакотерапевтический эффект противоаритмических средств основан на их способности влиять на следующие свойства миокарда, кроме {
=сократимость
~автоматизм

~возбудимость
~ проводимость
~ эффективный рефрактерный период
}

Сократимость миокарда меньше всего снижается при использовании в качестве противоаритмического средства{

~ хинидина сульфата
=аймалина
~ дифенина
~ анаприлина
~ изоптина
}

Возникновение идиосинкразии возможно при использовании в качестве противоаритмического средства{

~ лидокаина
=хинидина сульфата
~ изоптина
~ этацизина
~ анаприлина
}

Укажите алкалоид раувольфии, обладающий противоаритмическим действием{

~ резерпин
~ раунатин
=аймалин
~ раувазан
~ рауседил
}

При предсердно-желудочковом блоке противопоказан{

=новокаинамид
~ эфедрин
~ изадрин
~ атропина сульфат
~ скополамина гидробромид
}

Для лечения аритмий, наблюдаемых при интоксикации сердечными гликозидами, применяют {

~ хинидина сульфат

=дифенин

~ аймалин

~ изоптин

~ амиодарон

}

Все препараты противопоказаны для профилактики желудочковых тахикардий в постинфарктном периоде, кроме {

~ флекаинид

~ этмозин

~ этализин

=амиодарон

~ пропафенон

}

Назовите препарат, используемый для лечения желудочковой пароксизмальной тахикардии {

~ изоптин

~ изадрин

~ атропина сульфат

~ дигоксин

=лидокаин

}

Для блокаторов кальциевых каналов характерны все перечисленные эффекты, кроме {

~ угнетение входящего медленного тока Ca^{2+}

~ угнетение проводимости и увеличение эффективного рефрактерного периода в предсердно-желудочковом узле

~ снижение скорости диастолической деполяризации и подавление автоматизма синусно-предсердного узла

~ снижение сократимости миокарда и улучшение коронарного кровообращения

=уменьшение симпатической импульсации на сердце

}

Укажите длительность противоаритмического действия аденозина{

~ 1-2 сек

=5-10 сек

~ 15-20 сек

~ 30-60 сек

~ 1-2 мин

}

Укажите местные анестетики, обладающие выраженным антиаритмическим действием{

~ 50% лидокаин

~ 50% тримекаин

~ 33.33333% новокаин

~ 33.33333% дикаин

~ 33.33333% совкаин

}

При приступе пароксизмальной желудочковой тахикардии какой из препаратов применять нельзя{

=строфантин

~ лидокаин

~ новокаиномид

~ этализин

~ кордарон

}

У больного отмечается синусовая брадикардия (пульс -45 ударов в 1 мин.).

Какой из перечисленных препаратов может быть применён для лечения брадикардии{

~ анаприлин

~ кордарон

=атропина сульфат

~ дигоксин

~ новокаиномид

}

Для хинидина сульфата характерны все эффекты, кроме{

~ блокада Na⁺-каналов

=блокада Ca^{2+} -каналов
~ блокада K^{+} -каналов
~ блокада альфа - рецепторов
~ блокада М - холинорецепторов
}

Гиперчувствительность к противоаритмическим средствам развивается при применении {

~ лидокаина
~ хинидина сульфата
=новокаидамида
~ аймалина
~ амиодарона
}

Амиодарон блокирует все рецепторы, кроме {

~ K^{+} -каналы
~ Na^{+} - каналы
~ Ca^{+-} каналы
~ альфа - и бета- адренорецепторы
=М- холинорецепторы
}

Алкалоидами являются следующие противоаритмические средства {

~%-33.33333% анаприлин
~ %50% аймалин
~ %50% хинидина сульфат
~%-33.33333% амиодарон
~%-33.33333% верапамил
}

При использовании какого противоаритмического препарата период полувыведения $T_{1/2}$ составляет 10-50 дней {

=амиодарона
~ орнида
~ изоптина
~ лидокаина
~ атенолола
}

К блокаторам кальциевых каналов L -типа относятся все группы, кроме {
~ дифенилалкиламины (верапамил)
~ бензотиазепины (дилтиазем)
~ дигидропиридины (нифедипин)
~ дифенилпиперазины (циннаризин)
=фенилалкиламины (фенамин)
}

При предсердно-желудочковом блоке эффективны все перечисленные группы веществ, кроме {
~ М -холиноблокаторы
=антихолинэстеразные средства
~ бета -адреномиметики
~ альфа - бета -адреномиметики
~ симпатомиметики
}

Препараты из каких групп устраняют брадиаритмии {
~ блокаторы Na^+ -каналов
~ бета -адреноблокаторы
~ блокаторы Ca^{2+} -каналов
=М-холиноблокаторы
~ все перечисленные группы
}

Все перечисленные препараты являются блокаторами кальциевых каналов L - типа, кроме {
=амиодарона
~ верапамила
~ дилтиазепама
~ фенигидина
~ циннаризина
}