

Фармакокинетика - это раздел фармакологии, изучающий {
~совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия.
=процессы всасывания, распределения, связывания с белками,
биотрансформации и выведения лекарственных веществ из организма.
~побочные эффекты лекарственных веществ на организм
}

Фармакодинамика - это раздел фармакологии, изучающий {
=совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия.
~процессы всасывания, распределения, связывания с белками,
биотрансформации и выведения лекарственных веществ из организма.
~побочные эффекты лекарственных веществ на организм.
}

Энтеральные пути введения лекарственных веществ {
~%33.33333%внутрь.
~%-50%подкожный.
~%33.33333%ректальный.
~%-50%ингаляционный.
~%33.33333%сублингвальный.
}

Характерно для введения лекарственных веществ внутрь {
~быстрое развитие эффекта.
~относительно медленное развитие эффекта.
=зависимость всасывания лекарственных веществ в кровь от pH среды,
характера содержимого, характера моторики ЖКТ.
~возможность попадания лекарственных веществ в общий кровоток, минуя
печень.
}

Основной механизм всасывания большинства лекарственных веществ в ЖКТ
{
~Пиноцитоз.
~Фильтрация.
=Пассивная диффузия.
~Активный транспорт.
}

Парентеральные пути введения лекарственных веществ {
~%-50%Ректальный.
~%-50%Сублингвальный.
~%50%Ингаляционный.
~%50%Подкожный
}

Внутривенно нельзя вводить {
~%50%Изотонические растворы.
~%50%Гипертонические растворы.
~%50%Масляные растворы.
~%50%Взвеси.
}

К процессам конъюгации лекарственных веществ относятся {
~%50%Окисление.
~%50%Ацетилирование.
~%50%Гидролиз.
~%50%Образование глюкуронидов.
}

К процессам метаболической трансформации относятся {
~%50%Окисление.
~%50%Восстановление.
~%50%Ацетилирование.
~%50%Образование глюкуронидов.
}

Период «полужизни» (полуэлиминации) – это {
~Время, за которое 70% вещества подвергается биотрансформации.
=Время, за которое концентрация вещества в плазме крови снижается наполовину.
~Время, за которое половина вещества выводится из организма
}

Биодоступность лекарства – это {
~Скорость выведения препарата из организма.
~Скорость всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте после приема per os.
=Процентная часть внесосудисто введенной в организм дозы лекарственного вещества, которая попадает в системный кровоток в неизменном виде
}

Явления, возможные при повторных введениях лекарственных веществ {
~%50%Привыкание.
~%50%Тахифилаксия.
~%50%Потенцирование.
~%50%Идиосинкразия.
}

Накопление в организме лекарственных веществ, при их повторных введениях – это {

~Функциональная кумуляция.

=Материальная кумуляция.

~Сенсибилизация.

}

Эти явления могут возникать при комбинированном применении лекарственных веществ {

~%33.33333%Аддитивный эффект.

~%33.33333%Антагонизм.

~%33.33333%Потенцирование.

~%-100%Тахифилаксия.

}

Этим термином обозначают действие лекарственных веществ на эмбрион, приводящее к врожденным уродствам {

~Мутагенное действие.

~Фетотоксическое действие.

=Тератогенное действие.

~Эмбриотоксическое действие

}

Пресистемная элиминация – это {

=Потеря части лекарственного вещества (ЛС) при всасывании и первом прохождении через печень.

~Биотрансформация ЛС в организме.

~Распределение ЛС с мочой.

~Выведение ЛС с желчью

}

Для какого из препаратов биотрансформация в печени наиболее значима? {

~Гидрофильных.

=Липофильных.

~Газообразных.

}

Особенность транспорта лекарственных веществ (ЛС) через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) {

=Липидорастворимые ЛС проникают через ГЭБ путем простой диффузии.

~ Водорастворимые ЛС хорошо проникают через ГЭБ.

~При воспалении проницаемость ГЭБ снижается.

~Через ГЭБ проходят только ЛС, связанные с белком. ;

}

Какое из перечисленных ниже лекарственных средств является значимым индуктором микросомальных ферментов печени {

=Фенобарбитал

~Циметидин.

~Эритромицин.

~Пропранолол.

}

Что характерно для ректального способа введения лекарственных веществ {

~всасывание происходит путем фильтрации

~всасывание происходит путем активного транспорта

=точность дозировки выше, чем при введении через рот

~всасывание путем пиноцитоза

~действие наступает быстрее, чем при внутривенном введении

}

В каких дозах проявляются побочные эффекты {

~во всем диапазоне доз

~в токсических дозах

=в терапевтических дозах

~в минимальных дозах

~в летальных дозах

}

Основной вид лекарственной терапии {

~пульс-терапия

~вакцинация

~заместительная

~инфузия раствора

=патогенетическая терапия

}

Какое взаимодействие может иметь место при смешивании растворов в одном шприце {

~фармакологическое взаимодействие лекарственных веществ

=фармакохимическое взаимодействие

~фармакокинетическое взаимодействие

~фармакодинамическое взаимодействие

~фармакогенетическое взаимодействие

}

Атипичные реакции на лекарственные вещества, связанные с генетическими факторами {

~толерантность

~тахифилаксия

=идиосинкразия

~лекарственная зависимость

~кумуляция
}

Что характерно для введения лекарственных веществ через рот? {
~ быстрое развитие эффекта;
~ возможность использования в бессознательном состоянии;
~ возможность применения лекарств, разрушающихся в ЖКТ;
= скорость поступления лекарств в общий кровоток непостоянна;
~ необходимость стерилизации вводимых лекарств.
}

Укажите основной механизм всасывания лекарственных веществ в желудочно-кишечном тракте {
~ облегченная диффузия;
= пассивная диффузия;
~ активный транспорт;
~ пиноцитоз;
~ фильтрация.
}

Укажите, из какой лекарственной формы при приеме внутрь лекарственное вещество всасывается и поступает в кровь быстрее {
= раствор;
~ суспензия;
~ таблетки;
~ капсулы;
~ драже.
}

Что характерно для введения лекарств в виде инъекций? {
~ более быстрое развитие эффекта, чем при приеме внутрь;
~ возможность применения лекарств, разрушающихся в ЖКТ;
~ возможность использования у больных, находящихся в бессознательном состоянии;
~ необходимость стерилизации вводимых лекарств;
= все верно.
}

Укажите основной путь введения в организм газов и летучих жидкостей {
~ внутрь;
~ внутримышечно;
~ внутривенно;
= ингаляционно;
~ субарахноидально.
}

При каком способе введения биодоступность препарата 100%? {

- ~ ректальный;
 - ~ пероральный;
 - ~ сублингвальный;
 - =внутривенный;
 - ~ транскутанный.
- }

Укажите основной путь выведения лекарств из организма {

- =почками с мочой;
 - ~ печенью с желчью;
 - ~ легкими с выдыхаемым воздухом;
 - ~ потовыми железами с потом;
 - ~ молочными железами с молоком.
- }

Что характеризует такой показатель фармакокинетики как клиренс? {

- ~ скорость всасывания;
 - ~ полноту всасывания;
 - ~ характер распределения;
 - ~ содержание активной формы лекарства в крови;
 - =скорость элиминирования лекарства из организма.
- }

Какое явление может иметь место при повторных введениях лекарств? {

- =привыкание;
 - ~ идиосинкразия;
 - ~ суммирование;
 - ~ потенцирование;
 - ~ синергизм.
- }

Как называется накопление лекарственного вещества в организме при повторных его введениях? {

- ~ идиосинкразия;
 - ~ сенсibilизация;
 - ~ суммирование;
 - =материальная кумуляция;
 - ~ функциональная кумуляция.
- }

Какое явление может иметь место при комбинированном применении лекарств? {

- ~ идиосинкразия;

~ функциональная кумуляция;
~ привыкание;
~ материальная кумуляция;
=синергизм.
}