

Аллергозы

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1'

Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются все перечисленные пищевые продукты, за исключением {

=картофеля

~коровьего молока

~куриных яиц

~рыбы

~цитрусовых

}

Лекарственная аллергия в форме острой аллергической крапивницы и отека квинке {

=встречаются наиболее часто

~встречаются редко

~не встречаются совсем

~не встречаются совсем

~не встречаются совсем

}

Приобретенный первичный иммунодефицит – это {

=ВИЧ-инфекция

~Т-клеточный лейкоз

~грипп

~корь

~частые острые респираторные инфекции

}

Причиной поллинозов является {

=пыльца растений

~споры плесневых грибов

~пищевые продукты растительного происхождения

~все перечисленное

~все перечисленное

}

Что такое "оппортунистические инфекции" {

~инфекции, вызванные патогенными микробами

~инфекции вызванные вирусами

=инфекции вызванные нормальной микрофлорой при ВИЧ-инфекции

~инфекции, вызванные простейшими

~инфекции, вызванные грибами
}

Вич относится к семейству {
~ретровирусов (Retroviridae), к типу ротавирусов
~парамиксовирусов (Paramyxoviridae), к роду РС-вирусов
~ретровирусов (Retroviridae), подсемейству онковирусов
=ретровирусов, подсемейству лентивирусов
~ретровирусов, подсемейству лентивирусов
}

Наиболее важным медиатором патогенеза анафилактического шока является {
=гистамин
~ацетилхолин
~серотонин
~ФАТ
~медленно действующее вещество анафилаксии
}

Иммуноглобулины - это сывороточные белки, относящиеся к классу {
~альфа-глобулинов
~бета-глобулинов
=гамма-глобулинов
~липопротеидам
~гликопротеидам
}

Роль иммуноглобулина е в развитии аллергических реакций {
=формирует немедленные аллергические реакции .
~участвует в формировании иммунокомплексных аллергических реакций
~участвует в формировании реакций гиперчувствительности замедленного типа
~участвует в цитотоксических иммунных реакциях
~участвует в цитотоксических иммунных реакциях
}

Патофизиологическая стадия аллергической реакции при бронхиальной астме - это {
~стадия образования медиаторов

~стадия изменений в иммунной системе
=стадия клинических проявлений
~стадия выброса медиаторов
~стадия разрушения медиаторов
}

Через сколько времени развивается молниеносная форма анафилактического шока {
=сразу после контакта с аллергеном
~через 1-2 мин
~через 2-3 мин
~через час
~через 15-20 минут
}

Через сколько времени развивается тяжелая форма шока {
=через 3-4 мин
~через 5-7 мин
~через 7-10 мин
~через 10-12 мин
~через 10-12 мин
}

Блок В (25%)_ **ТЗ Форма 2²**

Объем форсированного выдоха за первую секунду (офв1) снижен {
~%50% при бронхиальной астме
~%-33.33333%при бронхите
~%50% при эмфиземе легких
~%-33.33333%при бронхоэктатической болезни
~%-33.33333%при очаговой пневмонии
}

Выберите современную классификацию бронхиальной астмы {
~%-33.33333%Аллергическая, не аллергическая, смешанная
~%-33.33333%Атопическая, инфекционно-зависимая, смешанная
~%-33.33333%Экзогенная, эндогенная, аспириновая, атопическая
~%50% Эндогенная, экзогенная, аспириновая, астма физической нагрузки, профессиональная

~%50% Атопическая,
инфекционно-обусловленная (зависимая),
смешанная
}

Чаще всего анафилактический шок вызывает {
~%50% ужаление перепончатокрылыми
~%-33.33333% укусы комаров
~%-33.33333% укусы клопов
~%50% лекарственные средства
~%-33.33333% пищевые аллергены
}

Для бронхиальной астмы, вызванной физическим усилием, характерны все перечисленные симптомы, за исключением {
~%-33.33333% уменьшения бронхоспазма при повторяющихся нагрузках
~%50% влияния факторов окружающей среды (температура воздуха, влажность и др.)
~%-33.33333% высокой встречаемости среди больных бронхиальной астмой
~%50% возникновения приступа в начале физической нагрузки
~%-33.33333% возникновения приступа в конце физической нагрузки
}