

Результаты лабораторного исследования крови не зависят от: {

- ~ температуры воздуха помещения;
 - = от времени суток;
 - ~ психологического состояния пациента;
 - ~ правильности техники забора крови;
 - ~ приема пищи
- }

Различают следующие исследования крови, кроме: {

- ~ общеклинический метод;
 - ~ биохимический метод;
 - ~ иммунологический метод;
 - = метод флотации;
 - ~ определение группы крови
- }

Общий анализ крови не включает изучение содержания: {

- ~ эритроцитов;
 - ~ лейкоцитов;
 - ~ тромбоцитов;
 - ~ определения количества гемоглобина и СОЭ;
 - = сахара крови
- }

Незначительные колебания состава крови в течение суток у здорового человека не происходит под влиянием: {

- ~ приема пищи;
 - ~ количества принятой жидкости;
 - ~ физической нагрузки;
 - ~ температуры воздуха;
 - = умственной работы
- }

Биохимическое исследование крови не включает определение содержания: {

- ~ глюкозы крови;
- ~ билирубина;
- ~ холестерина;
- ~ креатинина;
- = фенолфталеина

}

Правила подготовки больного для биохимического исследования крови: {

~ накануне исследования рекомендовать больше употреблять жидкости

~ ограничить употребление углеводов

~ ограничить употребление белков

~ нет никаких ограничений

= исследование проводить утром натощак при обычной физиологической диете

}

Забор крови на биохимические исследования проводится: {

~ в приемном покое

= в процедурном кабинете процедурной медсестрой

~ на сестринском посту постовой медсестры

~ в лаборатории лаборантом

~ правила не существуют

}

Место забора крови для общеклинического исследования: {

~ из указательного пальца левой кисти

= наружная поверхность IV пальца левой кисти

~ из пальца левой ноги

~ из вен кисти

~ внутренней поверхности предплечья

}

Нормальные показатели гемоглобина здорового мужчины: {

~ 110-140 г/л

~ 120-140 г/л

= 130-160 г/л

~ 140-170 г/л

~ выше 100 г/л

}

Нормальные показатели гемоглобина здоровой женщины: {

~ 110-140 г/л

= 120-140 г/л

~ 130-160 г/л

~ 140-170 г/л
~ выше 100 г/л
}

Нормальное содержание лейкоцитов у взрослого человека: {
~ $12,3-15,3 \cdot 10^9/\text{л}$
~ $10,7-12,9 \cdot 10^9/\text{л}$
~ $2,5-3,6 \cdot 10^9/\text{л}$
= $4,4-8,8 \cdot 10^9/\text{л}$
~ $9,1-10,5 \cdot 10^9/\text{л}$
}

Нормальные показатели СОЭ у мужчин: {
~ 1-10 мм/час
~ 8-13 мм/час
~ 12-16 мм/час
~ 13-19 мм/час
= 20-22 мм/час
}

Нормальные показатели СОЭ у женщин: {
~ 16-19 мм/час
~ 20-23 мм/час
~ 17-20 мм/час
~ 18-24 мм/час
= 2-15 мм/ час
}

Исследование мочи не позволяет определить: {
~ физические свойства;
~ химический состав;
~ относительную плотность;
~ микроскопию осадка;
= конкретно выявить заболевание
}

В направлении на анализ мочи нужно указать: {
~ фамилию пациента;
~ фамилию и инициалы;

~ фамилию, инициалы и возраст;
= фамилию, инициалы, возраст, место нахождения пациента;
~ фамилию и место нахождения
}

Что нужно сделать пациенту перед сбором мочи на анализ (в стационаре)? {
~ умыться;
~ почистить зубы;
= подмыться;
~ заполнить бланк направления;
~ выпить стакан воды
}

Что необходимо подготовить для сбора мочи на сахар в суточном количестве? {
= 2-3 литровую чистую стеклянную банку с крышкой и банку 200 мл
~ банку 200-250мл;
~ направление;
~ историю болезни;
~ банку на 2-3 литра и направление
}

Какой лабораторной посудой должна обеспечить пациента медицинская сестра стационара для сбора мокроты на бактериологическое исследование {

~ чистой сухой банкой из светлого стекла;
~ чистой сухой банкой из тёмного стекла;
~ чистой сухой банкой с крышкой;
~ карманной плевательницей;
= стерильной емкостью с крышкой.
}

Выберите из предложенных вариантов правильные действия перед сбором мокроты на бактериологическое исследование {

= вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы,
утром после сна прополоскать рот кипячёной водой;
~ утром после сна тщательно прополоскать рот кипячёной водой;
~ вечером, накануне исследования, перед сном тщательно прополоскать рот
кипячёной водой;
~ утром после сна тщательно почистить зубы;
~ утром после сна прополоскать рот раствором антисептика.

}

В какую посуду собирают мокроту на клинический анализ{

~ на чашку Петри;
~ в стерильную пробирку;
= в чистую стеклянную банку;
~ в стерильную стеклянную банку с крышкой;
~ на салфетку.

}

Кровь на биохимические анализы берется{

= утром натощак;
~ после завтрака;
~ в любое время суток;
~ перед обедом;
~ через 2 часа после еды.

}

Какое количество крови необходимо для определения одного показателя
биохимического обследования{

= 1 — 2 мл;
~ 0,5 мл;
~ 3 мл;
~ 5 мл;
~ 10 мл.

}

Выберите правильное утверждение. Условие необходимое для качественного проведения биохимического исследования крови {

- ~ собранный материал может храниться в холодильнике не более суток;
- ~ собранный материал доставляется в лабораторию, обязательно в тёплом виде, хранение в холоде не допустимо;
- = собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 1,5 часов после сбора;
- ~ собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 6 часов после сбора;
- ~ собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 12 часов после сбора.

}

В какую лабораторию следует доставить кал для исследования на яйца гельминтов {

- ~ биохимическую;
- = клиническую;
- ~ иммунологическую;
- ~ бактериологическую;
- ~ цитологическую.

}

Какое количество кала необходимо для исследования на яйца гельминтов {

- ~ 1 — 2 г;
- ~ 3 г;
- = 5 г;
- ~ 10 г;
- ~ 20 г.

}

В какую ёмкость собирается кал для исследования на скрытую кровь {

- ~ стерильную пробирку;
- = чистую сухую стеклянную посуду с широким горлом и крышкой;
- ~ спичечную коробку;

- ~ пробирку с консервантом;
- ~ чистую сухую банку с крышкой.

}

Моча для общего клинического анализа направляется в лабораторию {

- = клиническую;
- ~ бактериологическую;
- ~ биохимическую;
- ~ иммунологическую;
- ~ цитологическую.

}

Исследование мочи по Зимницкому позволяет определить {

- ~ количество сахара, ацетона;
- ~ количество форменных элементов, бактерий;
- ~ наличие уробилина, желчных пигментов;
- = плотность (удельный вес) мочи и диурез;
- ~ количество эритроцитов, лейкоцитов.

}

Выберите правильное утверждение. При проведении исследования мочи по Зимницкому {

- ~ порции собираются каждый час;
- ~ утром однократно всю порцию;
- = порции собирают каждые 3 часа;
- ~ берётся только средняя порция в любое время;
- ~ собирается за сутки и отливается 100 мл для исследования.

}

Выберите правильное утверждение. При проведении исследования мочи по Нечипоренко {

- ~ порции собираются каждый час;
- ~ утром однократно всю порцию;
- ~ порции собирают каждые 3 часа;

= берётся только средняя порция мочи утром;
~ собирается за сутки и отливается 100 мл для исследования.

}

Для исследования мочи по Зимницкому необходимо собрать следующее количество порций мочи {

~ 1;
~ 3;
~ 6;
= 8;
~ 10.

}

Какое количество мочи необходимо для исследования мочи по Зимницкому {

~ 1500 мл;
= вся собранная за сутки;
~ 250 — 300 мл;
~ 100 — 200 мл;
~ 500 — 1000 мл.

}

У больного ночной диурез больше дневного. Выберите правильное определение этому состоянию {

~ полиурия;
= никтурия;
~анурия;
~ олигурия;
~ протеинури

}

Для общего клинического анализа мочи необходимо приготовить {

~ чистую сухую стеклянную банку ёмкостью 2 — 3 литра и банку ёмкостью 200 — 300 мл;
= чистую сухую стеклянную банку с крышкой предварительно промытые

содой, ёмкостью 200 мл;
~ 8 основных и 1 — 2 дополнительных чистых стеклянных банок емкостью 250 — 500 мл;
~ любую чистую ёмкость;
~ стерильную емкость с крышкой.

}

Для исследования мочи по Зимницкому необходимо приготовить {

~ чистую сухую стеклянную банку ёмкостью 2 — 3 литра и банку емкостью 200 — 300 мл;
~ чистую сухую стеклянную банку с крышкой предварительно промытые содой, ёмкостью 200 мл;
= 8 основных и 1 — 2 дополнительных чистых стеклянных банок емкостью 250 — 500 мл;
~ любую чистую ёмкость;
~ стерильную емкость с крышкой.

}

Пациент должен начать сбор мочи по Зимницкому {

~ в 5 часов утра;
= в 6 часов утра;
~ в 7 часов утра;
~ в 8 часов утра;
~ в 9 часов утра.

}

Для бактериологического исследования мочи необходимо приготовить {

~ чистую сухую стеклянную банку ёмкостью 2 — 3 литра и банку емкостью 200 — 300 мл;
~ чистую сухую стеклянную банку с крышкой предварительно промытые содой, ёмкостью 200 мл;
~ 8 основных и 1 — 2 дополнительных чистых стеклянных банок емкостью 250 — 500 мл;
~ любую чистую ёмкость;
= стерильную емкость с крышкой.

}

У больного суточный диурез составил 0 мл. Выберите правильное определение этому состоянию{

- = анурия;
- ~ полиурия;
- ~ никтурия;
- ~ дизурия;
- ~ протеинурия.

}

Моча в лабораторию для бактериологического исследования должна быть доставлена{

- = если невозможно сразу, то в течение 24 часов при условии хранения в холодильнике;
- ~ в течение 4 часов;
- ~ в течение 2 часов;
- ~ не позже часа, как собрана моча;
- ~ в любое время.

}

В норме плотность мочи в среднем равна{

- ~ 1030 — 1040;
- ~ 1020 — 1030;
- ~ 1012 — 1020;
- = 1005 — 1025;
- ~ 1001 — 1002

}

Чем проводится прокол пальца для забора крови на общий анализ{

- ~ инъекционной иглой
- ~ скальпелем
- = скарификатором

~ концом предметного стекла

~ иглой Франка

}

Что не требуется при подготовке больного для сбора мочи на общий анализ {

~ емкость 200 мл;

~ кипяченую воду и мыло;

~ гигиеническую салфетку;

~ направление на анализ;

=почистить зубы

}

Что нужно сделать пациенту перед сбором мочи на анализ (в стационаре)? {

~ умыться;

~ почистить зубы;

=подмыться;

~ заполнить бланк направления;

~ выпить стакан воды

}

Оснащения при проведении пробы по Зимницкому не входит: {

~ 8 чистых сухих банок емкостью по 200-300 мл;

~ 2—дополнительные стеклянные банки;

~ этикетки с указанием № порции;

= кружка Эсмарха;

}

Направление на анализ крови не включает: {

~ фамилии и инициалы больного;

~ его возраст;

~ отделение больницы и палата;

~ название анализа (цель исследования);

= даты поступления в стационар.

}

Какие данные не получают при сборе мочи по Нечипоренко? {

~ количественное определение форменных элементов крови;

~ количественное определение лейкоцитов;

~ количественное определение эритроцитов;

~ количественное определение цилиндров;

=количественное определение бактерий.

}

