

При ушибе в качестве средства первой помощи применяют {
~ согревающий компресс
= пузырь со льдом
~ горячий компресс
~ влажное обертывание
}

Одним из показаний для применения согревающего компресса является {
~ острый аппендицит
~ кровотечение
~ ушибы в первые часы
= инфильтрат на месте инъекций
}

Одним из противопоказаний для применения грелки является {
= острый аппендицит
~ не осложненная язвенная болезнь желудка
~ сухой плеврит
~ бронхиты
}

Пузырь со льдом местно следует применять при {
~ приступе почечной колики
~ артритах
~ пневмонии
= кровотечении
}

Температура воды для согревающего компресса составляет (в °C) {
~ 50-60
~ 37-38
= 20-22
~ 12-15
}

Показания для постановки пиявок {

= гипертония
~ анемия
~ гипотония
~ повышенная кровоточивость тканей
}

Противопоказанием к постановке пиявок является {
~ артериальная гипертония;
~ тромбоз сосудов головного мозга;
= гемофилия;
~ венозный застой крови.
}

При повышенной чувствительности кожи, для прокладки между кожей и горчичниками можно использовать {
~ газету;
~ компрессную бумагу;
= марлевую салфетку;
~ полотенце;
~ вату.
}

Длительное расширение кровеносных сосудов и притока крови к тканям вызывает процедура {
~ холодный компресс;
= согревающий компресс;

~ горячий компресс;
~ лекарственный компресс;
~ примочки.
}

Четвёртым слоем согревающего компресса является {
~ восьмислойная марлевая салфетка;
~ вата;

~ компрессная бумага или компрессная клеёнка;
= бинт или лейкопластырь

~ тёплая пелёнка.

}

Назовите, при каком состоянии необходимо применить грелку {

~ кровотечение;

~ ушибы в первые сутки;

~ острые воспалительные процессы в брюшной полости;

= ушибы на вторые сутки;

~ второй период лихорадки.

}

Выберите, какое состояние является показанием для постановки пиявок {

~ анемия;

~ гипотония;

~ повышенная кровоточивость тканей;

= артериальная гипертензия;

~ лечение антикоагулянтами.

}

Первым слоем согревающего компресса является {

= восьмислойная марлевая салфетка;

~ вата;

~ компрессная бумага или компрессная клеёнка;

~ бинт или лейкопластырь;

~ тёплая пелёнка.

}

На какое время накладываются горчичники {

~ 30 — 40 минут;

~ 20 — 30 минут;

~ 15 — 20 минут;

= 10 — 15 минут

~ 2 — 3 минут.

}

Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе {

~ гепарин;

~ токсин;

~ гиалит;

= гирудин;

~ адреналин.

}

Для ускорения присасывания пиявок участок кожи пациента следует протереть раствором {

~ 10% натрия хлорида;

~ 6% столового уксуса;

= 40% глюкозы;

~ 3% перекиси водорода;

~ 70% спирт.

}

Пиявки на область копчика ставятся при заболеваниях {

~ стенокардия;

~ тромбофлебит;

~ артериальная гипертония;

= геморрой;

~ венозный застой печени.

}

Пиявки на область сердца ставятся при заболеваниях {

~ артериальная гипертония;

~ тромбофлебит;

= стенокардия;

~ геморрой;

~ венозный застой печени

}

Какие осложнения могут быть при гирудотерапии {

~%30%кровотечение более 24 часов;

~%300%инфицирование ранки;

~%20%обморок;

~%20%зуд кожи вокруг ранки;

~%-100%повышение свертываемости

}

Назовите, при каком состоянии нельзя использовать грелку {

~ гематома на вторые сутки;

~ неврологические заболевания;

~ первый и третий периоды лихорадки;

= острые воспалительные процессы в брюшной полости;

~ дуоденальное зондирование.

}

Как приготовить пузырь со льдом {

~ налить воду, затем положить кусочки льда;

= положить кусочки льда, затем налить холодную воду;

~ налить воду в пузырь и заморозить в холодильнике;

~ положить только кусочки льда;

~ смешать воду со льдом и залить в пузырь

}

Выберите правильное утверждение. Обернуть грелку полотенцем, прежде чем подать больному {

= да, необходимо;

~ не имеет значения;

~ не нужно, можно положить грелку на одежду;

~ не нужно, можно положить грелку на одеяло;

~ да, если чувствительная кожа.

}

К мягким повязкам относится {

~ гипсовая повязка

= косыночная повязка

~ шина Крамера

~ аппарат Илизарова

}

При ушибе плечевого сустава накладывают повязку {

~ черепашью

= колосовидную

~ восьмиобразную

~ Дезо

}

Для транспортной иммобилизации используется {

~ шина Кузьминского

~ шина Белера

= шина Крамера

~ шина ЦИТО
}

Вид повязки при растяжении связок в голеностопном суставе {
~ спиральная
= восьмиобразная
~ колосовидная
~ черепашья
}

Лейкопластырные повязки относятся к {
~ давящим
= клеевым
~ твердым
~ жидким
}

Крестообразную повязку применяют при повреждении {
~ плечевого сустава
~ коленного сустава
= лучезапястного сустава
~ III пальца кисти
}

При оказании помощи пострадавшему с травмой ключицы целесообразно использовать {
~ шину Крамера
= повязку Дезо
~ гипсовую лонгету
~ колосовидную повязку
}

Окклюзионную повязку используют при {
~ артериальном кровотечении
~ переломе ребер
~ клапанном пневмотораксе
= открытом пневмотораксе
}

Вид повязки при венозном кровотечении {

= давящая

~ окклюзионная

~ спиральная

~ лейкопластырная

}

Повязка, применяемая при ранении пальцев кисти {

~ крестообразная

= "перчатка"

~ черепашья

~ змеевидная

}

При переломе нижней челюсти необходима повязка {

~ возвращающаяся

= пращевидная

~ восьмиобразная

~ крестообразная

}

Повязка, применяемая при носовом кровотечении {

~ лейкопластырная

= пращевидная

~ "уздечка"

~ циркулярная

}

При травме коленного сустава накладывают повязку {

= черепашью

~ змеевидную

~ спиральную

~ колосовидную

}

После вскрытия карбункула на задней поверхности шеи лучше использовать повязку {

~ "чепец"

= крестообразную

~ "уздечку"

~ возвращающуюся
}

Повязку Дезо используют при переломе {
~ костей предплечья
~ грудины
= ключицы
~ ребер
}

При ожоге кисти кипятком накладывают повязку {
~ сходящуюся
~ клеевую
= "варежка"
~ "перчатка"
}

Лейкопластырная черепицеобразная повязка накладывается при переломе {
~ грудины
= ребер
~ ключицы
~ позвоночника
}

К твердым повязкам относится {
~ бинтовая
= гипсовая
~ клеевая
~ давящая
}

При вывихе плеча применяют повязку {
= косыночную
~ спиральную
~ восьмиобразную
~ круговую
}

При открытых переломах накладывают гипсовую повязку {

~ мостовидную
= окончатую
~ створчатую
~ лонгетную
}

При переломе лодыжек накладывают гипсовую повязку {
~ U-образную
~ мостовидную
= сапожок
~ циркулярную
}

После вправления вывиха плеча накладывают гипсовую повязку {
= Дезо
~ колосовидную
~ крестообразную
~ Вельпо
}

Абсолютный признак перелома костей {
~ деформация сустава
~ деформация мягких тканей
~ отек
= патологическая подвижность костных отломков
}

Признак, характерный только для перелома {
~ кровоподтек
~ припухлость
= крепитация костных отломков
~ нарушение функции конечности
}

Симптом, характерный только для вывиха {
~ боль
~ гиперемия
~ нарушение функции
= пружинящая фиксация

}

Первая помощь при закрытом вывихе{

- ~ наложение давящей повязки
 - ~ тепло на место повреждения
 - = транспортная иммобилизация
 - ~ асептическая повязка
- }

При сохраненной целостности кожи определяется локальная боль, крепитация и деформация конечности, можно предположить{

- ~ повреждение связочного аппарата
 - ~ ушиб мягких тканей
 - ~ вывих
 - = закрытый перелом
- }

Тепловые процедуры при ушибе мягких тканей назначают{

- = на 2-3 сутки
 - ~ сразу после травмы
 - ~ через несколько часов
 - ~ не назначают вообще
- }

Отличительный признак ожога II степени{

- ~ гиперемия
 - ~ боль
 - = наличие пузырей или их остатков
 - ~ отек тканей
- }

При переломе костей предплечья шина накладывается{

- ~ от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
 - ~ от лучезапястного до локтевого сустава
 - ~ на место перелома
 - = от кончиков пальцев до верхней трети плеча
- }

В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом{

- ~ костей таза

~ позвоночника
~ бедра
= костей стоп
}

Лежа на спине на щите транспортируют пациентов с {
~ переломом ребер
~ ушибом грудной клетки
~ травмой органов брюшной полости
= переломом грудного отдела позвоночника
}

Для транспортной иммобилизации при черепно-мозговой травме применяют шину {
~ Белера
~ Дитерихса
= Еланского
~ Виноградова
}

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют {
~ ватно-марлевые кольца Дельбе
= ватно-марлевый воротник Шанца
~ шину Дитерихса
~ крестообразную повязку
}

К глубоким термическим ожогам относят ожоги степени тяжести {
~ II
= III В
~ III А
~ IV
}

Причина ожогового шока {
~ спазм сосудов кожи
~ психическая травма
= боль и плазмопотеря

~ кровотечение
}

Степень отморожения можно определить {
~ сразу после согревания
~ на 2-ой день
~ в дореактивном периоде
= спустя несколько дней
}

Характерный признак отморожения II степени {
~ некроз всей толщи кожи
= образование пузырей
~ обратимая сосудистая реакция
~ мраморность кожи
}

Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается {
~ наличием "светлого промежутка"
= отсутствием очаговой симптоматики
~ наличием повышенного АД
~ нарушением сна
}

У детей наблюдаются, как правило, переломы {
~ косые
= по типу "зеленой веточки"
~ компрессионные
~ полные
}

При сдавлении грудной клетки пострадавшему нужно ввести
обезболивающее и {
~ уложить на живот
~ уложить на спину
~ уложить на бок
= придать полусидячее положение
}

Признаки гемоторакса{

~ одышка, на стороне поражения, дыхание не прослушивается, перкуторно коробочный звук

= притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, прогрессирующее падение АД

~ крепитация при надавливании на кожу грудной клетки, затрудненное дыхание

~ шум трения плевры, боль при дыхании

}

Причина травматического шока{

~ нарушение дыхания

~ интоксикация

= болевой фактор

~ психическая травма

}

При электротравме не наблюдается{

= повышение температуры тела

~ повышение АД

~ паралич сфинктеров

~ судорожное сокращение мышц

}

Для лечения перелома ключицы не используют{

~ кольца Дельбе

~ металлоостеосинтез

~ гипсовую повязку

= "черепичную" лейкопластырную повязку

}

Вынужденное положение конечности и деформация в области плечевого сустава характерны для{

~ ушиба

~ артрита

= вывиха

~ опухоли

}

При ушибах в первую очередь необходимо {

~ наложить согревающий компресс

= применить пузырь со льдом

~ сделать массаж

~ произвести пункцию сустава

}

При ушибе рекомендуется местно применить холод на {

= 30 мин.

~ 6 час.

~ 2 дня

~ 7 дней

}

При переломах костей для создания импровизированной шины лучше всего использовать {

~ бинт

~ резину

~ плотную ткань

= доску

}

Достоверным признаком шока является {

= падение артериального систолического давления

~ потеря сознания

~ кровотечение

~ бледность кожных покровов

}

Основное правило наложения шины {

~ только на место перелома

~ с захватом сустава, расположенного выше места перелома

~ с захватом сустава, расположенного ниже места перелома

= с захватом не менее 2-х суставов, расположенных выше и ниже места перелома

}