

Укажите нормальную частоту пульса взрослого пациента за одну минуту {  
~ 40 - 50;  
= 60 - 80;  
~ 70 - 90;  
~ 50 - 70;  
~ 90 – 100  
}

Если пульс у тяжелобольного не определяется на лучевой артерии, то медсестра обязана попробовать определить его на артерии {  
~ тыла стопы;  
~ подколенной;  
= сонной;  
~ височной;  
~ локтевой  
}

Какими пальцами пальпируют пульсирующую лучевую артерию при исследовании пульса? {  
~ первым пальцем;  
~ первым и вторым;  
~ вторым и третьим;  
= вторым, третьим, четвертым;  
~ вторым, третьим, четвертым и пятым  
}

Пульс ритмичный у взрослого пациента определяют {  
~ за одну минуту;  
= за 30 секунд, умножая результат на два;  
~ за 15 секунд, умножая результат на четыре;  
~ за 10 секунд, умножая результат на шесть;  
~ за 6 секунд, умножая результат на десять  
}

Пульс аритмичный у взрослого пациента определяют {  
= за одну минуту;  
~ за 30 секунд, умножая результат на два;  
~ за 15 секунд, умножая результат на четыре;

~ за 10 секунд, умножая результат на шесть;  
~ за 6 секунд, умножая результат на десять  
}

Места определения пульса все, кроме {  
~ сонной артерии;  
~ височной артерии;  
~ лучевой артерии;  
= брюшной аорты;  
~ артерии тыла стопы  
}

Какое условие обязательно должно быть соблюдено перед стандартным измерением артериального давления {  
~ через 1-2 часа после еды;  
~ через 1 час после курения;  
~ через 1 час после приема кофе;  
~ через 2 часа после водных процедур;  
= все выше перечисленные  
}

Стандартное измерение артериального давления проводят {  
~ через 1-2 часа после еды;  
~ через 1 час после курения;  
~ через 1 час после приема кофе;  
~ после 10 минутного отдыха;  
= всё перечисленное верно  
}

Измерение артериального давления проводится {  
= только сидя и лежа;  
~ только лёжа;  
~ сидя, лёжа, стоя;  
~ только стоя;  
~ нет правильного ответа

Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется {

~ максимальным артериальным давлением;  
~ минимальным артериальным давлением;  
= пульсовым давлением;  
~ дефицитом пульса;  
~ рабочим давлением  
}

Какое оборудование используют для измерения артериального давления? {  
= тонометр;  
~ термометр;  
~ динамометр;  
~ спирометр;  
~ фонендоскоп  
}

Каким прибором выслушиваются тоны на плечевой артерии при измерении артериального давления? {  
~ пальпируются пальцами;  
= фонендоскопом;  
~ тонометром;  
~ пикфлоуметром;  
~ термометром  
}

Выберите правильное утверждение. Манжету прибора для измерения артериального давления необходимо закреплять {  
~ чтобы между манжеткой и плечом не проходило ни одного пальца;  
= чтобы между манжеткой и плечом проходило 2 пальца;  
~ чтобы между манжеткой и плечом проходил 1 палец;  
~ манжетка туго должна обхватывать плечо;  
~ не имеет значения  
}

Каково правильное положение руки больного при измерении артериального давления {  
~ согнута в локтевом суставе, ладонью вверх;  
~ согнута в локтевом суставе, ладонью вниз;  
~ разогнута в локтевом суставе ладонью вниз;

= разогнута в локтевом суставе ладонью вверх;  
~ рука опущена вниз  
}

Выберите правильное утверждение. Манжету прибора для измерения артериального давления необходимо закреплять {  
~ чтобы между манжеткой и плечом не проходило ни одного пальца;  
= чтобы между манжеткой и плечом проходило 2 пальца;  
~ чтобы между манжеткой и плечом проходил 1 палец;  
~ манжетка туго должна обхватывать плечо;  
~ не имеет значения  
}

Каково правильное положение руки больного при измерении артериального давления {  
~ согнута в локтевом суставе, ладонью вверх;  
~ согнута в локтевом суставе, ладонью вниз;  
~ разогнута в локтевом суставе ладонью вниз;  
= разогнута в локтевом суставе ладонью вверх;  
~ рука опущена вниз  
}

Нормальные цифры систолического артериального давления по классификации ВОЗ (мм.рт. ст.) {  
~ 120 - 130;  
= 120 - 129;  
~ 100 - 110;  
~ 70 - 80;  
~ 40 – 50  
}

Физиологическая температура тела пациента чаще бывает ниже {  
= утром  
~ в обед  
~ вечером  
~ ночью  
~ не изменяется в течение суток  
}

Выберите время измерения температуры в подмышечной впадине ртутным термометром {

= 10 минут

~ 5 минут

~ 7 минут

~ 15 минут

~ 20 минут

}

Перед измерением температуры тела подмышечную впадину следует {

= осмотреть и насухо вытереть

~ обмыть водой и вытереть

~ протереть спиртом

~ только осмотреть

~ протереть любым кожным антисептиком

}

При подсчёте частоты дыхательных движений учитывается только количество {

= вдохов

~ выдохов

~ задержки на вдохе

~ задержки на выдохе

}

Во время первого визита пациента измерять АД необходимо ~1 раз на одной руке

~ 2 раза на одной руке

~ 3 раза на одной руке

= 1 раз на обеих руках

~3 раза на обеих руках

}

Каким прибором выслушиваются тоны на плечевой артерии при измерении артериального давления? ~ пальпируются пальцами

= фонендоскопом

~ тонометром

~ пикфлоуметром

~ термометром

}

При измерении артериального давления медсестра услышала появление тонов Короткова (систолическое давление), а диастолическое определить не смогла. В чём причина? {

~ слишком мало воздуха в манжете

~ слишком плотно прижата головка фонендоскопа к плечевой артерии

~ слишком много воздуха в манжете

= слишком быстро выпущен воздух из манжеты

~ несоответствие размера манжеты и окружности плеча

}

Какими пальцами пальпируют пульсирующую лучевую артерию при исследовании пульса? {

~ первым пальцем

~ первым и вторым

~ вторым и третьим

= вторым, третьим, четвертым

~ вторым, третьим, четвертым и пятым

}

Для проведения регистрации электрокардиограммы следует попросить пациента {

~ оголить предплечья и голени

~ полностью раздеться

= освободить от одежды верхнюю часть туловища ( до пояса ) , нижнюю часть голени и предплечий

}

Грудной электрод V1 или C1 следует устанавливать {

~ 4 межреберье слева от грудины

~ 2 межреберье справа от грудины

~ 5 межреберье по передней подмышечной линии

= 4 межреберье справа от грудины

}

Электрокардиография это {

~ Метод исследования морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата

~Метод исследования циркуляции крови в кровяном русле  
= Метод исследования сердечно-сосудистой системы, при котором происходит регистрация электрической активности сердца  
}

При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод {  
~ зеленый

~ желтый

= красный

~ черный

}

Место установки грудного электрода при записи отведения V4 {

~ межреберье справа от грудины

~ 4 межреберье слева от грудины

~ 5 межреберье слева от грудины

= 5 межреберье по левой среднеключичной линии

}

При записи ЭКГ на правую ногу накладывается электрод: {

~зеленого цвета

~ желтого цвета

= черного цвета

~красного цвета

}

При записи ЭКГ грудной V3 электрод располагается: {

~у левого края грудины в IV межреберье

=между электродами V2 и V4

~по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

~по левой передней подмышечной линии на уровне электрода V4  
}

При записи ЭКГ грудной V4 электрод располагается: {

~у левого края грудины в IV межреберье

~у правого края грудины в IV межреберье

=по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

~по передней подмышечной линии в VI межреберье  
}

При записи ЭКГ грудной V5 электрод располагается по левой: {

~срединно-ключичной линии в V межреберье

=передней подмышечной линии на уровне электрода V4

~средней подмышечной линии на уровне электрода V4

~задней подмышечной линии на уровне электрода V4  
}

Диастолическим давлением называется {

= давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца

~ артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

~ разница между систолическим и диастолическим давлением

~ сумма систолического и диастолического давления  
}

Выберете одно из свойств пульса {

= напряжение;

~ гипотония;

~ тахипноз;



~ атония;  
~ дистония.

}

О каком показателе артериального давления мы можем судить при исчезновении тонов Короткова над плечевой артерией? {

~ пульсовое давление;  
= диастолическое давление;  
~ систолическое давление;  
~ артериальное давление;  
~ рабочее давление.

}

К параметрам, определяющим величину артериального давления, относят {

~ сила сокращений сердца;  
~ частота сокращений сердца;  
= тонус стенки артерий;  
~ от физической нагрузки;  
~ возраст пациента.

}

Основные мероприятия при выведении из клинической смерти {

~ дать понюхать нашатырный спирт  
~ проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)  
~ проведение закрытого массажа сердца  
= одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца  
}

При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека производят {

~ всей ладонью  
= проксимальной частью ладони  
~ тремя пальцами  
~ одним пальцем  
}

Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним лицом {

~ на 1 вдох - 5 компрессий

~ на 2 вдоха - 4 компрессии

~ на 3 вдоха - 6 компрессий

= на 2 вдоха - 30 компрессий

}

При остановке сердца применяется сочетание препаратов {

~ атропин, мезатон, гидрокарбонат натрия

~ эуфиллин, калия хлорид, гидрокарбонат натрия

= адреналин, атропин, гидрокарбонат натрия, кальция хлорид

~ кальция хлорид, лидокаин, мезатон

}

При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой лежит пациент, обязательно должна быть {

= жесткой

~ мягкой

~ наклонной

~ неровной

}

«Тройной» прием для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает {

~ положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута вперед

= под лопатки подложен валик, голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед

~ положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней

~ положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней

}

Признак эффективности реанимационных мероприятий {

~ отсутствие экскурсий грудной клетки

~ зрачки широкие  
~ отсутствие пульсовой волны на сонной артерии  
= появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков  
}

Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку двумя лицами {  
~ на 1 вдох - 2 компрессии  
~ на 1 вдох - 10 компрессий  
= на 1 вдох - 5 компрессий  
~ на 2 вдоха - 15 компрессий  
}

ИВЛ новорожденному желательно проводить {  
~ методом «изо рта в рот»  
~ с помощью маски наркозного аппарата  
~ методом «изо рта в нос»  
= эндотрахеальным способом  
}

Продолжительность проведения аппаратной ИВЛ при реанимации, если не появляется спонтанное дыхание {  
~ 20 минут  
~ 15 минут  
~ 10 минут  
= решается коллегиально, через несколько дней  
}

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть {  
~ повернута на бок  
= запрокинута назад  
~ согнута вперед  
~ в исходном положении  
}

Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии {  
~ 1-2 минуты  
= 5-7 минут

~ 25-30 минут  
~ 8-10 минут  
}

Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому человеку {  
~ 8-10 в 1 минуту  
~ 30-32 в 1 минуту  
= 12-20 в 1 минуту  
~ 20-24 в 1 минуту  
}

Признаки клинической смерти {  
= потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях  
~ спутанность сознания и возбуждение  
~ нитевидный пульс на сонных артериях  
~ дыхание не нарушено  
}

Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца {  
~ перелом ключицы  
= перелом ребер  
~ повреждение трахеи  
~ перелом позвоночника  
}

Достоверные признаки клинической смерти {  
~ отсутствие дыхания, отсутствие сердцебиения, отсутствие сознания, расширенные зрачки без реакции на свет;  
= поверхностное и учащенное дыхание, узкие зрачки без реакции на свет, нитевидный пульс;  
~ судороги, холодные конечности, тахипноэ, гипотензия; ~ фибрилляция желудочков, пульс малого наполнения, диспноэ, цианоз  
}

Достоверный признак остановки сердца {  
~ апноэ;  
= отсутствие пульса на сонной артерии;  
~ отсутствие сознания;

~ широкий зрачок без реакции на свет

}

К терминальным состояниям относится {

~ биологическая смерть;

=период агонии;

~ постреанимационная болезнь;

~ продромальный период

}

Основные признаки клинической смерти{

~ нитевидный пульс на сонной артерии;

~отсутствие пульса на лучевой артерии;

~ отсутствие пульса на сонной артерии;

= расширение зрачков.

}

Реанимация – это процесс {

~ замещения функции дыхания;

~ защиты пациента от операционной травмы;

~ лечения терминальных состояний;

= оживления организма.

}

Соотношение компрессий на грудину и дыханий при проведении реанимации взрослому человеку {

~ на 15 компрессий – 2 вдоха;

= на 30 компрессий – 2 вдоха;

~ на 4 компрессии – 2 вдох;

~ на 5 компрессий – 1 вдох.

}

Показания для применения приема Геймлиха{

~ аспирация;

= инородное тело в верхних дыхательных путях;

~ инородное тело в пищеводе

~нарушение дыхания

}

Осложнения при проведении СЛР{

~ %50% перелом грудины;

~ %-50%перелом позвоночника;

~ %-50%перелом носа

~ %-50%ребер

}