

При каких отравлениях нельзя промывать желудок беззондовым способом? {
~ грибами
= бензином
~ алкоголем
~ лекарством
}

Какое количество воды необходимо приготовить для промывания желудка (л)? {
~ 3 - 5
~ 7 - 8
= 10 - 12
~ 12 - 15
}

Промывание желудка следует проводить до {
= чистых промывных вод
~ улучшения состояния пациента
~ исчезновения симптомов интоксикации
~ использования всей приготовленной воды
}

Какое количество воды, при промывании желудка, можно ввести одновременно? (л) {
= 1
~ 2
~ 3
~ 4
}

Количество промывных вод, отправляемых в лабораторию на исследование (мл)? {
~ 50
~ 100
~ 150
= 200
}

При промывании желудка зонд вводится на расстояние: {
~ 100 см
~ 60 см
= рост пациента минус 100 см
}

Для промывания желудка необходимо приготовить: {
= 10 -12 литров воды
~ 1 – 1,5 литра воды
~ 5 литров воды
}

При рвоте для профилактики асфиксии голову необходимо запрокинуть: {
~ назад
~ на бок
= вперёд, поддерживая за лоб
}

Дуоденальное зондирование проводят: {
~ толстым желудочным зондом
= тонким желудочным зондом с оливой
~ тонким желудочным зондом
}

При дуоденальном зондировании получают: {
= желчь
~ желудочный сок
~ содержимое желудка
}

Фракционное зондирование позволяет исследовать: {
= секреторную функцию желудка
~ желчь 12-ти перстной кишки
~ переваривающую способность кишечника
}

Для фракционного зондирования необходимо приготовить: {

~ толстый желудочный зонд с воронкой
= 9 баночек
~ зонд с металлической оливой
}

Для стимуляции при дуоденальном зондировании используют: {
~ 0,1% раствор атропина
~ 33% раствор сернокислой магнезии
= 0,1% раствор гистамина
}

При дуоденальном зондировании порцию «С» получают: {
~ из желчного пузыря
= из желчных протоков
~ из 12-ти перстной кишки
~ из желудка
}

При исследовании желудочного сока беззондовым методом используют: {
= ацидотест
~ раствор магния сульфата
~ раствор гистамина
~ раствор глюкозы
}

При появлении крови в промывных водах необходимо: {
~ продолжить промывание
= поставить пузырь со льдом на область эпигастрия
~ поставить грелку на область эпигастрия
}

При дуоденальном зондировании порцию «А» получают: {
~ из желчных протоков
= из 12-ти перстной кишки
~ из желчного пузыря
~ из желудка
}

Стимуляцию выработки желудочного сока проводят: {

- = после 5 порции
- ~ после 1 порции
- ~ перед 5 порцией
- ~ 2 порций

}

Полученный желудочный сок направляют: {

- ~ в биохимическую лабораторию
- = в клиническую лабораторию
- ~ в бактериологическую лабораторию

}

Резиновые зонды стерилизуют при режиме: {

- ~ 180 в течение 60 минут
- ~ при 2,2 атм., Т 132 в течение 20 минут
- = при 1,1 атм., Т 120 в течение 45 минут
- ~ 100 мин при температуре 80 С

}

Резиновые зонды стерилизуют: {

- = в сухожаровых шкафах
- ~ в автоклавах
- ~ в 3% растворе хлорамина
- ~ в растворе хлорамина

}

Лекарственные препараты, необходимые для остановки кровотечения: {

- = викасол
- ~ магния сульфат
- ~ глюкоза
- ~ дексаметазон

}

Кружку Эсмарха применяют для постановки {

- = очистительной клизмы
- ~ сифонной клизмы
- ~ лекарственной клизмы

~ масляной клизмы
}

Оснащение для очистительной клизмы включает {
= кружка эсмарха, вазелин, судно, вода 1-1,5 л
~ кружка эсмарха, вазелин, судно, вода 5-6 л
~ 2 толстых зонда, воронка, вазелин, вода 10-15 л
~ газоотводная трубка, грушевидный баллон с наконечником, вода 500 мл
}

При постановке гипертонической клизмы необходимо приготовить 50-100 мл раствора хлорида натрия {
= 10%
~ 0,9%
~ 2%
~ 20%
}

К послабляющим клизмам относятся {
= масляная
~ сифонная
~ очистительная
~ лекарственная
}

Кратность промывания кишечника при сифонной клизме предполагается {
= до чистых промывных вод
~ 1 раз
~ 3 раза
~ 5 раз
}

Для гипертонической клизмы применяют 10% раствор хлорида натрия в объеме {
= 100-200 мл
~ 10-50 мл
~ 200-400 мл
~ 800-1000 мл

}

Для очистительной клизмы необходимо приготовить {

= 1-1,5 л воды комнатной температуры

~ 100 мл 10% раствора хлорида натрия

~ 10-12 л воды комнатной температуры

~ 100-200 мл масляного раствора

}

При постановке сифонной клизмы зонд вводят в кишечник на глубину

___ см {

= 30-40

~ 5-10

~ 10-15

~ 40-60

}

После масляной клизмы опорожнение кишечника наступает через {

= 10-12 часов

~ 10-15 минут

~ 1 час

~ 6 часов

}

Газоотводную трубку не оставляют в кишечнике надолго, потому что {

= могут образоваться пролежни в стенке кишечника

~ это утомит больного

~ закончится лечебный эффект

~ заканчивается ее стерильность

}

При метеоризме газоотводная трубка вводится на глубину (в см) {

~ 50

= 20 -30

~ 10 -12

~ 2 – 4

}

Опорожнение кишечника после постановки гипертонической клизмы, как правило, наступает через (в часах){
~ 8-10
~4-6
~ 2-3
= 1
}

Необходимое количество растительного масла для постановки масляной клизмы (в мл){
~ 1000
~500
= 100
~ 10
}

Показания к постановке очистительной клизмы{
~ острый аппендицит
~ первые дни после операции на органах пищеварения
= запор
~ подготовка больного к извлечению желудочного содержимого
}

При постановке очистительной клизмы наконечник вводят на глубину (в см){
~ 40
~ 20
= 10-12
~ 2-4
}

Преобладание ночного диуреза над дневным называется{
~ полиурией
= никтурией
~ анурией
~ олигурией
}

К дизурическим расстройствам относится{

- ~ анурия
- ~ полиурия
- = поллакиурия
- ~ глюкозури
- }

Полиурия — это {

- = увеличение количества выделяемой мочи за сутки
- ~ уменьшение количества выделяемой мочи за сутки
- ~ полное прекращение выделения мочи почками
- ~ невозможность опорожнить мочевой пузырь
- ~ увеличение количества выделяемой мочи ночью

}

При проведении процедуры катетеризации мочевого пузыря могут возникнуть осложнения {

- ~%33.33% повреждение уретры
- ~ %33.33% гематурия
- ~ %33.33% инфицирование мочевого пузыря и уретры
- ~ %-100%снижение артериального давления

}

Мочевой катетер перед введением необходимо смазать {

- ~кипячёной водой
- = стерильным глицерином
- ~ 0,9% раствором натрия хлорида
- ~ фурацилином
- ~ стерильным вазелиновым маслом

}

Выберите одно из средств для обработки мочеиспускательного канала перед катетеризацией мочевого пузыря{

- ~ 70% спирт
- = фурацилин
- ~ глицерин
- ~ стерильное вазелиновое масло
- ~ 0,9% раствором натрия хлорида

}

При проведении катетеризации мочевого пузыря пациент должен принять положение {

~ лёжа на правом боку

~ лёжа на левом боку

~ сидя на стуле с раздвинутыми ногами

= лёжа на спине, с разведенными в коленях ногами

~ лёжа на спине с приподнятым ножным концом

}

Перед проведением катетеризации мочевого пузыря у женщины медицинская сестра должна выполнить {

~ гигиеническую обработку промежности

= гигиеническую обработку промежности и отверстия мочеиспускательного канала

~ гигиеническую обработку отверстия мочеиспускательного канала

~ спринцевание влагалища антисептическим раствором

~ орошение половых органов антисептическим раствором

}

Выберите состояние, которое не является противопоказанием для проведения катетеризации мочевого пузыря {

~ острый простатит

~ острый уретрит

~ кровь в мочеиспускательном канале

= острая задержка мочи

~ кровоподтёки промежности

}

Медицинская сестра при проведении катетеризации мочевого пузыря имеет право использовать катетер {

~ медицинская сестра не имеет право проводить эту процедуру

= медицинская сестра имеет право проводить эту процедуру мягким катетером

~ медицинская сестра имеет право проводить эту процедуру эластичным катетером

~ медицинская сестра имеет право проводить эту процедуру жёстким катетером

~ медицинская сестра имеет право проводить эту процедуру любым катетером

}

Катетер Фолея имеет длину {

~ 20 см

~ 25 см

~ 35 см

= 40 см

~ 55 см

}

Металлический уретральный катетер устанавливает {

~врач или медицинская сестра

~медицинская сестра

=врач

}

Катетеризацию мочевого пузыря следует проводить {

=В стерильных перчатках

~В нестерильных перчатках

~В нестерильных перчатках предварительно обработанных антисептиком

}

Баллон катетера Фолея следует наполнять {

~%100% Воздухом

~%50% Стерильной водой

~%50% Стерильным физиологическим раствором

}

}

Противопоказаниями для промывания желудка являются {

~%-100%отравления грибами

~%30%~желудочного кровотечения

~%20%~ ожога пищевода

~ %25% острого живота

~ %25% инфаркта миокарда

}

Определите расстояние, на которое пациент должен проглотить зонд при промывании желудка {

=от губ до мочки уха и вниз до мечевидного отростка;

~ от губ до мечевидного отростка;

~ от губ вниз по передней брюшной стенке до пупка;

~ от губ и вниз по передней брюшной стенке на 6 см ниже пупка;

~ от губ до мочки уха и вниз по передней брюшной стенке на 6 см ниже пупка

}