

Укажите документ, который оформляет старшая медицинская сестра на получение лекарственных форм из аптеки: {

- ~ квитанцию
- ~ рецептурный бланк
- = требование-накладную
- ~ экстренное извещение
- }

В журнале учета наркотических средств необходимо указывать: {

- ~ путь введения препарата
- ~ цель введения препарата
- ~ диагноз пациента
- = Ф. И. О. пациента, № истории, количество средства
- }

Стерильные растворы во флаконах, изготовленные в аптеке, должны иметь этикетку с полосой соответствующего цвета {

- ~ белого
- ~ желтого
- = голубого
- ~ розового
- }

Ответственность за лекарственное обеспечение пациентов в отделении несет: {

- ~ процедурная медсестра
- ~ заведующий отделением
- ~ лечащий врач
- = старшая медсестра
- }

Наркотические препараты необходимо хранить: {

- ~ в шкафу на отдельной полке
- = в сейфе
- ~ в холодильнике
- ~ в ящике стола

}

Наркотические средства вводятся пациенту в присутствии: {

~ главной медицинской сестры

~ родственников

= врача

~ старшей медицинской сестры

~ пациентов

}

Выберите требования к журналу учета наркотических средств: {

~ листы пронумерованы

~ листы прошнурованы

~ свободные концы шнура заклеены на последнем листе

~ на последнем листе указано количество страниц

~ имеется подпись руководителя и печать

= все ответы правильные

}

Пустые ампулы от наркотических средств уничтожаются в присутствии: {

~ процедурной медицинской сестры

~ главной медицинской сестры

~ заведующего отделением

= специальной комиссии, утвержденной руководителем ЛПУ

}

Препараты, назначенные "натошак", принимаются пациентом {

= за 30 мин. до еды

~ за 15-20 мин. до еды

~ за 10 мин. до еды

~ непосредственно перед едой

}

К ингаляционному способу относится введение лекарственных средств {

= в дыхательные пути

~ под язык

~ в ткани

~ на слизистые оболочки

}

К наружному способу относится введение лекарственных средств {
= закапывание в глаза
~ подкожно
~ в переднюю брюшную стенку
~ через прямую кишку
}

Сублингвальный путь введения лекарственных веществ - это введение {
~ в прямую кишку
~ в дыхательные пути
= под язык
~ на кожу
}

Прием снотворных лекарственных средств осуществляется пациентом до сна
за (в мин): {
~ 15
= 30
~ 45
~ 60
}

Прием лекарственных средств осуществляется пациентом: {
~ самостоятельно
~ в присутствии родственников
= в присутствии медицинской сестры
~ в присутствии пациентов
}

Чаще всего ректально вводят лекарственные формы {
~ мази
~ присыпки
= суппозитории
~ таблетки
}

Вместимость десертной ложки (в мл) {
~ 30

~ 15
= 10
~ 5
}

Энтеральный путь введения лекарственных средств {
= через ЖКТ
~ через дыхательные пути
~ внутривенно
~ на кожу
}

Пилулы, капсулы применяются внутрь {
~ в разжеванном виде
~ содержимое высыпается под язык
= в неизменном виде
~ содержимое высыпать, растворить в воде, выпить
}

Преимуществом парентерального пути введения является: {
= быстрота действия
~ не требует специальной подготовки персонала
~ не требует соблюдения стерильности
~ простота и доступность
}

Выберите парентеральный способ введения лекарственных препаратов: {
~ пероральный
~ наружный
= инъекционный
~ ректальный
}

Знание "цены" деления на шприце медицинской сестре необходимо для: {
= набора в шприц необходимого количества лекарственного вещества
~ медленного введения лекарственного вещества
~ быстрого введения лекарственного вещества
~ определения цифр на цилиндре

}

Выберите шприц, на котором указаны "единицы действия": {

~ Жане

= инсулиновый

~ шприц-тюбик

}

Ампулу с масляным раствором предварительно подогревают на водяной бане до температуры: {

~ 18°C

~ 22°C

= 38°C

~ 50°C

}

Выберите количество лекарственного средства, которое вводится внутривенно с диагностической целью: {

= 0,01 - 1мл

~ 1 - 1,5 мл

~ 1 - 2 мл

~ 2 - 5мл

}

Анатомической областью для внутривенной пробы является: {

~ средняя треть передней поверхности плеча

= средняя треть передней поверхности предплечья

~ средняя треть наружной поверхности плеча

~ средняя треть наружной поверхности бедра

}

Игла, при выполнении внутривенной пробы, вводится на глубину: {

~ одну треть иглы

= 2 см

~ среза иглы

~ две трети иглы

}

В 1 мл простого инсулина содержится (ЕД): {
~ 10
~ 20
= 40
~ 80
}

Наиболее частым осложнением при выполнении подкожной инъекции является: {
~ абсцесс
~ воздушная эмболия
~ тромбофлебит
= инфильтрат
}

Анатомическими областями, для выполнения подкожной инъекции являются: {
~ средняя треть наружной поверхности плеча
~ передняя поверхность предплечья
~ подлопаточная область
= передняя брюшная стенка
~ верхне- наружный квадрант ягодицы
}

Укажите, какой раствор не применяется для разведения антибиотиков: {
~ 0,9% р-р натрия хлорида
~ 0,5% р-р новокаина
= 5% р-р глюкозы
~ стерильная вода для инъекций
}

Выберите стандартное разведение антибиотиков: {
= на 100000 ЕД - 1мл. растворителя
~ на 500000 ЕД - 3 мл. растворителя
~ на 250000 ЕД - 5 мл. растворителя
~ на 1000000 ЕД - 2,5 мл. растворителя
}

Длина иглы для выполнения внутримышечной инъекции должна быть не менее: {

~ 15 мм

~ 40 мм

= 60 мм

~ 20 мм

}

Кажите, в какую мышцу не выполняется внутримышечная инъекция: {

~ дельтовидную мышцу плеча

~ среднюю и малую ягодичные мышцы

~ широкую латеральную мышцу бедра

= прямую мышцу живота

}

При выполнении внутримышечной инъекции, иглу вводят под углом: {

~ 15°

~ 45°

~ 60°

= 90°

}

Выберите максимальное количество лекарственного вещества, вводимого внутримышечно (в мл): {

~ 1-2

~ 2-5

= 5-10

~ 20-40

}

Выберите возможное место для венепункции при внутривенной инъекции {

~ средняя треть плеча;

~ верхний наружный квадрант ягодицы;

= вены локтевого сгиба;

~ латеральная поверхность бедра;

~ передняя брюшная стенка

}

Какие лекарственные средства нельзя вводить внутривенно {

- ~ антибактериальные препараты;
- = масляные растворы;
- ~ изотонический раствор натрия хлорида;
- ~ глюкокортикоиды;
- ~ инсулин

}

Выберите правильное положение рук медицинской сестры на шприце при выполнении внутривенной инъекции {

- = указательным пальцем фиксировать канюлю иглы, расположенную срезом вверх, а остальные пальцы обхватывают цилиндр шприца;
- ~ указательным пальцем фиксировать канюлю иглы, расположенную срезом вниз, а остальные пальцы обхватывают цилиндр;
- ~ все пальцы обхватывают цилиндр шприца, игла расположена срезом вверх;
- ~ все пальцы обхватывают цилиндр шприца, игла расположена срезом вниз;
- ~ как держать шприц медицинская сестра определяет в зависимости от места инъекции

}

Выберите порядок действий при наборе лекарственного препарата из флакона, закрытого алюминиевой крышкой {

- = отогнуть нестерильным пинцетом часть алюминиевой крышки флакона, протереть резиновую пробку ватным шариком, смоченным антисептическим средством;
- ~ отогнуть стерильным пинцетом часть алюминиевой крышки флакона, протереть резиновую пробку ватным шариком, смоченным антисептическим средством;
- ~ протереть алюминиевую крышку ватным шариком, смоченным антисептическим средством, отогнуть нестерильным пинцетом часть крышки флакона;
- ~ протереть алюминиевую крышку ватным шариком, смоченным антисептическим средством, отогнуть стерильным пинцетом часть крышки флакона;
- ~ отогнуть стерильным пинцетом часть алюминиевой крышки флакона,

необязательно протирать резиновую пробку ватным шариком, смоченным антисептическим средством

}

К парентеральному пути введения относится способ введения лекарственных средств{

~ через дыхательные пути;

~ через прямую кишку;

= внутривенно;

~ сублингвально;

~ на кожу и слизистые

}

При пунктировании вены при заборе крови из периферической вены на анализ срез иглы располагается{

~ вниз;

~ влево;

~ вправо;

= вверх;

~ не имеет значения

}

Игла относительно кожи при выполнении внутримышечной инъекции располагается{

~ под углом 15° ;

~ под углом 30° ;

~ под углом 45° ;

~ под углом 75° ;

= под углом 90°

}

Для внутрикожной инъекции используется шприц объёмом{

~ 20 мл;

~ 10 мл;

~ 5 мл;

~ 2 мл;
= 1 мл.

}

Укажите место для введения инсулина, где происходит быстрое всасывание лекарственного препарата {

= подкожно — жировой слой боковых сторон живота не более 2,5 см от пупка, наружная боковая поверхность средней трети плеча

~ всасывание происходит везде одинаково;

~ надлопаточная область;

~ верхненаружный квадрант ягодицы

}

Какой длины иглы, применяются при заборе крови из периферических вен на анализ {

~ 60 мм;

= 40 мм;

~ 20 мм;

~ 15 мм;

` 10 мм

}

При попадании воздуха в сосуд развивается осложнение {

= воздушная эмболия

~ тромбофлебит;

~ некроз;

~ инфильтрат;

~ жировая эмболия

}

Какой объем лекарственного препарата можно ввести при внутривенной инъекции {

~ 10 мл;

~ 5 мл;

~ 3 мл;

~ 2 мл;
= 0,1 — 1 мл.

}

При подкожной инъекции можно ввести объём лекарственного препарата {

~ 0,1 — 0,2 мл;
= 0,1 — 5 мл;
~ 0,1 — 7 мл;
~ 0,1 — 2 мл;
~ до 10 мл.

}

Игла относительно кожи при выполнении подкожной инъекции располагается {

~ под углом 15° ;
~ параллельно коже;
~ под углом 30° ;
= под углом 45° ;
~ под углом 75° .

}

Длина иглы, применяемой для подкожных инъекций {

~ 60 мм;
~ 40 мм;
= 25 мм;
~ 15 мм;
~ 10 мм.

}

Выберите правильный порядок действий при вскрытии ампулы {

~ надпилить ампулу, сухим стерильным ватным шариком протереть место надпила и обломить конец ампулы;

~ обработать ампулу ватным шариком, смоченным спиртом, надпилить и обломить конец ампулы;

~ надпилить ампулу и обломить конец ампулы, не обрабатывая;

= надпилить ампулу, обработать ватным шариком, смоченным спиртом, и обломить конец ампулы;

~ порядок действий не имеет особого значения.

}