

Щитовидная железа расположена : {

=в передней области шеи впереди трахеи;

~в передней области шеи позади трахеи;

~в задней области шеи;

~в подбородочной области

}

Щитовидная железа имеет: {

~одну долю;

~две доли;

=две доли и перешеек

~три доли

}

Щитовидная железа имеет форму: {

~округлая;

~овальная;

~подковообразная;

~треугольная;

=в форме бабочки

}

Основные способы визуализации щитовидной железы: {

~% - 50% рентгенография;

~% - 50%рентгеноскопия;

~%50%УЗИ;

~%50%радионуклидное сканирование и сцинтиграфия

}

Нормальная щитовидная железа при УЗИ определяется как: {

~как образование с неоднородной крупнозернистой структурой;

~как образование с неоднородной мелкозернистой структурой;

=как образование с однородной мелкозернистой структурой

~как образование однородной крупнозернистой структурой;

}

Подготовка к радионуклидному исследованию щитовидной железы

заключается в: {

~% - 50% в приеме веществ, содержащих йод и бром за 30 и 3 дня до исследования

~%50%в исключении из приема веществ и лекарств, содержащих йод и бром за 30 и 3 дня до исследования;

~%50%исследования проводятся натощак

~% - 50% исследование проводится после приёма пищи

}

Изображение щитовидной железы получают{

~путем внутривенного введения ^{99m}Te пертехнетата;

=путем перорального приема ^{99m}Te пертехнетата;

~путем внутривенного введения ^{99m}Te пирофосфата;

~путем перорального приема ^{99m}Te пирофосфата

}

Функции щитовидной железы все, кроме: {

- ~захват йодитов из крови;
- ~синтез йодосодержащих тиреоидных гормонов;
- ~выделение гормонов в кровь;
- =участие в углеводном обмене

}

Наиболее достоверным в диагностике нарушений функции щитовидной железы является: {

- ~клиническая картина
- ~исследование гормонального профиля
- ~ультразвуковое исследование щитовидной железы
- ~ исследование основного обмена
- =сцинтиграфия щитовидной железы

}

Эндемический зоб – это: {

- ~увеличение щитовидной железы, обусловленное дефицитом йода
- ~ увеличение щитовидной железы на фоне достаточного потребления йода
- ~увеличение щитовидной железы на фоне аутоиммунного тиреоидита
- ~обусловлен врожденными или приобретенными дефектами синтеза

гормонов щитовидной железы

- =развивается у части населения, проживающего в определенном регионе

}

Доброкачественные образования щитовидной железы по характеру все, кроме: {

Формы гипотиреоза все, кроме: {

- ~первичный
- ~вторичный
- ~третичный
- ~йододефицитный
- =диффузный

}

Токсическая аденома щитовидной железы на сцинтиграфии проявляется как:

{

- =горячий очаг
- ~холодный очаг
- ~дефект наполнения
- ~всё правильно

}