

Источниками ВБИ могут быть: {

~ медицинский персонал;

~ бактерионосители;

~ пациенты со стертой или хронической формой инфекции;

= все верно

}

К причинам, приводящим к восприимчивости «хозяина» к инфекциям, относится все, кроме: {

~ неблагоприятной окружающей среды;

~ возраста;

= полноценного питания;

~ наличия длительных хронических заболеваний

}

Наиболее высокий риск возникновения ВБИ у пациентов: {

= урологических отделений;

~ физиотерапевтических отделений;

~ терапевтических отделений;

~ на поликлинических приемах

}

К инвазивным процедурам относятся..., исключите лишнее: {

~ катетеризации мочевого пузыря;

~ внутримышечной инъекции;

= измерения артериального давления;

~ оперативного вмешательства

}

Первое звено эпидемического процесса: {

~ восприимчивый организм;

~ механизм передачи;

= источник инфекции;

~ пути передачи

}

Наиболее распространенные ВБИ..., исключите лишнее: {

~ инфекции мочевыделительной системы;

= воспалительные заболевания суставов;
~ гнойно-септические инфекции;
~ инфекции дыхательного тракта
}

Искусственный путь передачи ВБИ: {
~ воздушно-капельный;
~ контактно-бытовой;
= артифициальный;
~ воздушно-пылевой
}

Естественный механизм передачи ВБИ: {
~ через руки медперсонала;
~ через перевязочный материал;
~ парентеральный;
= фекально-оральный
}

Входными воротами инфекции являются, исключите лишнее: {
~ дыхательные пути;
~ мочевыделительная система;
= здоровая кожа;
~ поврежденная слизистая оболочка
}

Медицинский персонал не рассматривает, как потенциально опасный источник заражения, больного: {
~ вирусным гепатитом;
~ туберкулезом;
= ревматизмом;
~ ВИЧ-инфицированного
}

Определение понятия «асептика»: {
~ борьба с экзогенной инфекцией;
~ создание абактериальной среды в операционной;
~ борьба с инфекцией в ране;

= предотвращение попадания микробов в рану;
~ использование антисептиков
}

Источник эндогенной инфекции: {
~ имплантаты;
~ шовный материал;
= хронические воспалительные заболевания внутренних органов;
~ руки хирурга;
~ хирургические инструменты
}

Метод профилактики воздушно-капельного инфицирования: {
~ бактериальный посев на дизентерийную группу;
~ бактериальный посев на энтеробиоз;
= бактериальный посев из носоглотки;
~ исследование посева смыва с рук персонала
}

Метод профилактики воздушно-капельного инфицирования: {
~ обработка рук хирурга;
~ стерилизация инструментов;
~ стерилизация белья;
= уборка операционной;
~ обработка операционного поля
}

«Стерилизация» – это {
~ уничтожение патогенных бактерий
~ уничтожение микробов на поверхности
~ уничтожение инфекции
= полное уничтожение всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы
}

«Дезинфекция» – это {
~ уничтожение патогенных микроорганизмов

=комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.

~уничтожение грибов

~уничтожение вирусов

}

Антисептика — это комплекс мероприятий{

~ по борьбе с инфекцией в ране

= по профилактике попадания инфекции в рану

~ по дезинфекции инструментов

~ по стерилизации инструментов

}

В течение 1 минуты обрабатывают руки перед операцией в растворе{

~ гипохлорита

= перманганата (С-4)

~ нашатырного спирта

~ йодоната

}

Применение перекиси водорода относится к методу антисептики{

~ физическому

= химическому

~ механическому

~ биологическому

}

Проба на качество предстерилизационной обработки инструментов{

~ формалиновая

= азопирамовая

~ бензойная

~ никотинамидовая

}

Срок хранения закрытого стерильного бикса без фильтра не более{

= 3 суток

~ 1 суток

~ 20 суток

~ 6 часов
}

Стерильность открытого бикса сохраняется {
= 6 часов
~ 12 часов
~ 10 часов
~ 24 часа
}

Генеральная уборка в операционном блоке проводится 1 раз в {
~ месяц
= неделю
~ 10 дней
~ 2 недели
}

При предстерилизационной обработке инструменты погружают в моющий раствор на {
~ 5 мин.
= 15 мин.
~ 45 мин.
~ 60 мин.
}

Для подготовки рук операционной бригады применяют {
= 2,4% раствор первомура
~ 1% раствор хлорамина
~ 3% спиртовой раствор перекиси водорода
~ 3% раствор хлорамина
}

Текущая уборка в операционной проводится {
~ 1 раз в день
= в течение всего рабочего дня
~ перед операцией
~ в конце рабочего дня
}

Все участники операции должны быть {
= в стерильной одежде
~ не имеет значения
~ в чистой одежде
~ в стерильной одежде и маске
}

Количество хлорной извести для приготовления 10% раствора {
~ 100 г хлорной извести на 9,9 л воды
= 1 кг хлорной извести на 9 л воды
~ 1 кг хлорной извести на 5 л воды
~ 100 г хлорной извести на 10 л воды
}

Основной режим сухожаровой стерилизации инструментария {
~ 120° С — 40 мин.
~ 180° С — 3 часа
~ 200° С — 40 мин.
= 180° С — 1 час
}

К физическому методу стерилизации относят {
= автоклавирование
~ погружение в 70% раствор этилового спирта
~ погружение в 6% раствор перекиси водорода
~ воздействие парами формалина
}

Применение перекиси водорода относится к методу антисептики {
~ физическому
= химическому
~ механическому
~ биологическому
}

Асептика — это комплекс мероприятий {
~ по борьбе с инфекцией в ране
= по профилактике попадания инфекции в рану
~ по дезинфекции инструментов

~ по стерилизации инструментов
}

Операционное белье стерилизуют в режиме {
~ 180°C — 60 мин.
~ 120°C. — 1,1 атм. — 45 мин.
~ 160°C — 180 мин.
= 132°C — 2,0 атм. — 20 мин
}

Время химической стерилизации инструментов в 6% растворе перекиси водорода при комнатной температуре {
~ 1 час
~ 3 часа
= 6 часов
~ 40 мин.
}

Антисептик, применяемый для обработки операционного поля {
= хлоргексидина биглюконат
~ перекись водорода
~ фурацилин
~ нашатырный спирт
}

Биологическая антисептика предусматривает применение {
= антибиотиков
~ первичной хирургической обработки ран
~ дренирования ран
~ раствора перекиси водорода
}

Для контроля качества предоперационной обработки рук используют {
~ термоиндикаторы
= бактериологический контроль
~ фенолфталеиновую пробу
~ амидопириновую пробу}

К физическому методу стерилизации относят {

=воздушный, паровой, гласперленовый
~воздушный, паровой, газовый
~воздушный, газовый, плазменный
~газовый, плазменный, инфракрасный
}

Какое окрашивание характерно для азопирамовой пробы при {
наличии следов крови:

~розовое
=фиолетовое, переходящее в сиреневое
~зеленое
~темно синее
}

К методам дезинфекции относятся все кроме {
=радиоацинного

~физического
~химического
~механического
}

При гигиенической обработке рук втирание антисептиков в кожу рук
проводится в течении {

~15 секунд
=30 секунд
~2 минуты
~5 минуты
}

Распространению внутрибольничной инфекции способствует все, кроме {

~формирование госпитальных штаммов
~снижение иммунитета у населения
~слабая материально техническая база ЛП
=хорошее снабжение лекарствами
}

Предстерилизационная очистка необходима для: {

~%33.33% удаления жиров, белков

~%33.33% улучшения эффективности стерилизации
~%33.33% уменьшения пирогенных реакций
~%-100% полного уничтожения микроорганизмов
}

Этапы предстерилизационной очистки{
~%33.33% мытье под проточной водой
~%33.33% погружение в моющем комплексе
~%33.33% ополаскивание в дистиллированной воде
~%-100% закладывание материала в автоклав
}

Показания к использованию перчаток{
~%-100% отсутствие контакта с поврежденной кожей;
~%33.33% перед асептической процедурой, которая требует условий
стерильности;
~%33.33% если предстоит контакт с кровью или другими биологическими
жидкостями;
~%33.33% при контакте с пациентом
}

Стерильные перчатки необходимо использовать при{
~%33.33% катетеризации мочевого пузыря;
~%33.33% хирургических процедурах;
~%-100% опросе пациента;
~%33.33% инвазивных рентгенологических процедурах.
}

Гигиену рук следует выполнять: {
~%33.33% до и после контакта с пациентом;
~%-100% до входа и перед выходом из палаты;
~%33.33% после того, как прикоснулись к инвазивному устройству для
ухода за пациентом, независимо от того, используете вы перчатки или нет;
~%33.33% после снятия стерильных или нестерильных перчаток.
}

Укажите верные рекомендации по гигиене рук {
~%-50% ногти могут быть произвольной длины;

- ~%33.33% ваши ногти должны быть короткими (кончик меньше 0.5 см);
 - ~%33.33% мыло и спиртовой антисептик для гигиены рук не должны быть использованы одновременно;
 - ~%33.33% не носите искусственные или нарощенные ногти при прямом контакте с пациентами;
 - ~%-50% мыло и спиртовой антисептик применяются одновременно для усиления эффекта.
- }

Спецодежду, обильно загрязненную кровью, необходимо: {

= снять и замочить в 3% растворе хлорамина на 1 час

~ отправить в прачечную

~ обработать место загрязнения тампоном, смоченным в дез. растворе

~ снять и место загрязнения застирать с мылом

}

Недостаточно обработанные руки медперсонала являются: {

~ источником инфекции

= фактором передачи инфекции

~ источником и фактором передачи инфекции

~источником асептики

}

Для контроля температуры в паровом стерилизаторе применяют {

~ сахарозу, ИС-160

= бензойную кислоту, ИС-120

~ янтарную кислоту, ИС-180

~ винную кислоту, ИС-160

}

При положительной фенолфталеиновой пробе появляется окрашивание: {

~ сине-зеленое

~ фиолетовое

= розовое

~ коричневое

}

Фенолфталеиновая проба проводится для определения остатков {

~ масляного раствора

~ крови

= моющего средства

~ лекарственного средства

}

К видам дезинфекции относится все, кроме {

~ очагового, текущего

~ профилактического

= предварительного

~ очагового, заключительного

}

Информация, которую пациент имеет право получить в доступной для него форме {

~ результаты обследования;

~ наличие заболевания, диагноз;

~ методы лечения и связанный с ними риск;

~прогноз заболевания;
= все перечисленное
}

Действия или средства для удовлетворения просьбы больного об ускорении его смерти – это {
~деонтология;
~ ятрогения;
=эвтаназия;
~ биоэтика;
~ танатология
}

В каком случае медицинскому персоналу разрешается осуществлять эвтаназию {
~ по просьбе больного;
~ по просьбе родственников;
~ в исключительных случаях;
= запрещается законом;
~ по приказу администрации ЛПУ
}

Медицинское страхование гарантирует гражданам получение {
~ социальных пособий;
= медицинской помощи;
~ прибавок к зарплате;
~ санаторно-курортного лечения;
~ оплата временной утраты трудоспособности
}

Совершенствование медицинской помощи населению РФ на современном этапе связано с развитием {
~ стационарной помощи;
~ медицинской науки;
~ сельского здравоохранения;
= первичной медико-санитарной помощи;
~ санаторно-курортного лечения
}

Какая форма медицинского страхования принята в РФ {

~ по законченному случаю;

= обязательное;

~ по случаю обращения;

~ пенсионное;

~ персональное

}

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования {

~ обязательного;

= добровольного;

~ по случаю обращения;

~ по законченному случаю;

~ любого из перечисленных

}

Определение соответствия качества оказываемой ЛПУ медицинской помощи установленным стандартам проводится при {

~ аттестации учреждения;

~ сертификации специалистов;

~ аттестации медицинских работников;

= аккредитации учреждений;

~ лицензировании учреждений

}

Сестринское дело является составной частью {

~ врачебной практики;

~ частной медицины;

~ муниципальной медицины;

= системы здравоохранения;

~ общественных организаций

}

Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между {

~ медицинской сестрой и пациентом;

~ обществом и окружающей средой;

= медицинской сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой;

~ медицинской сестрой, обществом и окружающей средой;
~ медицинской сестрой, обществом
}