

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

В патологии человека особо большое значение имеют риккетсиозы? {

- ~%50%эпидемический сыпной тиф
- ~%-33,33333%марсельская лихорадка
- ~%-33,33333%эндемический сыпной тиф
- ~%-33,33333%везикулярный риккетсиоз
- ~%50%спорадический сыпной тиф

}

Указать свойства вибриона Р.Коха? {

- ~%50%обитает в пресной воде
- ~%-33,33333%малоустойчив во внешней среде
- ~%-33,33333%вызывает легкое течение болезни
- ~%50%устойчив во внешней среде
- ~%-33,33333%обитает в морской воде

}

Туберкулез легких может вызывать попадание в организм туберкулезных микобактерий? {

- ~типа холоднокровных
- ~птичьего типа
- =человечьего типа
- ~рыбьего типа

}

Туберкулезный менингит наиболее часто встречается? {

- ~при зажившем первичном туберкулезном комплексе
- =при гематогенном туберкулезе
- ~при туберкулезе мочеполовой системы
- ~все верно
- ~при вторичном туберкулезе

}

Указать наиболее характерные проявления взаимоотношений вируса гриппа с клеткой-мишенью? {

- ~%-33,33333%пролиферация клеток-мишеней
- ~%50%образование телец-включений
- ~%50%цитолитическое действие вируса
- ~%-33,33333%интеграция вируса с геномом клетки без выраженной ее деструкции
- ~%-33,33333%гигантоклеточная трансформация

}

В понятие ОРВИ входит? {

- ~коклюш
- =грипп
- ~корь
- ~скарлатина
- ~аденовирусная инфекция

}

Корь характеризуется? {

- ~фибринозным трахеитом
- =энантемой во рту в виде пятен Бильшовского - Филатова - Коплика
- ~экзантемой на сгибательных поверхностях конечностей
- ~плевритом
- ~перитонитом

}

Панбронхит при тяжелом течении кори бывает? {

- ~%-33,33333%фиброзным
- ~%50%некротическим
- ~%-33,33333%крупозным
- ~%50%гнойно-некротическим
- ~%-33,33333%гнилостным

}

Источником заболевания человека гриппом являются больные гриппом? {

- ~птицы
- ~лошади
- ~собаки
- ~свиньи
- =люди

}

Возбудитель оспы относится к? {

- ~простейшим
- ~бактериям
- =вирусам
- ~грибам
- ~риккетсиям

}

Возбудитель оспы имеет тропность к?{

~лимфоузлам
=эпителию кожи
~слизистой кишки
~слизистой носоглотки
~нервной системе
}

Наиболее тяжелая клинико-морфологическая форма оспы?{

~вариолонд
~папулопустулезная
=геморрагическая
~нет правильного ответа
}

Для оспы характерны следующие цитоплазматические включения?{

~гранулы коричневого цвета
~ацидофильная зернистость
=тельца Пашена
~липофусцина
~меланина
}

Воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей при неосложненной кори имеет характер?{

~гнойного
~некротического
~фибринозного
=катарального
~геморрагического
}

Наиболее часто поражаются при полиомиелите?{

~задние рога спинного мозга
=передние рога спинного мозга
~мозжечок
~кора затылочной доли головного мозга
~кора лобной доли головного мозга
}

Тельца Негри обнаруживаются у больных?{

~корью
~желтой лихорадкой
~токсоплазмозом
=бешенством
~вирусным гепатитом
}

Пятна Бильшовского-Филатова-Коплика обнаруживается?{

~на ладонях
~на разгибательной поверхности предплечья
~на языке
=на внутренней поверхности щек
~на голове
}

Воспаление бронхов при осложненной кори имеет характер?{

~гранулематозного
=гнойного
~катарального
~серозного
~фибринозного
}

Преимущественной локализацией возбудителя полиомиелита является?{

~эндотелий
~слизистая трахеи
=двигательные нейроны
~печень
~кишечник
}

Первую клиническую стадию развития полиомиелита обозначают?{

~как острую
~как паралитическую
~как активную
=как препаралитическую
}

Морфологические изменения спинного мозга в паралитической стадии полиомиелита характеризуются?{

- ~кистами
- =дистрофией нейронов
- ~олеогранулемами
- ~пролиферации глиоцитов
- ~серозным менингитом

}

Морфологические изменения спинного мозга в остаточной стадии полиомиелита характеризуются?{

- ~гранулемами
- =кистами
- ~жировой дистрофией
- ~всем перечисленным

}

Брюшной тиф – это?{

- =кишечная инфекция
- ~вирусная инфекция
- ~риккетсиоз
- ~респираторно-синцитиальная инфекция
- ~аденовирусная инфекция

}

Указать типичные только для брюшного тифа признаки?{

- ~%50%наличие брюшнотифозных гранул в органах
- ~%33,3333%гиперпластические процессы в лимфоузлах
- ~%50%характерная сыпь на коже живота
- ~%33,3333%дистрофия паренхиматозных органов
- ~%33,3333%кровоизлияния во внутренние органы

}

Указать причины развития перитонита при брюшном тифе?{

- ~пиелонефрит
- =прободение язв в тонкой кишке
- ~восковидный некроз прямой мышцы живота
- ~атеросклероз мезентериальных сосудов
- ~гиперплазия лимфоузлов

}

Сальмонеллы – это?{

- ~типичные зоонозы
- =антропозоонозы
- ~антропонозы
- нет правильного ответа

}

Шигеллы - это причина?{

- ~брюшного тифа
- ~сыпного тифа
- =дизентерии
- ~амебиаза
- ~натуральной оспы

}

При дизентерии (шигеллезе) поражаются?{

- ~двенадцатиперстная кишка
- ~аппендикс
- ~желудок
- ~подвздошная кишка
- =сигмовидная кишка

}

Указать кишечные осложнения дизентерии?{

- ~пневмония
- ~%50%перитонит
- ~%50%артрит
- ~%50%кровоотечение
- ~%50%абсцесс печени

}

Холера - карантинная инфекция, так как?{

- =чрезвычайно контагиозна
- ~является зоонозом
- ~поражает пищеварительный тракт
- ~возбудитель устойчив во внешней среде
- ~возбудитель обитает в почве

}

При холере селезенка в размерах?{
~увеличивается
~не изменяется
=уменьшается
~атрофируется
~сопровождается разрывом капсулы
}

К специфическим осложнениям холеры относятся?{
~пневмония
~гнойники в органах
=холерный тифоид
~рожа
~гепатит
}

Указать причины смерти при холере?{
~%33,3333%легочная недостаточность
~%33,3333%рак кишечника
~%50%интоксикация
~%50%обезвоживание
~%33,3333%кахекия
}

Профузная диарея сопровождается?{
~гиповолемическим шоком
~гипоксией вследствие сгущения крови
~потерей воды ~обменным ацидозом
=все перечисленное
}

Для брюшного тифа наиболее характерны?{
~фибринозный колит
~дифтерическое воспаление тонкой кишки
~язвенный колит
=мозговидное набухание пейеровых бляшек с образованием язв в тонкой кишке
~катаральный энтероколит
}

При брюшном тифе чаще поражаются?{
~сигмовидная кишка
~двенадцатиперстная кишка
~слепая кишка
=подвздошная кишка
~прямая кишка
}

Наиболее характерным общим изменением при брюшном тифе является?{
~миокардит
~гнойный артрит
=экзантема
~гломеруллопатия
~менингит
}

К осложнениям брюшного тифа относится?{
~пиелонефрит
~орхит
~менингит
~эндометрит
=кишечное кровотечение
}

Для взрослых характерной формой дизентерийного колита является?{
~гнойный
~катаральный
~десквамативный
=фибринозный
~геморрагический
}

Характерным поражением селезенки при брюшном тифе является?{
~хроническое венозное полнокровие
=гиперплазия красной пульпы
~инфаркт
~все перечисленное верно
~нет правильного ответа
}

Основные микроскопические изменения в кишечнике при брюшном тифе характеризуется?{
~кровоизлияниями в слизистую оболочку
=пролиферацией клеток типа макрофагов
~пролиферацией лимфоидных клеток
~всем перечисленным
}

В развернутую стадию брюшного тифа во внутренних органах могут наблюдаться очаговые скопления?{
~гигантских многоядерных клеток
=клеток типа макрофагов и эпителиоидных
~плазмочитов
~все верно
}

В желудочно-кишечном тракте возможны следующие формы брюшного тифа?{
~катаральная
~септическая
=колотиф
~все верно
~нет правильного ответа
}

Для постановки диагноза брюшного тифа на первой неделе заболевания используют?{
~посев каловых масс
~реакцию Видаля
=темокультуру (посев крови)
~все верно
~нет правильного ответа
}

Для брюшнотифозной гранулемы характерны следующие клетки?{
~лимфоциты
~эпителиоидные
=макрофаги
~все перечисленное
~ничего из перечисленного
}

Как осложнение холеры может расцениваться следующий процесс в почке?{
=тубулонефроз
~инфаркты
~камнеобразование
~гломерулонефрит
~нефроцирроз
}

Для холерного тифоида характерно?{
~понижение температуры тела
~гастроэнтерит
=дифтеритически-язвенный колит
~эритроцитоз
~гипопротеинемия
}

Обезвоживание организма при холере возникает вследствие?{
~нарушения белкового обмена
=диареи
~отека слизистой желудка
~жировой дистрофии
~сердечно - сосудистой недостаточности
}

Основным признаком алгидного периода холеры у умершего является?{
~"руки прачки"
~ригидность шейных мышц
~поза "гладиатора"
=все перечисленное
~нет правильного ответа
}

При легкой форме холеры обнаруживается обычно?{
~риккетсия Провачека
=вибрион Эль-Тор
~бацилла Эберта
~вирусы
~протей
}

Для амёбной дизентерии характерно поражение?{

- ~тонкой кишки
- ~прямой кишки
- =слепой кишки
- ~сигмы
- ~желудка

Наиболее опасным внекишечным осложнением амебиаза является? {

- ~изъязвление
- ~диарея
- =абсцессы печени
- ~пневмония
- ~гломерулонефрит

Основным морфологическим признаком амебиаза в стенке кишки является? {

- ~гиперемия
- ~отек
- =округлые изъязвления
- ~фибринозное воспаление
- ~катаральное воспаление

Для амебиаза характерно? {

- ~отек стенки кишки
- =некроз ее тканей с образованием язв
- ~фибринозное воспаление
- ~катаральное воспаление
- ~геморрагии

К осложнениям, наиболее характерным для амебиаза относится? {

- ~прободение язв
- ~перитонит
- ~стенозирующие рубцы после заживления язв
- =все перечисленное
- ~нет правильного ответа

Из перечисленных осложнений для хронической бактериальной дизентерии характерен? {

- =парапроктит
- ~абсцесс печени (эмболический)
- ~паратифлит
- ~кровотечения
- ~гастрит

Источником заражения дифтерией чаще является? {

- ~кошка
- ~больной дифтерией ребенок
- ~вши
- =бациллоноситель дифтерийной палочки
- ~собаки

Дифтерия характеризуется? {

- ~гнойным ларингитом
- =фибринозным тонзиллитом
- ~гломерулонефритом
- ~гастритом
- ~циститом

Фибринозный тонзиллит при дифтерии носит характер воспаления? {

- ~крупозного
- =дифтеритического
- ~флегмонозного
- ~катарального
- ~геморрагического

Указать органы, на которые первично действует экзотоксин дифтерийной палочки? {

- =сердце и сосуды
- ~легкие
- ~кишечника
- ~почки
- ~мочевой пузырь

При дифтерии чаще поражаются нервы? {
~%-33,33333%седалищный
~%-33,33333%лицевой
~%50%языкоглоточный
~%-33,33333%тройничный
~%50%диафрагмальный
}

Заразиться скарлатиной можно? {
=воздушно-капельным путем
~фекально-оральным путем
~контактным путем
~переливанием крови
~половым путем
}

Указать признаки, характерные только для I периода скарлатины? {
~%50%малиновый язык
~%-33,33333%поражение сердца
~%50%"пылающий зев"
~%-33,33333%поражение почек
~%-33,33333%судороги
}

Тяжелая септическая форма скарлатины характеризуется? {
=отитом-анtritом
~острым энтеритом
~стоматитом
~язвой желудка
~гнойным остеомиелитом верхней челюсти
}

Указать формы менингококковой инфекции? {
~%50%менингококкемия
~%-33,33333%гнойный артрит
~%50%назофарингит
~%-33,33333%некротический нефроз
~%-33,33333%серозно-геморрагический артрит
}

Какие органы поражаются при синдроме Уотерхауса- Фридериксена (речь идет о менингококковой инфекции)? {
~легкие
~головной мозг
=надпочечники
~щитовидная железа
~яичника
}

Во входных воротах при дифтерии воспаление имеет характер? {
~продуктивного
=крупозного
~гнойного
~геморрагического
~гнилостного
}

Наиболее редко входными воротами при дифтерии являются? {
~гортань
~желудочно-кишечный тракт
~зев
=раневая поверхность
~миндалины
}

К дифтерийному токсину наиболее чувствительны? {
=надпочечники
~легкие
~печень
~почки
~кишечник
}

К формам вторичного туберкулеза относятся? {
~инфильтративный
~цирротический
~кавернозный
=все перечисленное
~острый очаговый
}

Туберкулома может образоваться из всех перечисленных ниже форм, кроме?{
~очаговой
~инфильтративной
=каверны
~лобулярной казеозной пневмонии
~из всех перечисленных
}

При туберкулезе отражает "специфику" процесса?{
~альтеративная некротическая фаза
~экссудативная воспалительная фаза
=пролиферативная (гранулематозная) фаза
~нет правильного ответа
}

Обострение туберкулеза характеризует?{
~образование гранулем
=экссудация
~пролиферация гистиоцитов
~склероз
~все перечисленное
}

Разновидностями гематогенного туберкулеза следует считать?{
~казеозную пневмонию
~острый кавернозный туберкулез
~цирротический туберкулез
=милиарный туберкулез
~инфильтративный туберкулез
}

При вторичном туберкулезе возможны следующие пути распространения инфекции?{
=интраканаликулярный
~лимфогенный
~гематогенный
~все верно
}

К вторичному туберкулезу не относится?{
~острый очаговый туберкулез
~острый кавернозный туберкулез
~инфильтративный туберкулез
=милиарный туберкулез
~цирротический туберкулез
}

Для первичного туберкулезного комплекса характерны?{
~диссеминация во внутренние органы
~только первичный аффект
=первичный аффект, лимфангит и лимфаденит
~кавернозный пиелонефрит
~туберкулезный сепсис
}

При гематогенно диссеминированном туберкулезе диссеминация?{
~в одном легком
=в обоих легких
~в верхней доле левого легкого
~в пищеварительной системе
~только в лимфоцитах
}

При острейшем туберкулезном сепсисе в легких отмечаются?{
=мелкие очаги некроза
~милиарные бугорки
~крупные бугорки
~крупные очаги казеозного некроза
~все перечисленное
}

Характерной органной локализацией вторичного туберкулеза является?{
~головной мозг
~поджелудочная железа
=легкие
~кости
~суставы
}

Для инфильтративного туберкулеза легких характерно? {
=выраженное перифокальное воспаление
~выраженный фиброз
~мелкие очаги с фиброзом
~все перечисленное
~ничего из перечисленного
}

Туберкулома легких характеризуется? {
~множественными мелкими очагами некроза со специфическими грануляциями в капсулах
=одиночным крупным очагом казеозного некроза
~полостью с фиброзной стенкой
~все перечисленное
}

Острый кавернозный туберкулез легких характеризуется? {
~полостью с фиброзной стенкой
~кистоподобной полостью
=полостью, содержащей казеозные массы, не отграниченные фиброзной тканью от окружающей легочной ткани
~все перечисленное
}

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких характеризуется полостью? {
=содержащей гнойно-некротические массы, специфические грануляции и фиброзную ткань
~содержащей гнойно-некротические массы
~выстланной многослойным плоским и цилиндрическим эпителием
~все перечисленное
~содержанием хитиновой оболочки
}

Цирротический туберкулез легких характеризуется? {
~выраженным фиброзом, бронхоэктазами, кистоподобными полостями
~эмфиземой легких
~активным специфическим воспалением
=все перечисленные
~ничего из перечисленного
}

Выражением обострения туберкулезного процесса является воспалительно-тканевая реакция? {
~продуктивная
=экссудативно-некротическая
~продуктивно-инфильтративная
~продуктивно-некротическая
~реакция гиперчувствительности замедленного типа
}

Указать исход туберкулезной гранулемы? {
~нагноение
~геморрагическая инфильтрация
~гнилостное разложение
=рубцевание
~атрофия
}

Какая форма вторичного туберкулеза преобладает в настоящее время? {
~туберкулома
~инфильтративный
=фиброзно-кавернозный
~цирротический
~диссеминированный
}

Для человека патогенны типы микобактерий туберкулеза? {
~птичий
~рыбий
~холоднокровных
=бычий
~китовый
}

При туберкулезе чаще всего и более всего поражаются? {
~кожа
~почки
=легкие
~слизистая оболочка рта
~печень
}

Разновидности гематогенного туберкулеза? {

- ~первичная легочная чахотка
- =острейший туберкулезный сепсис
- ~фиброзно-очаговый туберкулез
- ~инфильтративный туберкулез
- ~туберкулома

}

Туберкулома - это проявление туберкулеза?{

- ~первичного
- ~гематогенного
- =вторичного
- ~туберкулезного сепсиса
- ~первичного аффекта

}

Наиболее характерные для вторичного туберкулеза осложнения?{

- ~секвестры в костях
- =кровотечения
- ~менингит
- ~бронхоаденит
- ~гиалиноз сосудов

}

Риккетсия Провачека - да Роха-Лима - это возбудитель:{

- ~Ку-лихорадки
- =эпидемического сыпного тифа
- ~натуральной оспы
- ~гриппа
- ~бешенства

}

Сыпнотифозные гранулемы Попова встречаются?{

- ~в печени
- =в головном мозге
- ~в селезенке
- ~в костном мозге
- ~в лимфоузлах

}

Карантинными являются инфекционные заболевания {

- =холера
- ~иерсиниоз
- ~сибирская язва
- ~бешенство
- ~сепсис

}

Возбудитель малярии обнаруживается?{

- ~в эндотелии
- ~в лимфоцитах
- =в эритроцитах
- ~нейтрофилах
- ~гистиоцитах

}

Характерными для малярии изменениями являются?{

- ~десквамативный бронхит
- =анемия
- ~гастро-энтерит
- ~гепатит
- ~энцефалит

}

Возвратный тиф вызывается?{

- ~вирусами
- ~бактериями
- =спирохетами
- ~грибками
- ~стафилококком

}

Возбудителем сифилиса является?{

- ~шигелла
- ~коринбактерия
- =бледная трепонема (спирохета).
- ~вирусы
- ~протей

}

Основным компонентом первичного инфекционного комплекса при сифилисе является? {

- ~везикула
- =твердый шанкр.
- ~изъязвление
- ~сифилиды
- ~гумма
- }

Возбудитель актиномикоза в тканях может иметь вид? {

- ~дрожжеподобных форм и нитей
- =друз
- ~септированных гифов
- ~всего перечисленного
- }

Пути проникновения токсоплазм в организм человека являются все перечисленные, кроме? {

- ~аэрогенного
- ~трансмиссивного
- ~алиментарного
- ~контактного
- =полового
- }

К осложнениям со стороны центральной нервной системы при развитии врожденного токсоплазмоза относятся? {

- =гидроцефалия
- ~очаговый фиброз
- ~кровоизлияния
- ~все перечисленное
- }

Возбудителей микоплазмоза следует искать во всех перечисленных клетках, кроме? {

- ~пневмоцитов 2 типа
- ~макрофагов
- ~лейкоцитов
- =эритроцитов
- }

При микоплазмозе во внутренних органах выявляются? {

- ~гранулематозное воспаление
- ~катаральное воспаление
- =гемодинамические расстройства.
- ~нет правильного ответа
- }

При пневмоцистной пневмонии отделяемое с поверхности разреза: {

- ~гнойное
- ~геморрагическое
- =вязкое сероватое
- ~нет правильного ответа
- }

При пневмоцистной пневмонии содержимое альвеол? {

- ~геморрагическое
- ~гнойное
- ~некротическое
- =пенистые массы
- }

Источником заражения альвеолярным эхинококкозом являются? {

- ~собаки
- ~крупный рогатый скот
- =грызуны
- ~все перечисленное
- }

Инфильтрирующий рост пузырей характерен? {

- =для альвеококкоза
- ~для гидатидозного эхинококкоза
- ~для того и другого
- ~нет правильного ответа
- }

Возбудитель трихинеллеза паразитирует? {

- ~в толстой кишке
- ~в тонкой кишке
- =в желчном пузыре.
- ~во всех перечисленных органах
- }

Возбудитель трихинеллеза личиночной стадии обнаруживается? {
~в головном мозгу
~в печени
=в мышцах
~нет правильного ответа
}

Общие признаки инфекционных заболеваний: {
~отсутствие возбудителя
=дистрофия паренхиматозных органов
~очень высокая контагиозность
~отсутствие входных ворот
~отсутствие первичного комплекса
}

Пути распространения инфекционного агента из первичного очага или комплекса при разных инфекционных болезнях: {
=лимфогенный
~неврогенный
~параневральный
~миогенный
~кардиогенный
}

Своеобразие и отличие сепсиса от других инфекционных болезней заключается в? {
=полиэтиологичности
~цикличность течения
~высокой контагиозности
~наличии строго специфического возбудителя
}

Изменения в септическом очаге? {
~гранулематозное воспаление
~продуктивное воспаление
~фибринозное воспаление
=гнойное воспаление
}

Клиники - морфологические формы сепсиса: {
~%50%септицемия
~%50%септикопиемия
~%-50%пупочный сепсис
~%-50%грибковый сепсис
}

Образование абсцессов в различных органах и тканях характерно для? {
~септического эндокардита
~септического эндометрита
~криптогенного сепсиса
=септикопиемии
}

Механизм возникновения абсцессов в органах при септикопиемии? {
~тромбоэмболия
~жировая эмболия
~тканевая эмболия
=бактериальная эмболия
}

Компоненты септического очага? {
~интерстициальный миокардит
~гиперплазия селезенки
=гнойный лимфангит
~инфаркт
}

Механизм возникновения инфарктов в органах при септикопиемии? {
~тромбоэмболия
~жировая эмболия
=микробная эмболия
~длительный спазм сосуда
}

Характеристика септической селезенки? {
~уплотнение
~белый инфаркты
=обильный соскок пульпы
~нити фибрина на капсуле
}

При септикопиемии метастатические очаги первого порядка обнаружить в? {

~подкожной клетчатке
~костном мозге
~печени
=легких
}

При локализации септического очага в аппендиксе первые метастатические абсцессы можно выявить в? {

~легких
~почка
=печени
~костном мозге
}

Общие изменения при сепсисе? {

~%50%гиперплазия лимфоидной ткани
~%-50%продуктивный лимфаденит
~%-50%гнойный тромбофлебит
~%50%уремия
}

Изменения кожи при сепсисе? {

=желтуха
~пустулы
~витилиго
~лейкодерма
}

Изменения створок клапанов при инфекционном эндокардите? {

=изъязвление и некроз
~фибринозные наложения
~эпителиоидно - клеточные казеозные гранулемы
~многочисленные многоядерные гигантские клетки
}

Из крови больных септическим (инфекционным) эндокардитом удастся выделить возбудителя? {

~всегда
=не всегда
~нет правильного ответа
~все верно.
}

Осложнения полипозно - язвенного эндокардита? {

~острый пиелонефрит
~кровотечение
~инфаркты печени
=гангрена кишки
}

Склероз отверстий Мажанди и Лушка в исходе диффузного гнойного лептоменингита приводит к? {

~склерозу мягких мозговых оболочек
~хроническому эцефалиту
~отеку и набуханию мозга
=гидроцефалии
}

Вирус кори относится к семейству? {

~ретровирусов
~герпесвирусов
~пикорнавирусов
=парамиксовирусов
}

Спастическое сужение голосовой щели называется ложным: {

=крупом
~струпом
~сопором
~тумором
}

~Коревая сыпь на коже называется? {

=экзантема
~энантема
~эмпиема
~эмболия
}

Коревая сыпь отсутствует у детей с недостаточным иммунитетом? {

=клеточным

~гуморальным
~нет правильного ответа
~все верно
}

Вирус кори размножается в клетках:{
=макрофагах
~нейтрофилах
~эритроцитах
~тромбоцитах
}

Варианты течения кори?{
~повторная
=осложненная
~персистирующая
~рецидивирующая
}

Распространение вируса кори по организму вызывает?{
=ларинготрахеит
~холецистит
~панкреатит
~уретрит
}

Редкая локализация местных изменений при дифтерии?{
~трахея
~глотка
~бронхи
=конъюнктив
}

Редкая локализация местных изменений при дифтерии?{
~трахея
~глотка
~гортань
=полость носа
}

Частая локализация местных изменений при дифтерии?{
~рана кожи
=миндалины
~полость носа
~гениталии (у девочек)
}

Источник заражения дифтерией?{
~носитель - животное
~больное животное
=носитель - человек
~насекомые
}

Проявления дифтерии зависят от воздействия?{
~геммагглютинина
~нейроминидазы
~фосфолипазы С
=экзотоксина
}

Черепно - мозговой нерв, который часто поражается при дифтерии?{
~глазной
~добавочный
~тройничный
=языкоглоточный
}

Дифтерийный токсин преимущественно поражает систему?{
~мышечную
=адреналовую
~костно - суставную
~пищеварительную
}

Изменения в сердце при дифтерии в начале 2-й недели болезни?{
~острый бородавчатый эндокардит
~мелкоочаговый кардиосклероз
~фибринозный перикардит

=межуточный миокардит
}

Дифтерия дыхательных путей чаще сопровождается развитием воспаления? {
~дифтерического
=крупозного
~катарального
~серозного
}

Дифтерийный токсин преимущественно поражает системы? {
=нервную
~мышечную
~кровотворную
~пищеварительную
}

Путь заражения при гриппе? {
=воздушно - капельный
~фекально - оральный
~трансмиссивный
~контактный
}

Способность вируса избирательно поражать клетки и ткани называется: {
~вирулентность
~патогенность
~инвазивность
~фагоцитоз
=тропизм
}

Защитными реакциями макроорганизма являются: {
=фагоцитоз
~сенсibilизация
~аутоиммунизация
~аллергия
}

Основные патогенные свойства вируса гриппа: {
~стимуляция иммунитета
=вазопатическое действие
~нейропатическое действие
~онкогенное
}

Цитопатическое действие вируса гриппа микроскопически проявляются: {
~воспалением
~отеком тканей
~кровоизлияниями
=некрозом эпителия бронхов и альвеол
}

Присоединение вторичной инфекции при гриппе связано с действием вируса? {
=иммунодепрессивным
~нейропатическим
~цитопатическим
~вазопатическим
}

Общие изменения при гриппе? {
~дистрофия и некроз эпителия бронхов и альвеол
=дистрофия паренхиматозных органов
~кишечные расстройства
~нет правильного ответа
}

При легкой форме гриппа в слизистой оболочке верхних дыхательных путей развивается воспаление? {
~гнойное
=катаральное
~фибринозное
~геморрагическое
}

Микроскопические изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей при легкой форме гриппа? {
=фузиофильные включения в цитоплазме эпителия
~лимфо - плазмочитарная инфильтрация
~некроз слизистой оболочки
~гипосекреция желез

}

При гриппе средней тяжести воспаление развивается в?{

=трахее

~плевре

~в селезенке

~конъюнктиве

}

При гриппе средней тяжести в трахее и бронхах развивается воспаление?{

=серозно - геморрагическое

~фибринозное

~катаральное

~гнойное

}

Варианты течения тяжелой формы гриппа?{

=токсическая

~миокардитическая

~гепатоксическая

~нет правильного ответа

}

Метафорически легкое при тяжелой форме гриппа с легочными осложнениями называется:{

~сальное

~сотовое

~большое белое

=большое пестрое

}

Изменения головного мозга при тяжелой форме гриппа представлены?{

=серозным менингитом

~фибринозным воспалением

~гидроцефалией

~кальцинозом

}

Морфологическое выражение язвенной болезни желудка?{

~острая язва

~хроническая эрозия

~множественные острые эрозии

=хроническая рецидивирующая язва

}

Очаги экстрамедуллярного кроветворения при пернициозной анемии могут встречаться?{

~только в печени

~только в селезенке

~повсеместно

~только в селезенке и в печени

=везде, кроме костного мозга

}

Постоянные признаки гемолитических анемий?{

~гемоглобинурийный нефроз

=общий гемосидероз

~меланоз кожи

~петехии на коже

~подпеченочная желтуха

}

К эритроцитопатиям относятся?{

~фавизм

~а-талассемия

~серповидноклеточная анемия

=наследственный овалоцитоз

~постгеморрагическая анемия

}

К группе злокачественных иммунопролиферативных заболеваний относятся все нижеперечисленные процессы, кроме?{

~миеломной болезни

=миелосклероза

~макроглобулинемии

~болезни тяжелых цепей

~болезней легких цепей

}

Для гемолитических анемий характерна триада?{

~анемия, гепатомегалия, спленомегалия

~спленомегалия, фуникулярный миелоз, анемия

- =анемия, спленомегалия, желтуха
- ~гепатомегалия, анемия
- ~анемия, фуникулярный миелоз

}

Причины гемолитических анемий, обусловленных внутрисосудистым гемолизом?{

- =малярия
- ~воспалительные процессы
- ~васкулиты
- ~гематома
- ~ревматизм

}

Постоянные признаки гемолитических анемий, кроме?{

- =токсический нефроз
- ~общий гемосидероз
- ~гиперплазия костного мозга
- ~экстрамедуллярное кроветворение
- ~надпеченочная желтуха

}

Возбудителем скарлатины является?{

- ~диплококк
- ~кишечная палочка
- =стрептококк группы А
- ~зеленящий стрептококк
- ~стафилококк

}

Типичной локализацией местных изменений при скарлатине является?{

- ~язычная миндалина
- ~верхние дыхательные пути
- ~кожа
- ~кишечник
- =слизистая оболочка зева

}

Изменения регионарных лимфоузлов при скарлатине носят характер?{

- =некроза
- ~малокровия
- ~гипоплазии
- ~склероза
- ~атрофии

}

Формой менингококковой инфекции является?{

- ~аллергическая
- ~токсическая
- =назофарингит
- ~миелит
- ~ларинготрахеит

}

При менингококковом менингите типичным воспалением является?{

- ~геморрагическое
- ~катаральное
- ~продуктивное
- =гнойное
- ~гранулематозное

}

Характерная для туберкулезной гранулемы клетка?{

- ~Ашкенази
- ~койлоцит
- ~эпителиальная
- =эпителиоидная
- ~миоэпителиальная

}

Характерная для туберкулезной гранулемы клетка?{

- =гигантская многоядерная Лангханса
- ~многоядерная Рид-Штернбеога
- ~миофибробласт
- ~Микулича
- ~Вирхова

}

Предшественник гигантской многоядерной клетки Лангханса?{

- =костномозговой моноцит

- ~тканевой фибробласт
- ~клетка адвентиции
- ~клетка Кулфера

}

Неблагоприятный исход туберкулезной гранулемы?{

- ~ослизнение
- ~малигнизация
- ~образование кисты
- ~гнойное расплавление
- =увеличение зоны некроза

}

Виды фагоцитоза в гранулеме при туберкулезе?{

- ~полный
- ~неполный
- =завершенный
- ~ограниченный

}

Исход творожистого некроза при заживлении первичного аффекта при туберкулезе?{

- ~образование кисты
- ~распространение
- =фиброзирование
- ~расплавление
- ~инфаркт

}

Исход творожистого некроза при заживлении первичного аффекта при туберкулезе?{

- =петрификация
- ~формирование кисты
- ~образование фибриноида
- ~метастатическое обызвествление

}

Клинико-морфологические формы туберкулеза?{

- ~острый
- ~подострый
- ~хронический
- =первичный
- ~возвратный

}

Клинико-морфологические формы туберкулеза?{

- ~острый
- ~хронический
- ~возвратный
- =гематогенный

}

Очаг Гона – это?{

- ~казеозная бронхопневмония
- ~заживший туберкулез легких
- ~заживший гематогенный туберкулез
- ~первичный туберкулезный легочный аффект
- =заживший первичный туберкулезный легочный аффект

}

Первичный туберкулез развивается при?{

- ~трансплацентарной передаче возбудителя
- ~активации инфекта в гематогенных очагах отсева
- =первом попадании микобактерии в организм человека
- ~повторном попадании микобактерии в организм человека

}

Морфологическое выражение первичного туберкулеза?{

- ~первичный аффект
- =первичный комплекс
- ~казеозная пневмония
- ~милиарный туберкулез
- ~туберкулезный лимфаденит

}

Компоненты первичного легочного туберкулезного комплекса?{

- ~гнойный флебит, регионарный лимфаденит
- ~очаг бронхопневмонии, регионарный лимфаденит
- ~абсцесс легкого, тромбофлебит, регионарный лимфаденит
- ~очаг геморрагической пневмонии, лимфангит, лимфаденит
- =очаг казеозной пневмонии, лимфангит, регионарный лимфаденит

}

Характеристика гематогенного туберкулеза?{
~интраканаликулярное распространение возбудителя
~лимфожелезистое прогрессирование
~экссудативное тканевая реакция
=продуктивная тканевая реакция
}

Формы гематогенного туберкулеза?{
~инфильтративный
=генерализованный
~казеозная пневмония
~с лимфожелезистой генерализацией
}

Характеристика хронического крупноочагового туберкулеза легких?{
=наличие внелегочного туберкулезного очага
~«этажность» поражений в легком
~каналикулярное распространение
~наличие очага реинфекта
}

Характеристика поражения легких при гематогенном туберкулезе?{
=симметричные очаги в легких
~«этажность» поражений в легком
~наличие очага реинфекта
~лимфаденит
}

Характеристика хронического крупноочагового туберкулеза легких?{
=наличие очага Гона
~поражение одного легкого
~наличие очага реинфекта
~«этажность» поражений в легком
}

Источник гематогенного туберкулеза – очаг?{
=гематогенного отсева во внутренних органах
~Структова
~Ашоффа - Пуля
~Ассмана – Редекера
~нет правильного ответа
}

Типичная локализация очагов при костно - суставном туберкулезе?{
~кости стопы
~кости черепа
=тела позвонков
~мелкие суставы
}

Состояние первичного туберкулезного аффекта при вторичном туберкулезе?{
~некроз
~рост аффекта
~очаг Абрикосова
=заживший - очаг Гона
}

Формы вторичного туберкулеза?{
~гематогенно - десиминированный
~хронический крупноочаговый
~острый милиарный
=туберкулома
~туберкулома
}

Форма прогрессирования инфильтративного туберкулеза?{
~хронический деструктивный
~фиброзно - кавернозный
=казеозная пневмония
~фиброзно - очаговый
}

Очаг Абрикосова локализуется в сегментах легкого?{
~VIII - IX
~VII - X
~III - V
=I - II

}

Изменение бифуркационных лимфатических узлов при вторичном туберкулезе?{

~казеозный некроз

~кристаллизация

=пертификация

~амилоидоз

}

Очаг Ашоффа - Пуля – это?{

~туберкулома

~свежие очаги реинфекта

=зажившие очаги реинфекта

~очаги отсева гематогенного туберкулеза

}

Форма прогрессирования острого кавернозного туберкулеза?{

=фиброзно - кавернозный

~фиброзно - очаговый

~генерализованный

~цирротический

}

Морфология очага Абрикосова?{

~гранулема

~первичный аффект

~крупозная пневмония

=казеозная бронхопневмония

}

При спутогенном распространении туберкулеза поражается?{

~плевра

=кишечник

~миндалины

~мочевыводящая система

}

Общие изменения при скарлатине обусловлены?{

~тромбоцитопенией

~диспротеинемией

=токсемией

~виремией

}

Гнойно - некротические осложнения первого периода скарлатины?{

~миокардит

~амилоидоз

=гнойный отит

~нет правильного ответа

}

Формы течения скарлатины?{

=токсико - септическая

~септикопиемическая

~уремическая

~фибринозная

}