

Заболевание гепатит – это: {

~болезнь, характеризующаяся дистрофией и некрозом гепатоцитов

~опухоль печени

=воспаление печени

~гепатомегалия

~мускатная печень

}

Заболевание цирроз печени характеризуется: {

~воспалительной инфильтрацией стромы

~только острым течением

=сморщиванием печени

~гладкой поверхностью

~острой печеночной недостаточностью

}

Со стороны гепатоцитов при остром гепатите наблюдается: {

~%-33,33333%перестройка

~%50%дистрофия

~%-33,33333%дисплазия

~%50%некробиоз

~%-33,33333%воспалительная инфильтрация

}

Гепатит хронический может быть: {

~геморрагическим

~серозным

=активным

~гнойным

~катаральный

}

Хронический персистирующий гепатит характеризуется: {

~выраженной клеточной инфильтрацией всей стромы

=диффузной клеточной инфильтрацией портальных полей

~резкой дистрофией гепатоцитов

~холестазом

~некрозом гепатоцитов

}

Гепатит первичный возникает: {

~при брюшном тифе

=при алкоголизме

~при туберкулезе

~при тереотоксикозе

~при инфаркте миокарда

}

Вирус гепатита типа В передается путем: {

~трансмиссивным

~фекально-оральным

=чрескожным

~воздушно-капельным

}

Инкубационный период для вирусного гепатита типа А длится? {

~5-10 дней

=15-45 дней

~1-2дня

~25-180 дней

~около 6 часов

}

К развитию цирроза печени обычно ведет вирусный гепатит типа: {

~%-33,33333%A

~%50%B

~%50%C

~%-33,33333%D

~%-33,33333%E

}

Действие вируса гепатита типа В на гепатоциты обусловлено?{

=иммунным цитолизом

~цитопатическим действием

~цитотоксическим действием

~нет правильного ответа

}

При гепатите типа В некроз гепатоцитов бывает?{

~%50%сливающимся

~%-33,33333%тотальным

~%50%пятнистым

~%-33,33333%очаговым

~%-33,33333%диффузным

}

Клинико-морфологические формы вирусного гепатита В?{

~%-33,33333%гнойно интерстициальная

~%50%холестатическая

~%50%желтушная

~%-33,33333%цирротическая

~%-33,33333%холемическая

}

Лимфогенными являются метастазы рака печени: {

~%-33,33333%в легкие

~%50%в окологортальные лимфоузлы

~%-33,33333%в кости

~%50%по брюшине

~%-33,33333%в паховые лимфоузлы

}

Рак желчного пузыря чаще всего развивается на фоне: {

~цирроза печени

~хронического панкреатита

~эмпиемы желчного пузыря

~холелитиаза

=хронического холецистита

}

К злокачественным опухолям печени относятся: {

~печеночноклеточный рак

~холангиокарцинома

~цистаденокарцинома желчных протоков

~гепатобластома

=все вышеперечисленное

}

Болезни желудочно-кишечного тракта и печени.

Гастрит - это воспаление слизистой оболочки: {

=желудка

~желудка и двенадцатиперстной кишки

~двенадцатиперстной кишки

~тонкой кишки

~толстой

}

Гастрит эндогенный возникает: {

~%50%при сепсисе

~%50%при аллергии

~%-33,33333%при алкоголизме

~%-33,33333%при злоупотреблении лекарствами

~%-33,33333%при крупозной пневмонии

}

Морфологические формы острого гастрита? {

~%-33,33333%атрофический

~%50%флегмонозный

~%-33,33333%гипертрофический

~%50%некротический (коррозийный)

~%-33,33333%гиперпластический

}

Флегмона желудка возникает на фоне?{

=коррозивного гастрита

~полип желудка

~гастрита Менетрие

~острой дилатации

~катара желудка

}

Макроскопическая характеристика хронической язвы желудка вне обострения?{

~расположена в любом отделе желудка

~в дне - солянокислый гематин

=края плотные, омыленные

~края мягкие, ровные

}

Морфогенез хронической язвы желудка и 12-перстной кишки принципиально?{

~отличается

=не отличается

~нет правильного ответа

~все верно

}

Дно хронической язвы желудка в период ремиссии представлено?{

~мышечной тканью

~серозной оболочкой

~гною - некротическим экссудатом

=рубцовой тканью, покрытой эпителием

}

Стенки сосудов в дне хронической язвы желудка?{

~содержат массы амилоида

=склерозированы

~истончены

~нет правильного ответа

}

Синоним перфорации?{

~пенетрация

=прободение

~кровотечение

~малигнизация

}

В результате рубцового стеноза привратника может развиваться?{

~перфорация

~кровотечение

~малигнизация

=хлоргидропеническая уремия

}

Малигнизация хронической язвы – это?{

~некроз

~атрофия

~воспаление

=озлокачествление

}

Предраковые изменения слизистой оболочки желудка?{

=тяжелая дисплазия

~гипертрофия

~дистрофия

~атрофия

}

Общие изменения при раке желудка?{

~избыток веса

=бурая атрофия миокарда

~печеночно - клеточная недостаточность

~острая сердечно - сосудистая недостаточность

}

Наиболее частая локализация рака в желудка?{

~дно

~тело

=малая кривизна

~большая кривизна

}

Тотальный рак - это поражение желудка?{

~кардинального и пилорического отделов

~пилорического отдела и тела

~малой и большой кривизны

=всех отделов

}

Наиболее частый гистологический вариант экзофитного рака желудка?{

~недифференцированный

~плоскоклеточный

=аденокарцинома

~слизистый

}

Микроскопическая характеристика дна рака - язвы желудка ?{

~склероз стенок сосудов

~дисплазия эпителия

=мышечные волокна

~рубцовая ткань

}

Преимущественный путь метастазирования рака желудка?{

~имплантационный

~периневральный

=лимфогенный

~гематогенный

}

Первые метастазы рака желудка выявляются в ?{

~печени

~легких

~яичниках

=регионарных лимфатических узлах

}

Рак Крукенберга - это метастаз рака желудка в ?{

~печень

~почки

=яичники

~параректальные лимфатические узлы

}

В яичники рак желудка метастазирует путем ?{

~ортоградным лимфогенным

~ортоградным гематогенным

=ретроградным лимфогенным

~парадоксальным гематогенным

}

Гематогенным путем рак желудка чаще всего метастазирует?{

=печень

~яичники

~надпочечники

~регионарные лимфатические узлы

}

При болезни менетрие слизистая оболочка желудка?{

~атрофируется

=гипертрофируется

~нет правильного ответа

~все верно

}

Аппендицит – это?{

~брыжеечный лимфаденит

~туберкулезное поражение аппендикса

~острое воспаление правой маточной трубы

=воспаление червеобразного отростка с характерным клиническим синдромом

}

При флегмонозном аппендиците развивается воспаление?{

~дифтерическое

~гнилостное

~крупозное

=гнойное

}

Причина первичной гангрены аппендикса?{

~некроз мышечной оболочки

~изъязвление слизистой оболочки

~тромбоз аппендикулярной артерии

=фокусы гнойного воспаления в слизистой

}

Осложнения острого аппендицита?{

=самоампутация отростка

~цистаденома

~мукоцеле

~кровоотечение

}

Современная концепция патогенеза аппендицита?{

~алиментарная

~метаболическая

~иммунологическая

=ангионевротическая

}

Острый вирусной гепатит характеризуется?{

~гемосидерозом

~липофусцинозом

~жировой дистрофией гепатоцитов

=баллонной дистрофией гепатоцитов

}

Исход острого вирусного гепатита А?{

~постнекротический цирроз печени

~формирование носительства

~портальный цирроз печени

=выздоровление

}

Клетки печени, принимающие участие в накоплении и метаболизме витамина А?{

~гепатоциты

~купферовские

~эндотелиальные

=звездчатые (клетки Ито)

}

Появление инфильтрата в ткани печени называется?{

~регенерация

~гепатома

=гепатит

~цирроз

}

Биопсия печени мужчины К., 65 лет, с желтухой выявила выраженный холестаз, пенистый вид цитоплазмы гепатоцитов и озера желчи.
Заключение ?{

~цирроз печени

~синдром Жильбера

=обструкция желчных путей

~вирусный гепатит С

}

Мужчина Г., 50 лет, в течение 20 лет страдает алкогольным циррозом печени с развитием синдромов портальной гипертензии и печеночно – клеточной недостаточности. При анализе крови выявлено?{

~тромбоцитоз

=гипоальбунемия

~гипогаммаглобулинемия

~увеличенный уровень тестостерона

}

Жировая дистрофия гепатоцитов{

=обратима

~необратима

~нет правильного ответа

~все верно

}

Избирательная окраска на жир?{

~толуидиновый синий

~гематоксилин - эозин

~альциановый синий

=судан III

}

патогенезе синдрома Бадда - Киари ведущую роль играет закупорка?{

~воротной вены

~печеночной артерии

=печеночных вен

~верхней поллой вены

}

Метафорическое название печени при хронической сердечно-сосудистой недостаточности?{

~гусяная

=мускатная

~большая пестрая

~большая сальная

}

Синоним вирусного гепатита А – болезнь?{

~Рустицкого - Калера

~Сокольского - Буйо

~Вильсона

=Боткина

}

Путь передачи инфекции при вирусном гепатите А?{

~контактный

~парентеральный

=фекально - оральный

~воздушно - капельный

}

Вирус гепатита В содержит?{

~РНК

=ДНК

~РНК и ДНК

~нет правильного ответа

}

Тельца Каунсильмена образуются в результате?{

~колликвационного некроза

~коагуляционного некроза

~казеозного некроза

=апоптоза

}

При гидропической дистрофии цитоплазма?{

=набуханию

~сморщиванию

~глубочатому распаду

нет правильного ответа

}

При длительном холестазе печень приобретает цвет?{

~серый

=зеленый

~коричневый

~желтый

}

Непосредственными последствиями флегмонозного гастрита в брюшной полости являются: {

~%-33,33333%парааортальный абсцесс

~%50%перигастрит

~%-33,33333%паранефрит

~%50%перитонит

~%-33,33333%пиелонефрит

}

В развитии хронического гастрита играют роль экзогенные факторы: {

~%-33,33333%аллергия

~%50%нарушения режима питания

~%-33,33333%мутация генов

~%50%злоупотребление алкоголем

~%-33,33333%рефлюкс

}

Аутоиммунный хронический гастрит по локализации бывает: {

~коррозивный

=фундальный

~флегмонозный

~катаральный

~эрозивный

}

Хронический аутоиммунный гастрит характеризуется?{

~%50%значительным снижением секреции соляной кислоты

~%-33,33333%усилением секреции мукопротеидов

~%-33,33333%отсутствием гастринемии

~%-33,33333%усилением секреции соляной кислоты

~%50%высоким уровнем гастринемии

}

При хроническом гастрите в слизистой оболочке желудка имеют место:{

~некроз

~физиологическая регенерация

~гипертрофия мышечной пластинки

=дистрофия эпителия

~кровоизлияние

}

Признаки "энтеролизации" эпителия желудка при хроническом атрофическом гастрите?{

~%-33,33333%слизистые клетки желез

~%50%главные эпителиоциты

~%-33,33333%париетальные клетки

~%50%бокаловидные клетки

~%-33,33333%фибробласты

}

При обострении хронического гастрита возникают:{

~ишемия

~полипы

~гиперплазия эпителия

=эрозия

~метаплазия эпителия

}

Стадиями морфогенеза язвенной болезни являются:{

~%-33,33333%острый гастрит

~%50%эрозии

~%50%острые язвы

~%-33,33333%хронический гастрит

~%-33,33333%атрофический гастрит

}

Острая язва переходит в хроническую чаще в области малой кривизны желудка по причине?{

~отсутствия нервных рецепторов

~обилия кровеносных сосудов

=наличия "пищевой дорожки"

~обилия нервных рецепторов

~низкой активности желудочного сока

}

В связи с обострением язвенной болезни рубцовые изменения в желудке возникают из-за: {

~тромбоза сосудов

~атеросклероза сосудов

=созревания грануляционной ткани

~отложения солей извести

~атрофии мышечной ткани

}

К язвенно-деструктивным осложнениям язвенной болезни относятся: {

~гастрит

~дуоденит

=кровотечение

~деформация желудка

~перигастрит

}

Язва желудка может пенетрировать?{

~в левую почку

~в мочевой пузырь

~в селезенку

=в поджелудочную железу

~в правую почку

}

Наиболее частые сочетания (комбинации) осложнений язвенной болезни?{

=пенетрация и кровотечение

~репарация и перфорация

~кровотечение и малигнизация

~перфорация и пенетрация

~атрофия стенки желудка

}

К предраковым изменениям для рака желудка относятся?{

~хронический гиперацидный гастрит

~флегмона

~хронический атрофический гастрит

=кишечная метаплазия

}

Рак малой кривизны и пилорического отдела желудка может прорасти?{

~в селезенку

~в мочевой пузырь

~в яичники

=в ворота печени

~в яички

}

Лимфогенные ортоградные метастазы рака желудка обнаруживают?{

~%33,3333% в левых надключичных лимфоузлах

~%50% в лимфоузлах малой кривизны

~%33,3333% в яичниках

~%50% в лимфоузлах большой кривизны желудка

~%33,3333% в головном мозгу

}

Лимфогенные метастазы рака желудка могут возникнуть?{

~в печени

~в костях

~в надпочечниках

~в коже

=в яичниках

}

Канкротный перитонит возникает при метастазировании рака желудка путем? {

~гематогенным

~перинеуральным

=имплантационным

~лимфогенным

~интраканаликулярным

}

К изменениям, возникающим при дифтерии, в сердце относятся: {

~фибринозный перикардит

~гнойный миокардит

=токсический миокардит

~порок сердца

~возвратно-бородавочный эндокардит

}

Деструктивные формы острого аппендицита? {

=флегмонозный

~поверхностный

~катаральный

~серозный

~простой}

Флегмонозный аппендицит обычно начинает развиваться? {

~через 3 дня от начала болезни

~через 7 суток

~в первые часы болезни

=к концу первых суток

}

Гангренозный первичный аппендицит возникает в связи с: {

~периаппендицитом

=первичным тромбозом сосудов аппендикса

~туберкулезным поражением аппендикса

~мезентериолитом

~воспалительным тромбозом артерий аппендикса

}

Частыми и опасными являются осложнения острого аппендицита в виде: {

~парааортита

=перфорации стенки аппендикса

~эндометрита

~оофорита

~орхита

}

Язвенная болезнь характеризуется: {

~хроническим ациклическим течением

~острой язвой желудка или двенадцатиперстной кишки

=хроническим циклическим течением

~хронической эрозией

}

Патогенетическими факторами развития язвенной болезни являются: {

~прием некоторых лекарственных средств

~курение

=стресс

~злоупотребление алкоголем

}

Первичная злокачественная опухоль пищевода чаще всего? {

~аденокарцинома

=плоскоклеточный рак

~недифференцированный рак

~злокачественная меланома

~лейомиосаркома

}

К заболеваниям желудка, не являющимся предраком, относятся? {

=острый гастрит

~хронический гастрит

~хроническая язва

~аденоматозный полип желудка

}

Характерной локализацией ретроградных метастазов рака желудка являются: {

=надключичные лимфоузлы

~кости

~почки

~околоушная железа

~матка

}

Наиболее частой локализацией рака толстой кишки является: {

~слепая кишка

~восходящий отдел

~поперечно-ободочная часть

~селезеночный угол

=ректо-сигмоидальный отдел

}

Опухоль Крукенберга представляет собой? {

~тератобластому яичников

~двусторонний рак яичников солидного строения

=метастаз рака желудка в яичник

~верно все перечисленное

~нет правильного ответа

}

В основе сморщивания почек у больных пиелонефритом лежит?{

=склероз

~амилоидоз

~опхоль

~гематома

~петрификация

}

Функции почек при пиелонефрите?{

~повышаются

~не изменяются

=снижаются

~усиливаются

~сопровождаются гипотонией

}

Гломерулопатиями являются болезни?{

~"миеломная почка"

=амилоидоз почек

~"подагрическая почка"

~пиелонефрит

~поликистоз почек

}

Приобретенными гломерулопатиями являются?{

~синдром Альпорта

~семейный нефропатический амилоидоз

=гломерулонефрит

~пиелонефрит

~печеночный гломерусклероз

}

Приобретенные тубулопатии это?{

=некротический нефроз

~канальцевые ферментопатии

~нефросклероз

~нефротический синдром

~амилоидоз почек

}

При тубулопатиях страдают функции почек?{

~%-50%все перечисленное

~%-50%фильтрационная

~%50%концентрационная

~%50%реабсорбционная

}

Для гломерулонефрита характерны?{

~гнойное воспаление

~только острое течение

~артериальная гипотония

~гипертрофии правого желудочка сердца

=гипертрофия левого желудочка сердца

}

Внепочечные симптомы гломерулонефрита это?{

~гематурия

=гипертрофия левого желудочка сердца

~олигурия

~цилиндрурия

~протеинурия

}

Болезни, после которых обычно развивается гломерулонефрит?{

=скарлатина

~корь

~туберкулез

~дизентерия

~паротит

}

Характерные признаки вторично-сморщенных почек? {

~возникают при гипертонической болезни

~размеры почек резко увеличены

=поверхность почек мелкозернистая

~исходом является гематома

~сопровождаются гипертрофией правого желудочка сердца

}

Нефротический синдром характеризуется? {

~пиурией

=отеками

~гематурией

~резким повышением артериального давления

~гиполипидемией

}

Вторичный амилоидоз почек может возникнуть на фоне? {

~крупозной пневмонии

~ревматизма

=туберкулеза

~хронического гастрита

~эмфиземы легких

}

Некротический нефроз – это? {

=тубулопатия

~гломерулопатия

~опухоль почки

~поликистоз

~амилоидоз почек

}

Некронефроз – это анатомический субстрат почечной недостаточности? {

=острой

~хронической
~подострой
~туберкулеза
~волчанки
}

Возможные причины развития некронефроза?{

=соли тяжелых металлов
~гемолитический стрептококк
~этанол
~йод
~иммунопатология
}

Инфекционные начала при пиелонефрите в почку могли попасть путем?{

~воздушно-капельным
=гематогенным
~через кожу
~трансплацентарным
~фекально-оральным
}

Пиелонефрит - это заболевание почек?{

=инфекционное
~генетическое
~диабетическое
~иммунологическое
~аутоиммунное
}

При пиелонефрите в воспалительный процесс вовлекаются?{

~почечная лоханка
~чашечки
=строма почки, лоханка и чашечки
~клубочки

~канальцы

}

Формы хронического пиелонефрита характеризуются? {

~некрозом слизистой оболочки чашечек

~катаром слизистой оболочки чашечек

=склерозом лоханок

~фибринозным пиелитом

~лейкоцитарная инфильтрация лоханки

}

Возможные осложнения пиелонефрита? {

~желтуха

=пионефроз

~поликистоз

~рак почки

~гипотония

}

Нефролитиаз – это? {

~опухоль почки

~гломерулопатия

=почечно-каменная болезнь

~тубулопатия

~поликистоз

}

Возможные факторы развития нефролитиаза? {

=авитаминоз А

~преобладание в пище жиров

~цистит

~алкалоз

~гипертония

}

Гидронефроз может привести?{

=к пиелонефриту

~некронефрозу

~амилоидозу почек

~к вторичному сморщиванию почки

~гломерулонефриту

}

Возможные осложнения поликистоза почек?{

~гиперемия почек

=пиелонефрит

~гломерулонефрит

~липоидный нефроз

~амилоидоз почек

}

Морфологическая основа хронической почечной недостаточности?{

~уремия

=нефросклероз

~аутоинтоксикация

~задержка шлаков

~ацидоз

}

Уремия является?{

~морфологической основой хронической почечной недостаточности

=клиническим выражением хронической почечной недостаточности

~печеночной недостаточностью

~ишемической болезнью

~нарушением обмена сложных белков

}

Доброкачественной опухолью почек является?{

~почечноклеточный рак

~нефробластома (опухоль Вильмса)

=аденома

~мезобластическая нефрома

~у молодых мужчин

}

Под слизистой оболочкой матки расположены множественные шарообразные белесоватые узлы, четко ограниченные от окружающей ткани. Микроскопически - узлы построены из

пучков, состоящих из гладкомышечных элементов со слабыми явлениями тканевого атипизма. Указанная картина характерна?{

=для субмукозной лейомиомы

~для субмукозной лейомиосаркомы

~для субмукозной нейрофибросаркомы

~все перечисленное

~нет правильного ответа

}

При рентгенологическом исследовании грудной клетки мужчины 40 лет обнаружено расширение восходящего отдела аорты. При пальпации шеи за грудиной отмечается усиленная пульсация аорты. В аорте у данного больного имеется?{

~дивертикул

=аневризма

~тромб

~эмболия

~стеноз

}

У больного Ш., 28 лет, в области кожи чуть латеральнее левого крыла носа отмечается конусообразное возвышение диаметром 0,6 см и высотой 0,5 см, багрово-красного цвета с желтоватым участком в области верхушки, болезненно, возникло 3 дня назад. Больной астеничен. Врач подумал?{

~о карбункуле

=о фурункуле

~о флегмоне

~о гангрене

~о склерозе

}

У больного Р., 46 лет, страдающего хроническим алкоголизмом с циррозом печени, развился асцит. Артерии брюшной полости при этом?{

~расширены

=сдавлены

~не изменены

~тромбированы

~некротизированны

}

У больной С., 35 лет, отмечается выраженный цианоз губ, слизистой оболочки рта, акроцианоз. В анамнезе - ревматизм. Данные симптомы связаны?{

~с тромбозом

=с венозной гиперемией

~с ишемией

~гематомой

~патехией

}

Тучный мужчина 20 лет попал под автомашину. Имеют место распространенные переломы длинных трубчатых костей нижних конечностей. По дороге в больницу больной скончался. На вскрытии обнаружен врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой перегородки. Указать форму эмболии, которая возникла у больного?{

~воздушная

=жировая

~микробная

~газовая

~бактериальная

}

Неопытный водолаз очень быстро вынырнул с большой глубины. У него отмечаются за грудиные боли, удушье, цианоз, коллапс. Через некоторое время он скончался. От какой болезни скончался больной?{

=кессонной

~Аджисоновой

~Ходжкина

~Базедовой

}

У больного Ц., 50 лет, умершего в машине "скорой помощи", вызванной в связи с сильными болями за грудиной и страхом

смерти, на вскрытии обнаружено: очень жидкая кровь, признаки повышенной кровоточивости, отек легких. Судя по всему больной умер от шока. Если это действительно шок, то он является у данного больного?{

~травматическим

~гиповолемическим

=кардиогенным

~септическим

~гиперводемическим

}

У больного Ц., 50 лет, умершего в машине "скорой помощи", вызванной в связи с сильными болями за грудиной и страхом

смерти, на вскрытии обнаружено: очень жидкая кровь, признаки повышенной кровоточивости, отек легких. Судя по всему больной умер от шока. Боль за грудиной обусловлена?{

~только ишемией миокарда

~только инфарктом миокарда

=ишемией и инфарктом миокарда

~кардиосклерозом

~аневризмой сердца

}

Чем характеризуется "шоковое легкое"?{

~пневмосклерозом

=ателектазами

~бронхопневмонией

~крупозной пневмонией

~гемосидерозом

}

Ребенок 8 лет погиб во время автокатастрофы. По словам родителей, был здоров. При вскрытии: обнаружены очаги казеозного некроза в бронхопультмональных лимфатических узлах, единичные туберкулезные бугорки в печени и селезенке. Указанную клиническую картину в патологоанатомическом диагнозе следует обозначить как?{

~первичный туберкулез

=туберкулезный бронхоаденит

~рост первичного эффекта

~гематогенную генерализацию

}

У женщины 25 лет во время диспансеризации выявлена эрозия шейки матки. Проведена биопсия. При гистологическом исследовании обнаружена деструкция покровного эпителия, густая инфильтрация тканей матки лимфоидными и плазматическими клетками. Явление пролиферативного васкулита. В этом случае необходимо исключить?{

~истинную эрозию

=сифилис

~микоз

~опухоль

~туберкулез

}

На вскрытии в веществе головного мозга обнаружено кровоизлияние с формирующейся кистой, наполненной желто-бурым содержимым. В данном очаге кровоизлияния можно обнаружить?{

~%-50%билирубин

~%50%гематоидин

~%50%гемосидерин

~%-50%все верно

}

Микроскопическое исследование створок митрального клапана больного, погибшего в результате обострения ревматизма, показало, что в них имеются участки гомогенизации коллагеновых волокон, обладающие повышенной эозинофилией

и дающие положительную реакцию на фибрин. Метахромазия при окраске толудиновым синим не выражена. На основании перечисленного в клапане имеет место?{

~дистрофическое обызвествление

~ослизнение

~ожирение

=фибриноидное набухание

~мукоидное набухание

}

При микроскопическом исследовании створок митрального клапана, иссеченного при операции протезирования, у больного ревматическим митральным пороком сердца оказалось, что ткань обладает выраженной базофилией. При окраске толудиновым синим она красится в сиренево-красный цвет. Этот процесс может быть охарактеризован как?{

~амилоидоз

~гиалиноз

~фибриноидное набухание

=мукоидное набухание

}

В скудной мокроте вязкой консистенции у больного К., 45 лет, встречаются прожилки буроватого цвета. Эти прожилки представляют собой?{

~зерна меланина

=сидерофаги

~билирубин

~липофусцин

~гематин

}

В "клетках сердечных пороков" (больной в детстве перенес ревматический эндокардит) обнаруживается под микроскопом?{

~меланин

=гемосидерин

~гемомеланин

~порфирин

~гематоидин

}

У ребенка 12 мес. обнаружено отставание роста, незаращение родничков, деформация грудной клетки, утолщение ребер на границе костной и хрящевой ткани. Это состояние характерно для нарушения обмена?{

~меди

~фосфора

=кальция и фосфора

~железа

}

У ребенка 12 мес. обнаружено отставание роста, незаращение родничков, деформация грудной клетки, утолщение ребер на границе костной и хрящевой ткани. Причиной нарушения минерального обмена у данного ребенка является?{

~гиповитаминоз А

~гиповитаминоз В

~гипервитаминоз Д

~гиповитаминоз С

=гиповитаминоз Д

}

У ребенка 12 мес. обнаружено отставание роста, незаращение родничков, деформация грудной клетки, утолщение ребер на границе костной и хрящевой ткани. Ребенку следует поставить диагноз?{

~аддисоновой болезни

=рахита

~флюороза

~пеллагра

}

У больного лимфоузлы резко увеличены, располагаются пакетами, не спаяны между собой, на разрезе серого цвета.

Гистологически: мономорфная картина, представленная клетками типа В-лимфоцитов. Эта клиническая картина наблюдается?{

=при хроническом лимфолейкозе

~при лимфогранулематозе

~при хроническом миелолейкозе

~при ретикулосаркоме

~при хроническом неспецифическом лимфадените

}

Печень и селезенка увеличены. В костном мозге: пролиферация всех трех ростков, увеличение числа ядерных форм красного ряда, большое количество мегакариоцитов, почти полное исчезновение жировых клеток, очаговое рассасывание костных балок. Эта картина наблюдается? {

~при малярии

~при симптоматическом эритроцитозе

~при сепсисе

~при миеломной болезни

=при эритремии

}

Синоним болезни минимальных изменений – нефроз? {

~некротический

~желтушный

=липоидный

~нет правильного ответа

}

Интерпозиция мезангия при мембранопролиферативном гломерулонефрите приводит к? {

=к удвоению гломерулярных базальных мембран

~склерозу и гиалинозу мезангиального матрикса

~диффузному утолщению гломерулярных базальных мембран

~нет правильного ответа

}

К внепочечным изменениям при хроническом гломерулонефрите относят уремический? {

~гепатит

~тиреодит

~паранефрит

=гастроэнтерит

}

При некрозе извитых канальцев смерть больного может наступить от почечной недостаточности?{

=острой

~подострой

~хронической

~нет правильного ответа

}

Наиболее частый вариант амилоидоза почек?{

~первичный

~старческий

=вторичный

~локальный

}

Элективная окраска для выявления масс амилоида?{

~судан III

~фукселин

~пикрофуксин

=Конго красный

}

При синдроме Гудпасчера поражаются?{

~почки и печень

=почки и легкие

~почки и сердце

~почки и головной мозг

}

Нефрит при синдроме Альпорта сопровождается?{

~рахитом

=глухотой

~хондродистрофией

~заболеванием глаз

}

Острый некроз канальцев почки, связанный с действием пигментов, развивается при?{

~гемохроматозе

=гемолитических кризах

~шоке различной этиологии

~холере

}

Токсический острый некроз канальцев почки не может быть связан с действием?{

=солей канальцев

~этиленгликоля

~четырёххлористого углерода

~солей ртути

}

Стадии острого некроза канальцев почки не является?{

~основная

~начальная

~выздоровления

=нефротическая

}

Наиболее распространенной причиной пиелонефрита является инфекция?{

=восходящая

~гематогенная

~нет правильного ответа

~все верно

}

Наиболее частые источники эмболий почечных артерий?{

~тромбы глубоких вен голени

~тромбы в аневризмах грудного отдела аорты

=пристеночные тромбы левого предсердия и желудочка

~нет правильного ответа

}

Макроскопическая характеристика инфаркта почки не характеризуется следующими признаками? {

~клиновидный

=неправильной формы

~белый с геморрагическим венчиком

~основание обращено к поверхности почки

}

Причины обструкции мочевыводящих путей на уровне лоханки? {

~тромбы

=стриктуры

~воспаление

~гиперплазия ткани соседнего органа

}

Пиелонефрит характеризуется воспалением? {

~канальцев

~интерстиция

=почечных лоханок

~нет правильного ответа

}

При амилоидозе почек смерть больного может наступить от почечной недостаточности? {

~острой

~подострой

=хронической

~нет правильного ответа

}

Амилоидоз почек - это повреждение? {

~обратимое

=необратимое

~нет правильного ответа

~все верно

}

Причины обструкции мочевыводящих путей на уровне мочеточника не являются?{

~камни

=тромбы

~опухоли

~стриктуры

}

У мужчин уретрит часто сопровождается?{

~циститом

~проктитом

=простатитом

~парапроктитом

}