

Извитые формы бактерий: {
~стрептококки
~стафилококки
=спириллы
~эшерихии
~клостридии
}

Капсула бактерий выявляется методом: {
~Нейссера
~Ожешки
~Грама
=Бурри - гинса
~Циля - Нильсена
}

Патогенные диплококки: {
~стафилококки
~стрептококки
=гонококки
~сарцины
~микрококки
}

Палочковидные микроорганизмы: {
=бактерии
~стафилококки
~спириллы
~диплококки
~сарцины
}

К грамположительным бактериям относятся: {
~гонококки
~менингококки
~кишечная палочка
=стафилококки
~брюшнотифозная палочка
}

К кислотоустойчивым бактериям относятся: {
~кишечная палочка
~дифтерийная палочка
=туберкулезная палочка
~гонококки

~менингококки
}

К шаровидным формам бактерий относятся: {
~вибрионы
~спириллы
=стрептококки
~бациллы
~спирохеты
}

Грамотрицательными бактериями являются: {
~стафилококки
~стрептококки
=гонококки
~пневмококки
~сарцины
}

Вирусы размножаются: {
~почкованием
~поперечным делением
=репродукцией
~спорообразованием
~образованием микроколоний
}

Вирусы: {
~растут на питательных средах
=являются облигатными внутриклеточными паразитами
~имеют клеточные структуры
~размножаются почкованием
~имеют мицелий
}

Для окраски риккетсий применяют метод: {
~Ожешки
~Циля-Нильсена
=Здродовского
~Бурри
~Нейссера
}

Бактерии, образующие капсулу: {
~кишечная палочка

- ~дифтерийная палочка
- =сибирязвенная палочка
- ~брюшнотифозная палочка
- ~дизентерийная палочка

}

Подвижность бактерий определяют: {

- ~окраской по Граму
- ~окраской по Нейссеру
- =методом «раздавленной капли»
- ~окраской по Ожешко
- ~окраской по Романовского-Гимзе

}

Для морфологии стрептококков характерно: {

- ~спорообразование
- ~гроздевидное расположение в препарате-мазке
- =расположение в виде цепочки в препарате-мазке
- ~наличие жгутиков
- ~кислотоустойчивость

}

Спорообразование обеспечивает бациллам: {

- ~размножение
- ~накопление резервных питательных веществ
- =сохранение вида в неблагоприятных условиях
- ~защитную реакцию при попадании в макроорганизм
- ~окислительно-восстановительную функцию

}

Оболочку микробной клетки выявляют: {

- ~методом Грама
- ~методом Нейссера
- =методом плазмолиза клетки
- ~при изучении в живом виде
- ~реакцией Фельгена

}

Кислотоустойчивость бактерий обусловлена наличием: {

- ~нуклеиновых кислот
- =высоким содержанием липидов
- ~капсул
- ~рибосом
- ~цитоплазматической мембраны

}

Зерна волютина выявляют окраской по методу: {

~Грама

~Циля - Нильсена

~Ожешко

~Бурри - Гинса

=Нейссера

}

Спорообразующие микроорганизмы: {

~вибрионы

=клостридии

~сальмонеллы

~гонококки

~менингококки

}

При окраске по Нейссеру используют: {

~генцианвиолет

~метиленовый красный

=везувин

~спирт

~фуксин

}

Риккетсии характеризуются: {

~постоянством формы

~положительной окраской по Граму

=внутриклеточным паразитизмом

~отсутствием ДНК

~наличием спор

}

Споры образуют возбудители: {

~дифтерии

=столбняка

~брюшного тифа

~холеры

~сифилиса

}

Спирохеты являются возбудителями: {

~фурункулеза

~туберкулеза

=лептоспироза

~кандидоза
~токсоплазмоза
}

К аспорогенным бактериям относятся возбудители: {
~газовой гангрены
~столбняка
~ботулизма
=дизентерии
~сибирской язвы
}

К подвижным бактериям относятся: {
~дизентерийная палочка
~туберкулезная палочка
=брюшнотифозная палочка
~стафилококки
~стрептококки
}

Жгутики бактерий выявляют методом: {
~Нейссера
~Грама
=Леффлера
~Бурри - Гинса
~простой окраски
}

Бактерии, полностью лишенные клеточной стенки называются: {
=протопласты
~спирохеты
~грибы
~актиномицеты
~стафилококки
}

Создание Э. Дженнером вакцины: {
~позволило успешно бороться с бешенством
=связано с вакцинацией против оспы
~относится к пастеровскому периоду в микробиологии
~явилось результатом химических экспериментов
~явилось результатом опытов на лабораторных животных
}

Морфологию бактерий изучают с помощью: {

- ~сухой системы микроскопа с малым увеличением
- ~сухой системы микроскопа с большим увеличением
- =иммерсионной микроскопии
- ~лабораторных животных
- ~центрифугирования

}

К прокариотам относятся: {

- ~грибы
- =бактерии
- ~вирусы
- ~простейшие
- ~прионы

}

Роберт Кох: {

- ~изобрел микроскоп
- ~открыл природу брожения и гниения
- ~получил вакцину против бешенства
- =открыл возбудителя туберкулеза
- ~получил вакцину против сибирской язвы

}

Луи Пастер: {

- =создал вакцину против бешенства
- ~ввел в лабораторную практику твердые питательные среды
- ~открыл холерный вибрион
- ~открыл возбудителя туберкулеза
- ~создал фагоцитарную теорию иммунитета

}

Риккетсии являются возбудителями: {

- ~туберкулеза
- ~дифтерии
- ~дизентерии
- ~брюшного тифа
- =сыпного тифа

}

Риккетсии культивируют: {

- =в курином эмбрионе
- ~на простых питательных средах
- ~на дифференциально-диагностических питательных средах
- ~в анаэробах
- ~в среде 199

}

Внеклеточная форма хламидий называется: {

~зерна волютина

~зерна муха

~липидные включения

=элементарные тельца

~ L- форма

}

Хламидии являются возбудителями: {

~сыпного тифа

=трахомы

~гонореи

~сифилиса

~лептоспироза

}

Хламидии: {

~хорошо растут на питательных средах

=являются внутриклеточными паразитами

~грамположительные

~образуют споры

~не имеют клеточной стенки

}

Микоплазмы: {

~образуют споры

~грамположительные

~не растут на искусственных питательных средах

=не имеют клеточной стенки

~имеют капсулу

}

Микоплазмы могут быть возбудителями: {

~кори

~гриппа

=пневмонии

~ку-лихорадки

~дифтерии

}

Спирохеты: {

=имеют спиралевидную форму

~не подвижны

~грамположительные

~относятся к эукариотам
~образуют споры
}

Спирохеты вызывают: {
~хламидиоз
~токсоплазмоз
=лептоспироз
~орнитоз
~актиномикоз
}

Зерна волютина (Бабеша-Эрнста характерны для возбудителей): {
~туберкулеза
~листериоза
~хламидиоза
=дифтерии
~бруцеллеза
}

Для прокариотической клетки характерно наличие: {
~рибосом 80S
~ядрышка
=пептидогликана
~митохондрий
~диплоидного набора генов
}

Нитчатый гриб, образующий эндоспоры: {
~аспергилл
~пеницилл
~дрожжи
=мукор
~кандида
}

К дрожжеподобным грибам относятся: {
~дрожжи
~мукор
=кандида
~аспергилл
~пеницилл
}

Дрожжеподобные грибы Candida: {
~многоклеточные микроорганизмы
~размножаются экзоспорами
=размножаются почкованием
~не имеют оболочки
~не имеют ядра
}

К перитрихам относятся бактерии: {
=кишечная палочка
~дифтерийная палочка
~дизентерийная палочка
~холерный вибрион
~туберкулезная палочка
}

К монотрихам относятся: {
~спириллы
~кишечная палочка
=холерный вибрион
~брюшнотифозная палочка
~дизентерийная палочка
}

Окраска по Граму применяется для: {
=дифференциации бактерий
~обнаружения капсул
~выявления включений в клетке
~выявления спор
~обнаружения кислотоустойчивых бактерий
}

Бактерии, образующие капсулу только в организме человека или животных: {
~кишечная палочка
=палочка сибирской язвы
~клебсиелла
~шигелла
~сальмонелла
}

Микробы, образующие капсулу в организме человека и на питательной среде: {
~пневмококк
~палочка сибирской язвы

- =клебсиеллы
- ~дизентерийная палочка
- ~туберкулезная палочка

}

Какие структуры обязательны для L-форм бактерий: {

- ~капсула
- ~жгутики
- ~клеточная стенка
- =цитоплазматическая мембрана
- ~волютиновые зерна

}

Бактерии, частично лишенные клеточной стенки: {

- ~протопласты
- =сферопласты
- ~микоплазмы
- ~грибы
- ~спирохеты

}

L - формы бактерий имеют форму: {

- ~веретенообразную
- ~палочковидную
- ~извитую
- =сферическую
- ~спиралевидную

}

Внеклеточная форма существования вирусов: {

- =вирион
- ~капсид
- ~капсомер
- ~суперкапсид
- ~элементарные тельца

}

Тельца Гварниери отмечаются при: {

- ~бешенстве
- ~трахоме
- ~гриппе
- =натуральной оспе
- ~герпесе

}

Вирусы представляют собой: {
~эукариоты
=внеклеточную форму жизни
~прокариоты
~прионы
~одноклеточные организмы
}

К эукариотам относятся: {
~стафилококки
=простейшие
~хламидии
~микоплазмы
~спирохеты
}

Капсула бактерий образована: {
~фосфолипидами
=полисахаридами
~липопротеинами
~гликопротеинами
~нуклеиновыми кислотами
}

Цитоплазматическая мембрана содержит: {
=фосфолипиды
~холестерин
~липополисахариды
~пептидогликан
~нуклеиновые кислоты
}

Основу клеточной стенки составляет: {
~углекислота
~цитоплазматическая мембрана
~ДНК
=пептидогликан
~витамины
}

Нуклеоид прокариот: {
~имеет ядрышко
~содержит плазмиды
=лишен ядерной мембраны
~содержит белки-гистоны

~не содержит ДНК
}

Внехромосомные факторы наследственности бактерий: {

~мезосомы

~споры

~зерна волютина

~гликоген

=плазмиды

}

Споры располагаются центрально у возбудителей: {

~столбняка

~газовой гангрены

=сибирской язвы

~ботулизма

~дифтерии

}

Споры располагаются терминально у возбудителей: {

~ботулизма

=столбняка

~сибирской язвы

~газовой гангрены

~листериоза

}

Споры располагаются субтерминально у возбудителей: {

=ботулизма

~столбняка

~брюшного тифа

~сибирской язвы

~холеры

}

После окраски мазка по Граму в сине-фиолетовый цвет красятся: {

=грамположительные бактерии

~грамнегативные бактерии

~лактоположительные бактерии

~лактонегативные бактерии

~кислотоустойчивые бактерии

}

«Веретенообразную» форму имеют: {

- =клостридии
- ~бациллы
- ~бактероиды
- ~энтеробактерии
- ~пептококки

}

К спорообразующим анаэробам относятся: {

- =клостридии
- ~бактероиды
- ~порфиромонады
- ~вейлонеллы
- ~превотеллы

}

Актиномицеты относятся к: {

- ~грибам
- =бактериям
- ~простейшим
- ~спирохетам
- ~хламидиям

}

Для стрептококков характерно расположение в мазке: {

- ~в виде «гроздьев винограда»
- =в виде цепочки
- ~по одному
- ~по четыре
- ~под углом в виде латинской буквы V

}

Возбудитель сибирской язвы по морфологическим свойствам представляет собой: {

- =стрептобациллы
- ~стрептококки
- ~микобактерии
- ~микоплазмы
- ~монококки

}

Какие структуры являются обязательными для бактериальной клетки: {

~жгутики

~капсула

~спора

=цитоплазматическая мембрана

~митохондрии

}

Какие структуры обязательны для L - форм бактерий: {

~капсула

=цитоплазматическая мембрана

~клеточная стенка

~жгутики

~споры

}

Микроорганизмы лишенные клеточной стенки: {

~хламидии

=микоплазмы

~бруцеллы

~трепонемы

~риккетсии

}

Эукариотическое строение ядра имеют: {

~бактерии

~вирусы

~микоплазмы

=простейшие

~спирохеты

}

Прокариоты характеризуются: {

~отсутствием клеточной стенки

~отсутствием цитоплазматической мембраны

=отсутствием ядерной мембраны

~отсутствием рибосом

~отсутствием мезосом

}

Тинкториальные свойства бактерий – это: {

~устойчивость к действию химических факторов

~принадлежность к определенной таксономической единице

~чувствительность к бактериофагам

=отношение к красителям

~способность вырабатывать токсины
}

Отсутствие клеточной стенки детерминировано генетически у: {
~протопластов
~сферопластов
~хламидии
=микоплазм
~риккетсий
}

Муреин клеточной стенки иначе называется: {
~ЛПС
=пептидогликан
~n-ацетилглюкозамин
~мурамовая кислота
~тейхоевая кислота
}

Для обнаружения капсул у бактерий используют метод окраски: {
~простой
~по Граму
=по Бурри-гинсу
~по Ожешке
~по Леффлеру
}

Мицелий грибов представляет собой: {
~скопление хламидоспор
=скопления гиф
~конидии
~спорангии
~скопление ядер
}

Микроворсинки (пили) характерны для: {
~грамположительных бактерий
=грамотрицательных бактерий
~микоплазм
~L-форм
~кислотоустойчивых бактерий
}

Риккетсии: {

- ~имеют жгутики
- ~образуют споры
- ~образуют капсулу
- =внутриклеточные паразиты
- ~круглые микроорганизмы

}

Образование цист характерно для: {

- ~бактерий
- =простейших
- ~вирусов
- ~риккетсий
- ~грибов

}

Спорами размножаются: {

- ~простейшие
- ~бактерии
- ~вирусы
- =грибы
- ~хламидии

}

Для окраски простейших используют способ: {

- ~Циля - Нильсена
- ~Ожешко
- =Романовского - Гимзе
- ~Нейссера
- ~Гинса

}

Простейшие: {

- ~относятся к прокариотам
- ~имеют нуклеоид
- =относятся к эукариотам
- ~не имеют ядерную мембрану
- ~не имеют клеточного строения

}

Для получения плотной консистенции питательных сред используют: {

- ~углеводы
- ~белки
- =агар - агар
- ~ферменты
- ~аминокислоты

}

Культуральные свойства бактерий: {

~форма, строение, структура клетки

=тип и характер роста на питательных средах

~способность вызвать инфекцию

~способность окрашиваться

~способность разлагать белки и углеводы

}

Для микроскопического изучения колоний используют: {

=объектив х 8

~иммерсионный объектив

~темнопольную микроскопию

~люминесцентную микроскопию

~приготовление препарата - мазка

}

Лизогенная конверсия - это изменение свойств бактерий: {

~под действием химических веществ

~физических факторов

~антибиотиков

~вирулентного бактериофага

=умеренного бактериофага

}

Для стерилизации перевязочного материала используют: {

~кипячение

~дробную стерилизацию

=автоклавирование

~химический способ

~прокаливание на огне

}

Размножение бактерий происходит: {

=поперечным делением

~амитотически

~спорами

~кариокинетически

~дизъюнктивной репродукцией

}

Для биохимической идентификации бактерий изучают: {

~чувствительность к антибиотикам

~антигенное строение

~морфологические свойства
=сахаролитические и протеолитические свойства
~тинкториальные свойства
}

Элективными называют питательные среды: {
~применяемые для выращивания многих бактерий
=для избирательного выделения и накопления микроорганизмов
определенного вида
~применяемые для разграничения отдельных видов (или групп)
микроорганизмов:
~жидкие среды
~плотные среды
}

Селективной для стафилококков является питательная среда: {
~сахарный агар
~кровяной агар
~среда Китта-Тароцци
~мясо-пептонный агар
=желточно-солевой агар
}

Для культивирования аэробов используют: {
~анаэроостат
~эксикатор
~печь Пастера
=термостат
~автоклав
}

Из нижеперечисленных бактерий являются неспорогенными анаэробами: {
~гонококки
~стрептококки
=бактероиды
~кlostридии столбняка
~бруцеллы
}

К жидким питательным средам относится среда: {
~Леффлера
=МПБ
~Эндо
~Борде - Жангу

~Левенштейна - Йенсена
}

Явление бактериофагии было открыто: {
~Пастером
=Д.Эреллем
~Кохом
~Ивановским
~Мечниковым
}

Бактерии по типу дыхания различают: {
~автотрофы, гетеротрофы
~литотрофы, органотрофы
~прототрофы, ауксотрофы
=аэробы, анаэробы
~сапрофиты, паразиты
}

Бактерии способные расти в присутствии кислорода и без него: {
~анаэробы
~аэробы
~строгие аэробы
~строгие анаэробы
=факультативные анаэробы
}

Индукцибельными ферментами называются: {
~ферменты, расщепляющие углеводы
~ферменты, расщепляющие белки
=ферменты, концентрация которых резко возрастает от наличия соответствующего субстрата
~ферменты, которые постоянно синтезируются в микробных клетках в определенных концентрациях
~ферменты, имеющие значение для идентификации бактерий
}

Процесс генетических рекомбинаций, в котором участвует бактериофаг: {
~конъюгация
~трансформация
=трансдукция
~репарация
~модификация
}

Чувствительность бактерий к антибиотикам определяют методом: {

- ~мембранных фильтров
 - =серийных разведений
 - ~разведений по Вейнбергу
 - ~титрования по грация
 - ~седиментационным
- }

Фенотипическая изменчивость бактерий обусловлена: {

- ~мутацией
 - ~трансформацией
 - ~трансдукцией
 - ~конъюгацией
 - =модификацией
- }

Стеклянную лабораторную посуду стерилизуют: {

- ~ультрафиолетовыми лучами
 - ~кипячением
 - ~текучим паром
 - =сухим жаром
 - ~сухим жаром
- }

Дифференциация свойств бактерий на среде Эндо основана на: {

- ~расщеплении глюкозы
 - =расщеплении лактозы
 - ~расщеплении сахарозы
 - ~разложении пептона
 - ~образовании индола
- }

В качестве дифференциально-диагностической среды для семейства энтеробактерий используют: {

- ~сахарный агар
 - =среду Эндо
 - ~МПБ
 - ~асцит - агар
 - ~желчный бульон
- }

Сахаролитические ферменты можно определить на средах: {

- ~Китта - Тароцци
- =Гисса

- ~Вильсона - Блера
- ~ЖСА
- ~на пептонной воде

}

«Штамм» - это: {

- ~популяция бактерий, выращенная на питательной среде
- ~изолированное скопление бактерий одного вида, образующееся в результате размножения одной бактериальной клетки на плотной питательной среде
- =культура микробов одного вида, выделенная из различных источников или в разное время из одного и того же источника
- ~культура бактерий выросшая из одной зиготы
- ~культура бактерий, выделенная из патологического материала

}

Культуральные свойства бактерий изучают: {

- ~приготовлением мазка и микроскопированием
- ~окраской по Граму
- ~методом мембранных фильтров
- =по характеру роста на плотных и жидких питательных средах
- ~по методу Вейнберга

}

Для идентификации вида микроба по биохимическим свойствам изучают: {

- =ферментативную активность
- ~чувствительность к антибиотикам
- ~коли - титр
- ~внутрикожную аллергическую пробу
- ~чувствительность к дезинфектантам

}

Чистую культуру аэробов выделяют по методу: {

- ~Цейслера
- ~Вейнберга - Перетца
- ~Шукевича
- ~Кастеллани
- =Дригальского

}

Микробиоценоз – это: {

- ~территориально ограниченный экологически однородный участок обитания
- =сообщество бактерий, обитающих в определенном биотопе;
- ~совокупность особей одного вида, обитающих в пределах определенного биотопа;

~совокупность всех биологических организмов, обитающих в определенном биотопе;
~подавление жизнедеятельности одной популяции другой.
}

Протеолитические ферменты определяют: {
~микроскопированием
~по изменению цвета на средах Гисса
~по образованию пузырьков газа на среде Китта - Тароцци
~при посеве уколом в высокий столбик сахарного агара
=по образованию индола, аммиака, сероводорода
}

Факультативными анаэробами являются: {
~менингококки
~вейлонеллы
~кlostридии столбняка
~бактероиды
=брюшнотифозные палочки
}

К универсальным (простым) питательным средам относятся: {
=МПА
~среда Эндо
~желчный бульон
~кровяной агар
~шоколадный агар
}

Время генерации бактерий: {
~увеличение массы бактериальной клетки
~продолжительность жизни бактерий
=период в течение которого осуществляется деление клетки
~период адаптации бактерий к питательной среде
~период прорастания споры в вегетативную клетку
}

Для санитарно-бактериологического исследования воды используется метод: {
~бумажных дисков
~серийных разведений
~седиментационный
~аспирационный
=мембранных фильтров
}

Фитонциды – это: {

~продукты метаболизма бактерий

~антибиотики животного происхождения

~вирусы бактерий

=антибиотики растительного происхождения

~вирусы растений

}

Культура бактерий называется лизогенной если: {

~содержит размножающиеся бактерии

~способствует переходу умеренных фагов в литические формы

=содержит геномы фагов, встроенных в хромосому клетки

~не содержит фагов

~обладает устойчивостью к многим антибиотикам

}

Методом тиндализации стерилизуют: {

~стеклянная посуда

~перевязочный материал, белье

~воздух в боксах, операционных

=сыворотка крови, витамины

~хирургические инструменты, предметные и покровные стекла

}

Механическую стерилизацию проводят: {

~высокой температурой

~УФ - лучами

~химическими соединениями

~прокаливанием в пламени

=мембранными фильтрами

}

Питательные сахаросодержащие среды стерилизуют: {

~прокаливанием в пламени

~сухим жаром

~ультрафиолетовыми лучами

~пастеризацией

=текучим паром

}

Все микроорганизмы по способности усваивать источники углерода делятся на: {

=аутоотрофы и гетеротрофы

- ~фототрофы и хемотрофы
- ~аэробы и анаэробы
- ~прототрофы и ауксотрофы
- ~сапрофиты и паразиты

}

В зависимости от источников энергии и природы доноров электронов микроорганизмы подразделяют: {

- ~аутоотрофы и гетеротрофы
- =фототрофы и хемотрофы
- ~хемолитотрофы и хемоорганотрофы
- ~прототрофы и ауксотрофы
- ~сапрофиты и паразиты

}

Бактерии, для питания которых необходимы органические источники углерода, называются: {

- ~аутоотрофы
- ~аэробы
- =гетеротрофы
- ~анаэробы
- ~литотрофы

}

К конститутивным ферментам относятся: {

- ~ферменты, расщепляющие углеводы
- ~ферменты, расщепляющие белки
- ~ферменты, концентрация которых резко возрастает от наличия соответствующего субстрата
- ~ферменты, имеющие значение для идентификации бактерий
- =ферменты, которые постоянно синтезируются в микробных клетках в определенных концентрациях.

}

Мезофильные бактерии, к которым относится, большинство патогенных для человека бактерий, лучше растут при температуре: {

- ~50-60° c
- =20-40° c
- ~от 0 до 10° c
- ~от 10 до 20° c
- ~от 0 до -10° c

}

Дифференциально - диагностическими называют среды:

- ~применяемые для выращивания многих бактерий
- ~для избирательного выделения и накопления микроорганизмов определенного вида
- =применяемые для разграничения отдельных видов (или групп) микроорганизмов
- ~жидкие питательные среды
- ~плотные питательные среды
- }

Чистой культурой называется: {

- ~популяция бактерий выращенная на питательной среде
- ~культура бактерий выросшая из одной клетки
- =популяция бактерий одного вида, выращенная на питательной среде
- ~изолированное скопление бактерий одного вида, образующееся в результате размножения одной бактериальной клетки
- ~культура бактерий, выделенная из патологического материала
- }

Седиментационный метод используют для изучения: {

- ~санитарно - микробиологического состояния воды
- =санитарно - микробиологического состояния воздуха закрытых помещений
- ~санитарно - микробиологического состояния почвы
- ~микробной загрязненности пищевых продуктов
- ~микробной загрязненности лекарственного сырья
- }

Метод мембранных фильтров используют для изучения: {

- =для санитарно - микробиологического исследования воды
- ~санитарно - микробиологического состояния воздуха закрытых помещений
- ~санитарно - микробиологического состояния почвы
- ~микробной загрязненности пищевых продуктов
- ~для определения чувствительности к антибиотикам
- }

Серовары - это варианты бактерий внутри данного вида различающиеся по :{

- ~морфологическим свойствам
- ~биохимическим свойствам
- =антигенным свойствам
- ~чувствительности к фагу
- ~чувствительности к антибиотикам
- }

Фаговары - это варианты внутри данного вида, различающиеся по: {
~тому или иному биологическому признаку
~биохимическим свойствам
~антигенным свойствам
=чувствительности к фагам
~чувствительности к антибиотикам
}

Хемовар - это варианты внутри данного вида различающиеся по: {
~тому или иному (одному) признаку
=биохимическим свойствам
~антигенным свойствам
~чувствительности к фагу
~чувствительности к антибиотикам
}

Метод Фортнера используют для: {
~выделения чистой культуры аэробов
~выделения антибиотикорезистентных культур
=создания анаэробных условий
~создания аэробных условий
~определения микрофлоры воздуха
}

Для определения протеолитических ферментов производят посев культуры бактерий: {
~в среды Гисса
~в среду Китта - Тароцци
~на среду Эндо
~в среду Раппопорта
=в МПБ с индикаторами
}

Для бактериофагов характерно: {
~размножение бинарным делением
~рост и размножение на питательных средах
~патогенность для человека
=размножение в клетках бактерий
~анаэробный тип дыхания
}

Облигатными аэробами являются: {
=палочка коклюша
~кишечные палочки
~стафилококки

~бактероиды
~клебсиеллы
}

Облигатными анаэробами являются: {
~бордетеллы коклюша
~кишечные палочки
~стафилококки
=столбнячные палочки
~клебсиеллы
}

Токсическое действие молекулярного кислорода на облигатные анаэробы обусловлено накоплением: {
~пирувата
~конечных продуктов брожения
=перекиси водорода
~углекислоты
~глицеральдегидрофосфата
}

Синтез клеточной стенки подавляют антибиотики: {
~полимиксин
~полиеновые антибиотики
=цефалоспорины
~аминогликозиды
~группа тетрациклинов
}

Для лечения грибковых инфекций используют антибиотики: {
~беталактамы
~тетрациклины
~рифамицины
=полиеновые антибиотики
~макролиды
}

Ферменты, постоянно присутствующие в клетке и обеспечивающие ее существование называются: {
~индуцибельные
=конституитивные
~бета - лактамазы
~бета - галактозидаза
~галактозидацетилтрансферазы
}

Аминокислота характерная только для бактерий: {

~цистин

~метионин

~триптофан

~лизин

=диаминопимелиновая кислота (дап)

}

Нарушение функций цитоплазматической мембраны мицетов отмечается под действием: {

~цефалоспорин

=нистатин

~циклосерин

~макролиды

~левомицитин

}

Антибиотики, действующие на синтез нуклеиновых кислот: {

~эритромицин

~олеандомицин

=рифампицин

~линкомицин

~доксидиклин

}

Чувствительность к антибиотикам определяют: {

~методом мембранных фильтров

=методом бумажных дисков

~двухфазным бродильным методом

~седиментационным методом

~аспирационным методом

}

Антибиотик пенициллин впервые был открыт: {

~З. Ваксманом

~З.В.Ермольевой

=А. Флемингом

~Г. Флори и Э. Чейн

~П. Эрлихом

}

К антибиотикам бактериального происхождения относят: {

~стрептомицин

~тетрациклин

~фитонциды
~левомицитин
=грамицидин
}

К антибиотикам грибкового происхождения относятся: {

~полимиксин
~грамицидин
~эритрин
=цефалоспорины
~фитонциды
}

Антибиотики животного происхождения: {

~аминогликозиды
~циклосерин
=экмолин
~леворин
~оксациллин
}

К беталактамным антибиотикам относятся: {

~мономицин
~канамицин
~неомицин
~тетрациклин
=пенициллин
}

К макролидам относятся антибиотики: {

=эритромицин
~оксациллин
~левомицитин
~ампициллин
~цефалоспорин
}

Устойчивость бактерий к антибиотикам связана с: {

~f-плазмидами
=r-плазмидами
~col-плазмидами
~ent-плазмидами
~токсичностью
}

В состав пенициллина входят: {

=бета-лактамное кольцо
~макролактоновое кольцо
~углеводные остатки
~пептиды
~аминосахара
}

Антибиотики – макролиды: {
~канамицин
=олеандомицин
~мономицин
~левомицетин
~циклосерин
}

Устойчивость бактерий к лекарственным препаратам обеспечивают: {
~f-плазмиды
~плазмиды патогенности
~бактериоцины
=г-плазмиды
~плазмиды биодеградации
}

К генетическим рекомбинациям относятся: {
~плазмиды
~транспозоны
~s-последовательности
~модификации
=трансдукция
}

Процесс восстановления клеточного генома (ДНК) называется: {
=репарацией
~мутацией
~модификацией
~диссоциацией
~трансдукцией
}

К модификационной изменчивости относятся: {
~трансформация
~трансдукция
~конъюгация
=фенотипические изменения признаков микроорганизма
~мутация

}

В организме человека в норме стерильны: {

~полость рта

~толстый кишечник

~верхние дыхательные пути

~желудок

=кровь

}

При конъюгации происходит передача: {

~колицинов

~пестицинов

~вибриоцинов

=f-плазмид

~стафилоцинов

}

Трансдукция - это перенос генетического материала из клетки-донора в клетку –реципиента: {

=с помощью умеренного фага

~при их скрещивании

~с помощью антибиотиков

~при их диссоциации

~при их облучении

}

Трансформация - это перенос генетического материала из клетки -донора в клетку-реципиента: {

~с помощью фага

~при их скрещивании

=с помощью ДНК донора

~при их облучении

~при их диссоциации

}

r-плазида определяет: {

~синтез структурных белков

~синтез белка репрессора

=лекарственную устойчивость

~продукцию конституитивных ферментов

~синтез колицинов

}

r-плазмиды контролируют образование: {

~колицинов

~пестицинов

=бета-лактамаз

~вибриоцинов

~I-форм бактерий

}

Для выделения аэробов производят посев: {

=на поверхность мясо-пептонного агара

~уколом в высокий столбик сахарного агара

~на среду Китта-Тароцци

~по методу Веньяля-Вейона

~по методу Фортнера

}