

Поражение у детей младшего возраста вызывают в основном: {

=ЭПКП

~ЭТКП

~ЭИКП

~ЭГКП

~ЭАГП

}

Гемокультура - это культура микроорганизмов, выделенных из: {

~желчи

=крови

~мокроты

~испражнений

~мочи

}

Для диагностики брюшного тифа ставят серологическую реакцию: {

=Видаля

~Вассермана

~Борде - Жангу

~Асколи

~Райта

}

Кишечная палочка является возбудителем: {

~дизентерии

~брюшного тифа

=колиэнтеритов

~сыпного тифа

~холеры

}

Бактериальная дизентерия – это: {

=шигеллез

~сальмонеллез

~эшерихиоз

~трепонематоз

~микобактериоз

}

Для выделения гемокультур при диагностике брюшного тифа и паратифов кровь засевают на среду: {

=Раппопорта

~Эндо

~Желточно - солевую среду

~МПА

~Левенштейна – Йенсена

}

Ведущим для диагностики кишечных инфекций является метод: {

~бактериоскопический

~биологический

=бактериологический

~серологический

~аллергический

}

Для морфологии холерного вибриона характерно: {

~овоидная форма

=наличие одного жгутика

~перитрихальное расположение жгутиков

~спорообразование

~наличие капсулы

}

Диагностика брюшного тифа на первой неделе заболевания проводится путем бактериологического исследования: {

~желчи

=крови

~испражнений

~гноя

~мочи

}

При бактериологической диагностике дизентерии испражнения засевают: {

~на МПА

=на среду Плоскирева

~на сахарный МПБ

~на среду Китта - Тароцци

~на среду Леффлера

}

Для бактериологической диагностики колиэнтеритов испражнения больного

засевают на: {
~МПА
~среду Леффлера
=среду Эндо
~желчный бульон
~среду Вильсон – Блера
}

Для микробиологической диагностики дизентерии применяют: {
=бактериологическое исследование испражнений
~кожно-аллергическую пробу Манту
~реакцию флоккуляции
~микроскопию мазка
~феномен Исаева – Пфейффера
}

Специфическая профилактика холеры проводится путем применения: {
~антитоксической сыворотки
~живой вакцины
=анатоксина - холерогена
~аутовакцины
~вакцины АКДС
}

Микробиологическая диагностика холеры проводится путем: {
=посева исследуемого материала на щелочную пептонную воду
~микроскопии мазков крови
~исследования испражнений в реакции преципитации
~заражения белых мышей
~постановки кожно-аллергической пробы
}

Международная классификация рода шигелл основана на: {
~тинкториальных свойствах
~токсинообразовании
~морфологических особенностях
=антигенном строении
~расщеплении глюкозы
}

Для бактериологической диагностики эшерихиозов используют: {

=посев испражнений на среду Эндо
~исследование сыворотки в реакции нейтрализации токсина
~заражение белых мышей
~реакцию Асколи
~микроскопию мазка в темном поле
}

Возбудитель брюшного тифа впервые был обнаружен: {
~Х. Шоттмюллером
~Л. Пастером
=К. Эбертом
~Р. Кохом
~Д.И. Ивановским
}

Для возбудителя холеры характерна: {
~нитевидная форма
~кокковидная форма
=грамотрицательная окраска
~терминальная спора
~требовательность к питательным средам
}

Рост холерного вибриона на питательной среде отмечается: {
~через 24-48 ч
=через 6-8 ч
~через 1-2 недели
~в анаэробных условиях
~при повышенной концентрации CO₂
}

На среде эндо кишечная палочка образует колонии: {
=красные
~синие
~желтые
~бесцветные
~кремовые
}

Для микробиологической диагностики дизентерии ведущим является метод: {

- ~микроскопический
- ~бактериоскопический
- =бактериологический
- ~биологический
- ~аллергический
- }

Для культивирования холерного вибриона применяют питательные среды: {

- =щелочной агар
- ~среда Эндо
- ~кровяной агар
- ~желточный бульон
- ~среда Раппопорта
- }

Копрокультура - это культура, выделенная из: {

- ~крови
- ~мочи
- =испражнений
- ~гноя
- ~ликвора
- }

Биликультура - культура, выделенная из: {

- ~крови
- ~гноя
- =желчи
- ~испражнений
- ~мочи
- }

Сальмонеллы являются возбудителями: {

- ~дизентерии
- =брюшного тифа
- ~бруцеллеза
- ~колиэнтеритов
- ~холеры
- }

Энтеротоксигенные кишечные палочки вызывают у человека: {

- ~дизентерие подобное заболевание
- =холероподобную коли инфекцию
- ~колиэнтериты
- ~брюшной тиф
- ~паратифы
- }

Дифференциация свойств бактерий на среде Эндо основана на: {

- ~расщеплении глюкозы
- =расщеплении лактозы
- ~разложении пептона
- ~грамположительной и грамотрицательной окраске
- ~выявлении гемолитической активности

}

Колиэнтериты у детей вызывают кишечные палочки: {

- =энтеропатогенные
- ~энтеротоксигенные
- ~энтероинвазивные
- ~энтероадгезивные
- ~энтерогеморрагические

}

Для возбудителя брюшного тифа характерно: {

- =наличие жгутиков
- ~наличие зерен валютина
- ~наличие капсулы
- ~грамположительная окраска
- ~спорообразование

}

Серологическая диагностика брюшного тифа проводится путем постановки: {

- ~реакции Райта
- ~реакции Хеддльсона
- ~реакции Борде - Жангу
- =реакции Видаля
- ~реакции Манту

}

Источник инфекции при брюшном тифе: {

=больной человек
~крупный рогатый скот
~мелкий рогатый скот
~грызуны
~свиньи
}

Helicobacter pylori у человека вызывает поражение: {
~спинного мозга
=желудка и 12 перстной кишки
~почек
~щитовидной железы
~мочевого пузыря
}

Пищевые токсикоинфекции характеризуются: {
=коротким инкубационным периодом
~стойким иммунитетом после перенесенного заболевания
~хроническим течением
~длительным инкубационным периодом
~трансмиссивным путем заражения
}

Материалом для бактериологического исследования при сальмонеллезах служат: {
~спинномозговая жидкость
~мокрота
=испражнения
~мазок из зева
~мазок из влагалища
}

Представители рода шигелл характеризуются: {
~подвижностью
~наличием Vi и H-антигенов
~образованием капсулы в макроорганизме
=наличием - соматического антигена
~неспособностью расти на простых питательных средах
}

Шигеллы вызывают: {

- ~брюшной тиф
- =дизентерию
- ~холеру
- ~ревматизм
- ~гастроэнтерит

}

Шигеллез характеризуется поражением: {

- ~тонкого кишечника
- =толстого кишечника
- ~слизистой полости рта
- ~мочеполовых органов
- ~слизистой желудка

}

Дизентерия в настоящее время наиболее часто вызывается шигеллами: {

- ~%50%Флекснера
- ~%50%Зонне
- ~%-33.33333%Григорьева-Шига
- ~%-33.33333%Бойда
- ~%-33.33333%Видаля

}

Морфология кишечных палочек: {

- =мелкие палочки с закругленными концами
- ~капсулу образуют при росте на питательных средах
- ~имеют грамположительную окраску
- ~красятся по методу Нейссера
- ~имеют центральное расположение споры

}

Возбудитель холеры имеет форму: {

- ~кокковидную
- =извитую, виде запятой
- ~в виде палочки с обрубленными концами
- ~барабанной палочки
- ~веретенообразную

}

Холерный вибрион красится: {

~по Циллю - Нильсену
~по Морозову
=грамнегативно
~грамположительно
~по Гинсу
}

Резистентность возбудителя холеры: {
~быстро погибает при низкой температуре
=чувствителен к кислой среде желудочного сока
~сохраняется при кипячении
~устойчив к действию дезинфицирующих веществ
~в испражнениях больного мало устойчив
}

Холероген, синтезируемый холерным вибрионом относится к: {
=экзотоксинам
~эндотоксинам
~анатоксинам
~бактериоцинам
~бактериофагам
}

Для дифференциации энтеробактерий по способности ферментировать лактозу, используют среды: {
~%50%Левина
~%-33.33333% МПБ
~%-33.33333% Плоскирева
~%50%Эндо
~%-33.33333% МПА
}

Источником инфекции при холере является: {
=больной человек или бактерионоситель
~насекомые - переносчики
~крупный рогатый скот
~мелкий рогатый скот
~мыши
}

Возбудитель холеры агглютинируется: {

- =01 - сывороткой
- ~02 - сывороткой
- ~03 - сывороткой
- ~04 - сывороткой
- ~не агглютинируется сывороткой

}

Возбудитель брюшного тифа относится к роду: {

- ~Escherichia
- ~Bordetella
- =Salmonella
- ~Moraxella
- ~Neisseria

}

Иммунитет после перенесенного брюшного тифа: {

- ~искусственный пассивный
- ~искусственный активный
- ~видовой
- ~антитоксический
- =антибактериальный

}

Диагностика брюшного тифа в стадии реконвалесценции проводится путем бактериологического исследования: {

- ~крови
- ~гноя
- =испражнений
- ~мазка из зева
- ~желудочного сока

}

Бактериологическая диагностика холеры проводится путем: {

- ~исследования испражнений в реакции преципитации
- ~заражения белых мышей
- =посева исследуемого материала на щелочную пептонную воду
- ~микроскопии мазков крови
- ~постановки пробы манту

}

На среде Эндо выросли темно-красные колонии. Это свидетельствует о том,

что исследуемая культура: {
~ферментирует глюкозу
=ферментирует лактозу
~коагулирует плазму
~грамположительная
~грамотрицательная
}

Ингредиенты необходимые для постановки реакции Видаля: {
~%33.33333% брюшнотифозный о - диагностикум
~%33.33333% брюшнотифозный н - диагностикум
~%33.33333% эритроцитарный Vi-диагностикум
~%-50% комплемент
~%-50% гемолитическая сыворотка
}

Пути передачи кишечных инфекций: {
~вертикальный
=алиментарный
~половой
~воздушно-капельный
~трансмиссивный
}

К бактериальным кишечным инфекциям относятся: {
~%50% брюшной тиф
~%50% холера
~%-33.33333% туляремия
~%-33.33333% бруцеллез
~%-33.33333% дифтерия
}

Shigella flexneri вызывает заболевание: {
~острый гастроэнтерит у детей и взрослых
~эшерихиоз
~бруцеллез
~тифо-паратифозную инфекцию
=дизентерию
}

Для бактериологической диагностики брюшного тифа в

Качестве исследуемого материала используют: {

~%50%кровь

~%50%желчь

~%-33.33333% ликвор

~%-33.33333% слизь из носоглотки

~%-33.33333% моча

}

Для ускоренного обнаружения холерного вибриона используют: {

~%50%иммунофлюоресцентный метод

~%-33.33333% выделение биликультуры

~%-33.33333% серологический метод

~%-33.33333% аллергический метод

~%50%полимеразно-цепная реакция

}

Серовары холерного вибриона: {

~%50% Огава

~%50% Инаба

~%-33.33333% Бенгал

~%-33.33333% Эль-тор

~%-33.33333% Бюрне

}

Пути передачи холеры: {

~%50%водный

~%-33.33333% трансмиссивный

~%50% алиментарный

~%-33.33333% воздушно-капельный

~%-33.33333% воздушно-пылевой

}

Среди возбудителей кишечных инфекций, как правило, неподвижны: {

~эшерехии

~сальмонеллы

=шигеллы

~холерный вибрион

~протей

}

Коли-титр определяют: {

~методом бумажных дисков
=методом мембранных фильтров
~фаготипированием
~седиментационным методом
~хлорированием
}

Дифференциально-диагностической средой для эшерихий является среда: {
~Ру
~Леффлера
~Вильсон - Блера
=Эндо
~Кровяной Агар
}

Антибиотикорезистентность выделенной культуры шигелл определяют: {
~методом мембранных фильтров
~фаготипированием
=методом бумажных дисков
~РИФ
~ПЦР (полимеразно-цепная реакция)
}

Коли-титр – это: {
~количество особей *e.coli*, которое обнаруживается в 1 л воды
=наименьший объем воды, в котором обнаружена хотя бы одна особь *e.coli*
~наименьший объем воды, в котором обнаруживается до 10 особей *e.coli*
~количество особей *e.coli*, которое обнаруживается в 10 л воды
~количество особей *e.coli*, которое обнаруживается в 5 л воды
}

Коли - индекс – это: {
=количество кишечных палочек в 1 л воды
~количество всех микробов в 1 мл воды
~минимальное количество воды, в котором содержится 1 кишечная палочка
~количество кишечных палочек в 10 л воды
~количество энтеробактерий в 1мл воды
}

Для морфологии возбудителя холеры характерно: {

- ~грамположительная окраска
- ~терминальноерасположение спор
- ~образование капсулы в макроорганизме
- =извитая форма
- ~расположение в виде цепочки

}

Основной механизм передачи холеры: {

- ~аэрогенный
- ~кровяной
- ~вертикальный
- =фекально-оральный
- ~контактно-половой

}

Источники инфекции при холере: {

- =больные и бактерионосители
- ~насекомые-переносчики
- ~грызуны
- ~гидробионты
- ~крупный рогатый скот

}

Для изучения морфологии холерного вибриона применяют
Метод окраски по: {

- =Граму
- ~Нейссеру
- ~Цилю-Нильсену
- ~Ожешко
- ~Бурри-Гинсу

}

На среде эндо кишечная палочка образует: {

- ~бесцветные колонии с голубоватым оттенком
- ~колонии желтого цвета
- ~колонии с зоной гемолиза вокруг колоний
- =красные колонии с металлическим блеском
- ~синие колонии

}

Дизентериеподобные заболевания вызывают эшерихии: {

~энтеропатогенные
=энтероинвазивные
~энтеротоксигенные
~энтерогеморрагические
~парентеральные
}

Материалом для исследования при пищевых
Токсикоинфекциях являются: {
~%50%рвотные массы
~%50%остатки продуктов
~%-33.33333%ликвор
~%-33.33333%слизь из носоглотки
~%-33.33333%моча
}

Укажите возбудитель холеры: {
=Vibrio cholerae
~Vibrio parahaemolyticus
~Vibrio alginolyticus
~Vibrio vulnificus
~ Vibrio fluvialis
}

Укажите морфологические свойства холерного вибриона: : {
~грам+ неспорообразующие палочки
=грам- подвижные монотрихи в виде запятой
~грам+ спиралевидные бактерии
~ грам- коккобактерии
~ грам- перитрихи
}

Укажите фамилию ученого, открывшего возбудителя
классической холеры Vibrio cholerae: {
~Т. Эшерих
=Р. Кох
~Д. Сальмон
~А. Иерсен
~К. Шига
}

Екажите фамилию ученого, открывшего возбудитель холеры

Эль-тор *Vibrio eltor*: {
~Г. Гаффки
~К. Эберт
=Ф. Готшлих
~Г. Шотмюллер
~Э. Клебс
}

Элективной питательной средой для холерного вибриона является: {
~среда эндо
~среда плоскирева
~висмутсульфитный агар
= щелочной агар
~мясо-пептонный агар
}

Действием какого фактора патогенности *Vibrio cholerae*
Обусловлено обезвоживание организма при холере: {
~активной подвижностью вибриона
~адгезией вибриона
~пенетрацией
= экзотоксином-холерогеном
~эндотоксином
}

Укажите экспресс-метод диагностики холеры: {
~бактериоскопический
~бактериологический
~серологический
=иммунолюминисцентный
~аллергический
}

Укажите факторы патогенности холерного вибриона: {
~%33.33333% подвижность
~%33.33333% нейраминидаза
~%-50% плазмокоагулаза
~%33.33333% экзотоксин-холерогенп
~%-50%гиалуронидаза
}

Какой молекулярный механизм лежит в основе биологических эффектов холерогена: {
= активация аденилатциклазы
~инактивация белка G
~нарушение баланса ионов Na +
~угнетение образования ЦАМФ
~активация гуанилатциклазы
}

В городе А. вспышка заболевания, похожего на холеру. Укажите, что подлежит первоочередному бактериологическому исследованию: {
~пищевые продукты
=вода
~почва
~животные
~грызуны
}

Укажите признаки, соответствующие морфологии кампилобактерий: {
~%33.33333% Грамотрицательные
~%33.33333% Извитые
~%33.33333% Подвижные
~%-50% Образуют споры
~%-50% Капсул не образуют
}

Укажите тип дыхания кампилобактеров: {
~Аэробы
~Облигатные анаэробы
~Факультативные анаэробы
~Капнофилы
= Микроаэрофилы
}

Какой из указанных капсульных антигенов характерны для эшерихий: {
~%33.33333% А-Аг
~%33.33333% В-Аг
~%33.33333% L-Аг
~%-50% Vi-Аг
~%-50% М-Аг
}

Патогенные варианты эшерихий вызывают у людей: {

~ коли-бактериоз

= колиэнтерит

~коли-сепсис

~ кольпит

~дисбактериоз

}

Какой материал берется от больного для бактериологического исследования при колиэнтеритах (ОКЗ): {

~моча

~желчь

~гной

~кровь

=испражнения

}

Что характерно для коли-бактериозов: {

~%25%возникают на фоне иммунодефицита

~%25%сопровождаются снижением активности фагоцитоза

~%25%нарушается барьерная функция тканей

~%25%невосприимчивость не формируется

~%-100%формируется напряженный иммунитет

}

Укажите морфологические признаки, свойственные Эшерихиям: {

~крупные грамположительные палочки

~палочки, располагающиеся в цепочку

~палочки с центрально расположенной спорой

=грамотрицательные палочки

~извитые бактерии

}

Укажите назначение среды эндо в бактериологической диагностике кишечных инфекций: {

~среда накопления

~элективная среда

=дифференциально-диагностическая среда

~транспортная среда

~основная среда

}

Укажите морфологию колоний, образуемых кишечной палочкой на среде Эндо: {

~ сине-черные

~ белые с зоной гемолиза

= темно-красные с металлическим блеском

~ черные

~ шероховатые r-формы

}

Укажите биохимические свойства, служащие главным отличительным свойством эшерихий от патогенных энтеробактерий: {

~%50% расщепляют глюкозу до кислоты и газа

~%50% расщепляют лактозу до кислоты и газа

~%33.33333% образуют индол

~%33.33333% расщепляют маннит до кислоты и газа

~%33.33333% уреазоотрицательные

}

Отличительным свойством уropатогенных эшерихий является наличие: {

~ г-плазмид

= р-фимбрий

~ экзотоксина

~ эндотоксина

~ жгутиков

}

Перечислите факторы патогенности эшерихий: {

~%33.33333% фимбрии

~%33.33333% энтеротоксин

~%50% эксфолиатин

~%33.33333% гемолизин

~%50% лецитиназа

}

Укажите фамилию ученого, впервые выделившего кишечную палочку: {

~ Д. Сальмон

= Т. Эшерих

~ К. Шига

~ Э. Клебс

~ А. Иерсен

}

Укажите признаки, отличающие кишечную палочку от шигелл: {
~%25% характер роста на среде эндо
~%25% биохимические свойства
~%25% антигенная структура
~%25% подвижность
~%-100% морфология
}

В алгоритм идентификации кишечных палочек не входит: {
~определение морфологических свойств
~определение характера роста на среде эндо
~определение биохимических свойств
~реакция агглютинации с ОВ-коли-сыворотками
= определение Vi-антигена
}

Серологическую идентификацию патогенных эшерихий проводят с помощью: {
~ агглютинирующих поливалентных сальмонеллезных сывороток
= агглютинирующих ов-коли-сывороток
~агглютинирующих дизентерийных сывороток
~коли-протейного бактериофага
~ агглютинирующих моновалентных сальмонеллезных сывороток
}

Из посева испражнений больного кишечной инфекцией на среду эндо выросли бесцветные колонии, агглютинирующиеся смесью ОВ-коли-сывороток. Какой следующий шаг вы предпримете для верификации диагноза: {
= поставите р. агглютинации с типоспецифическими ов-коли- сыворотками
~ поставите аллергическую пробу
~ поставите р. преципитации
~ определите токсигенность культуры
~определите вирулентность культуры
}

Укажите микробы, являющиеся возбудителями бактериальной дизентерии: {
~%-100% *Salmonella enteritidis*
~%25% *Shigella dysenteriae*
~%25% *Shigella flexneri*
~%25% *Shigella boydii*
~%25% *Shigella sonnei*
}

Для каких из нижеуказанных энтеробактерий отсутствие жгутиков является родовым признаком: {

- ~ сальмонелл
- ~ эшерихий
- = шигелл
- ~иерсиний
- ~ протеев
- }

Эффективным этиотропным средством для лечения дизентерии являются: {

- ~ пенициллины
- = нитрофурановые препараты
- ~полиены
- ~ интерферон
- ~рифампицины
- }

Морфологические признаки, свойственные шигеллам: {

- ~%33.33333% палочки с закругленными концами
- ~%33.33333% грамотрицательные
- ~%33.33333% неподвижные
- ~%-50% капсул не образуют
- ~%-50% образуют цисты
- }

Внутриродовая классификация шигелл основана на: {

- ~ морфологических различиях видов
- ~ культуральных различиях
- ~токсинообразующей способности
- ~тинкториальных особенностях
- = антигенном строении
- }

Укажите морфологию колоний, образуемых шигеллами на средах Эндо, Левина, Плоскирева: {

- ~ фиолетовые
- ~розовые
- ~темно-красные с металлическим блеском
- = бесцветные
- ~шероховатые
- }

Какие биохимические свойства отличают *shigella sonne* от других шигелл: {

- ~ не расщепляют маннит
 - ~ сбраживают глюкозу до кислоты
 - = медленно на 3-5-й день сбраживают лактозу до кислоты без газа
 - ~ образуют индол
 - ~ сероводород не образуют
- }

В микробиологической диагностике дизентерии используются: {

- ~25% люминисцентная микроскопия
 - ~25% бактериологический метод
 - ~25% бактериоскопический метод
 - ~25% реакция непрямой агглютинации
 - ~100% реакция нейтрализации
- }

Специфическая профилактика дизентерии осуществляется с помощью: {

- ~ дизентерина
 - = поливалентного дизентерийного бактериофага
 - ~антитоксина
 - ~ анатоксина
 - ~коли-протейного фага
- }

Для лечения хронической дизентерии применяют: {

- ~антитоксическую сыворотку
 - ~специфический гамма-глобулин
 - ~ поливалентный бактериофаг
 - ~антимикробную сыворотку
 - = аутовакцину
- }

Схема кауфмана - уайта отражает антигенную структуру: {

- ~ эшерихий
 - ~клебсиелл
 - ~ протеев
 - = сальмонелл
 - ~ иерсиний
- }

Какие из указанных энтеробактерий имеют двухфазный Н - антиген: {
~эшерихии
= сальмонеллы
~иерсинии
~шигеллы
~клебсиеллы
}

Укажите возбудитель брюшного тифа: {
~ *Salmonella enteritidis*
~ *Salmonella typhimurium*
~ *Salmonella anatum*
~ *Salmonella infantis*
= *Salmonella typhi*
}

Материалом для бактериологического исследования при подозрении на брюшной тиф в 1-ю неделю заболевания является: {
~ испражнения
~ желчь
= кровь
~ моча
~ промывные воды кишечника
}

К факторам патогенности сальмонелл относятся: {
~ 33.33333% эндотоксин
~ 33.33333% энтеротоксин
~ 50% цитотоксин
~ 33.33333% способность к размножению в макрофагах
~ 50% гистотоксин
}

При брюшном тифе на 2-3 неделе заболевания бактериологически исследуются: {
~ 33.33333% желчь
~ 33.33333% кровь
~ 50% испражнения
~ 50% моча
~ 33.33333% промывные воды кишечника
}

Специфическая профилактика (вакцинация) какой кишечной инфекции разработана и входит в систему противозидемических мероприятий: {

- ~ дизентерии
 - ~ колиэнтеритов
 - = брюшного тифа
 - ~ иерсиниоза
 - ~ сальмонеллеза
- }

Человек, в прошлом перенесший брюшной тиф, хочет работать в пищеблоке. Какие исследования необходимо провести для того, чтобы допустить его к работе: {

- = выделить копрокультуру и поставить р. Vi-гемагглютинации
 - ~ выделить копрокультуру и поставить р. Нейтрализации
 - ~ выделить гемокультуру
 - ~ взять смыв из носоглотки
 - ~ выделить уринокультуру
- }

Возбудители бактериальной дизентерии: {

- ~ аэробы
 - ~ микроаэрофилы
 - ~ психрофилы
 - = не требовательны к питательным средам
 - ~ нуждаются в дополнительных факторах роста
- }

ЭПКП вызывают: {

- ~ поражения толстого кишечника
 - = поражения тонкого кишечника
 - ~ диарею инвазивного типа
 - ~ токсинемию
 - ~ септицемию
- }

Возбудители бактериальной дизентерии относятся к роду: {

- ~ Escherichia
 - = Shigella
 - ~ Salmonella
 - ~ Yersinia
 - ~ Klebsiella
- }

Возбудители бактериальной дизентерии: {

~коккобактерии

~ грамположительны

= грамотрицательны

~образуют споры

~ подвижны

}

Элективные среды для выделения возбудителей бактериальной дизентерии: {

~ ЖСА, КА

= Плоскирева, Эндо

~ Сывороточный агар

~ Шоколадный агар

~ Висмут-сульфит агар

}

Возбудители бактериальной дизентерии: {

~ представители нормальной микрофлоры человека

~ условно-патогенные микроорганизмы

= патогенные микроорганизмы

~ возбудители оппортунистических инфекций

~ сапрофитические микроорганизмы

}

Антиген возбудителей бактериальной дизентерии: {

~ жгутиковый

~ протективный

~ капсульный

= соматический о-антиген

~ суперантиген

}

Пути передачи при бактериальной дизентерии: {

~ воздушно-пылевой

= алиментарный, контактный

~ трансплацентарный, половой

~ трансмиссивный

~ воздушно-капельный

}

Исследуемый материал при бактериологической диагностике бактериальной дизентерии: {
= испражнения
~ кровь
~ ликвор
~ моча
~ сыворотка крови
}

Дизентерин: {
~ анатоксин
~ вакцина
~ эндотоксин
= аллерген
~ иммуномодулятор
}

Исследуемый материал при бактериологической диагностике бактериальной дизентерии: {
= испражнения
~ кровь
~ ликвор
~ моча
~ сыворотка крови
}

Возбудители брюшного тифа, паратифов а и в относятся к роду:
~ *Yersinia*
~ *Escherichia*
~ *Citrobacter*
= *Salmonella*
~ *Shigella*

Возбудителей брюшного тифа, паратифов а и в дифференцируют по: {
~ морфологии, окраске по граму
~ культуральным, биохимическим свойствам
= биохимическим, антигенным свойствам
~ антигенным, вирулентным свойствам
~ устойчивости во внешней среде
}

Источники инфекции при брюшном тифе, паратифах а и в: {

~ пищевые продукты, вода

= больные люди, бактерионосители

~ синантропные грызуны

~ природные грызуны

~ перелетные птицы

}

Пути передачи возбудителей брюшного тифа, паратифов а и в: {

= алиментарный, контактный

~ трансплацентарный, половой

~воздушно-капельный

~ воздушно-пылевой д

~трасмиссивный

}

Методы микробиологической диагностики брюшного тифа, паратифов а и в:

{

~ микроскопический, бактериологический

= бактериологический, серологический

~серологический, аллергический

~аллергический, генетический

~не разработана

}

Исследуемый материал при подозрении на брюшной тиф на первой неделе заболевания: {

= кровь

~ желчь

~испражнения

~костный мозг

~моча

}

Время выдачи ответа из бак.лаборатории при выделении гемокультуры возбудителя брюшного тифа: {

~ на 3-4-й день

~ на 4-5-й день

~ на 5-6-й день

= на 7-10-й день

~на 14-16-й день

}

Выделение гемокультуры при бактериологической диагностике брюшного тифа включает: {

- ~ микроскопию препарата из крови
 - = посев крови на желчный бульон 1:5
 - ~ посев крови на желчный бульон 1:10
 - ~ посев крови на висмут-сульфит агар
 - ~ исследование парных сывороток
- }

Арбитражным методом микробиологической диагностики бактерионосительства *S. typhi* является выделение: {

- ~ гемокультуры
 - = биликультуры
 - ~ копрокультуры
 - ~ уринокультуры
 - ~ миелокультуры
- }

О бактерионосительстве *S. typhi* свидетельствуют: {

- ~ IgA
 - ~ IgE
 - ~ IgD
 - ~ IgM
 - = IgG
- }

Для «инфекционного» видаля характерно: {

- ~ снижение титра специфических антител при исследовании парных сывороток
 - = нарастание титра специфических антител при исследовании парных сывороток
 - ~ наличие только IgG
 - ~ наличие только Ig M
 - ~ РА положительна с 1-го дня заболевания
- }

Для «анамнестического» видаля характерно: {

- ~ нарастание титра специфических антител при исследовании парных сывороток
 - = отсутствие нарастания титра специфических антител при исследовании парных сывороток
 - ~ наличие только Ig M
 - ~ наличие Ig M, IgG
 - ~ наличие Ig M, IgG, IgA
- }

Для «прививочного» видаля характерно: {

- ~ ра положительна у больных
 - ~ ра положительна у переболевших
 - = ра положительна у вакцинированных
 - ~ ра положительна у новорожденных
 - ~ ра положительна у подростков
- }

Специфическая терапия брюшного тифа, паратифов А и В: {

- ~антибиотики
 - ~ аутовакцина
 - ~иммуноглобулин
 - = бактериофаг
 - ~анатоксин
- }

Источник инфекции при сальмонеллезных пищевых токсикоинфекциях: {

- ~ больные люди
 - ~ бактерионосители
 - ~ пищевые продукты
 - ~ вода
 - = больные животные
- }

Возбудители при сальмонеллезных пищевых токсикоинфекциях
накапливаются в: {

- ~ тонком кишечнике
 - ~толстом кишечнике
 - ~ желчном пузыре
 - = готовом блюде
 - ~инфицированной воде
- }

Методы микробиологической диагностики сальмонеллезных пищевых
токсикоинфекций: {

- ~ микроскопический, экспресс-диагностика (РИФ)
 - = бактериологический, серологический
 - ~серологический, аллергический
 - ~ аллергический, генетический
 - ~ не проводится
- }

Время выдачи ответа из баклаборатории при выделении копрокультуры возбудителя сальмонеллезных пищевых токсикоинфекций: {

~ на 3-4-й день

= на 4-5-й день

~ на 5-6-й день

~ на 7-10-й день

~ на 14-16-й день

}

Отличительная особенность сальмонелл – возбудителей пищевых токсикоинфекций: {

~ ферментация лактозы

~ образование экзотоксина

~ психрофильность

= основной резервуар - животные

~ основной резервуар – человек

}

При сальмонеллезных пищевых токсикоинфекциях получение положительных результатов наиболее вероятно при исследовании: {

~ крови

~ желчи

= испражнений

~ мочи

~ ликвора

}

Холерный вибрион длительно сохраняется: {

~ в почве

= в водоемах

~ в грызунах

~ под прямыми солнечными лучами

~ в 1% соляной кислоте

}

При холере поражаются: {

~ суставы

~ желудок

~ печень, селезенка

= тонкий кишечник

~ толстый кишечник

}

Холерный вибрион относится к: {
~облигатным анаэробам
=факультативным анаэробам
~облигатным аэробам
~микроаэрофилам
~капнофилам
}

При исследовании на бактерионосительство холерного вибриона материал из прямой кишки забирают: {
~пинцетом
~бактериологической петлей
=ректальной петлей
~руками
~шпателем Дригальского
}

В настоящее время пандемию холеры определяет: {
~биовар Cholerae
=биовар Eltor
~серовар Бенгал
~всеобщее потепление
~социально-экономическое положение
}

Фекальные массы при холере представляют собой: {
~обычный кал
=«рисовый» отвар
~меконий
~выделения, содержащие слизь и кровь
~прозрачную жидкость
}

При окрашивании по граму холерный вибрион: {
~окрашивается грамположительно
=окрашивается грамотрицательно
~не окрашивается обычными красителями
~окрашивается биполярно
~окрашивается в зеленый цвет
}

На щелочной пептонной воде холерный вибрион дает видимый невооруженным взглядом рост: {

~ через 20 мин

= через 4-6 ч

~ через 9-12 ч

~ через 24 ч

~ через 48 ч

}

Холерный вибрион относится к: {

~ облигатным анаэробам

= факультативным анаэробам

~ облигатным аэробам

~ микроаэрофилам

~ капнофилам

}

У холерного вибриона выделяют биовары: {

~эльтор, тифи

~гикошима, бенгал

~ огава, эльтор

= эльтор, холера

~ кавказика, алтаика

}

По морфологии возбудитель холеры относится к: {

~ коккам

~ бациллам

= вибрионам

~ овоидам

~ спириллам

}

Оптимум температуры для культивирования холерного вибриона: {

~ 28° C

~ 30° C

= 37° C

~ 40° C

~ 56° C

}

Путь передачи холерного вибриона: {
~воздушно-капельный
= алиментарный
~ половой
~трансплацентарный
~ трансмиссивный
}

В природе холерой болеют: {
~ домашний крупный рогатый скот
~ пресмыкающиеся, земноводные
= только люди
~млекопитающиеся, люди
~ птицы
}

Схема исследования на холеру основана на способности вибриона: {
=опережать рост сопутствующей флоры и расти на щелочных питательных средах
~расти в дистиллированной воде
~расти на кислых питательных средах
~расти на плотных питательных средах в течении месяца
~ расти на питательных средах с добавлением фенола
}

Правила забора и доставки испражнений при холере: {
~на фоне антибиотикотерапии
= доставка не позднее 3-х суток
~ до начала антибиотикотерапии
~ после приема пищи
~ забор после чистки зубов
}

Холерный вибрион: {
~образует капсулу
~ образует спору
= активно подвижен
~ неподвижен
~устойчив в воздушной среде
}

Холерный вибрион был выделен в чистой культуре: {
~ Э. Дженнером
= Р. Кохом
~ Л. Пастером
~ Л. А. Зильбером
~ З. В. Ермольевой
}

Холера относится к: {
~ эндемичным инфекциям
= особо опасным инфекциям
~ инфекциям, не представляющим особой опасности
~ зоонозным инфекциям
~ трансмиссивным инфекциям
}

Методы экспресс-диагностики при холере: {
~ посев на щелочной агар
~ риф с выделенной культурой
= риф с испражнениями обследуемого
~ заражение лабораторных животных
~ рнга с сывороткой обследуемого
}

В европе холера известна: {
~ со времен древнего рима
~ со средневековья
= с начала XIX века
~ с конца XIX века
~ с начала XX век
}

Во время вспышек холеры больных содержат: {
~ дома
= в специализированных госпиталях
~ в обычных инфекционных отделениях
~ лечат амбулаторно в поликлиниках
~ не изолируют
}