

Зоонозы - заболевания, при которых источник инфекции: {

=больные животные

~больной человек

~реконвалесцент

~бактерионоситель

~рептилии

}

Бактерии, образующие капсулу только в организме

Человека или животных: {

~кишечная палочка

=палочка сибирской язвы

~клебсиелла

~шигелла

~сальмонелла

}

Возбудитель сибирской язвы по морфологическим

Свойствам представляет собой: {

=стрептобациллы

~стрептококки

~микобактерии

~микоплазмы

~монококки

}

К зоонозам относятся: {

~сифилис

~дифтерия

~брюшной тиф

~скарлатина

=туляремия

}

Гиперчувствительность замедленного типа при

Бруцеллезе выявляется с помощью пробы: {

~манту

~пирке

=бюрне

~шика

~дика

}

Для обнаружения сибиреязвенного антигена

Применяется реакция: {

~видаля

~райта

~хеддльсона

=асколи

~кумбса

}

Для специфической профилактики сибирской язвы

Применяется вакцина: {

~акдс

~бцж

~солка

~сэбина

=сти

}

Возбудитель чумы морфологически представляет собой: {

=биполярно окрашенные грамотрицательные, неподвижные, мелкие палочки

Округлой формы

~грамположительные кокки, расположенные в виде цепочки

~грамположительные палочки с закругленными концами

~грамотрицательные подвижные палочки, не образующие спор и капсул

~грамположительные палочки, не образующие спор

}

Бруцеллез у человека вызывают: {

~%33.33333%b.melitensis

~%-100%b.neotomae

~%33.33333%b.suis

~%-100%b. Ovis

~%-100%b. Canis

}

Для серодиагностики бруцеллеза применяется реакция: {

~асколи

~видаля

=райта

~вассермана

~термопреципитации

}

Источником туляремии являются: {

~больные в инкубационном периоде

- ~больные в периоде разгара болезни
- ~бактерионосители
- ~реконвалесценты
- =больные животные
- }

Возбудители туляремии относятся к роду: {

- ~jersinia
- ~neisseria
- ~bacillus
- ~corynebacterium
- =francisella
- }

Человек является биологическим тупиком (не является Источником инфекции для окружающих людей): {

- ~чума
- ~коклюш
- =бруцеллез
- ~полиомиелит
- ~возвратный тиф
- }

Для создания невосприимчивости к чуме применяют: {

- ~убитую корпускулярную вакцину
- =живую аттенуированную (штамм ev) вакцину
- ~бцж
- ~анатоксин
- ~антитоксическую сыворотку
- }

Кожно-аллергический метод используют для Диагностики: {

- ~стафилококковой инфекции
- ~холеры
- ~сифилиса
- ~брюшного тифа
- =туляремии
- }

Среди возбудителей особоопасных зоонозных инфекций Грамположительными палочками являются: {

- ~бруцеллы
- =бациллы сибирской язвы
- ~чумные палочки

- ~бактерии туляремии
- ~холерные вибрионы

}

Из перечисленных возбудителей особоопасных
Инфекций к образованию спор способны: {
=бациллы сибирской язвы
~палочки чумы
~бактерии туляремии
~бруцеллы
~холерный вибрион

}

Источник инфекции при туляремии: {
~больной человек
~бактерионоситель
=полевые мыши
~крупный рогатый скот
~медицинский персонал

}

Реакция асколи применяется для обнаружения антигена
При: {
=сибирской язве
~чуме
~туляремии
~бруцеллезе
~брюшном тифе

}

Реакция агглютинации райта применяется для
Диагностики: {
~сибирской язвы
=бруцеллеза
~чумы
~туляремии
~дизентерии

}

Бруцеллез у человека могут вызывать: {
~%100%brucella canis
~%33.33333%brucella abortus
~%100%brucella ovis
~%100%brucella neotomae
~%33.33333%brucellamelitensis

}

В реакции Райта при бруцеллезе выявляют: {

~антитоксины

~лизины

~комплемента - связывающие антитела

=агглютинины

~преципитины

}

Возбудитель сибирской язвы характеризуется: {

~извитой формой

~наличием жгутиков

=образованием спор

~образованием экзотоксина

~грамотрицательной окраской

}

Бруцеллы характеризуются: {

~извитой формой

~спорообразованием

=грамотрицательной окраской

~грамположительной окраской

~спорообразованием

}

Для серологической диагностики бруцеллеза применяют: {

~реакцию агглютинации Видаля

~реакцию Вассермана

~реакцию Асcoli

=реакцию Хеддльсона

~реакцию Манту

}

Для аллергической диагностики бруцеллеза применяют

Пробу: {

~манту

~пирке

=бюрне

~френкеля

~шика

}

Клиническая форма сибирской язвы, которая дает более

благоприятный исход: {

- ~кишечная
- ~легочная
- =кожная
- ~септическая
- ~менингоэнцефалит
- }

Чумные бактерии характеризуются: {

- ~шаровидной формой
- ~образованием спор
- =биполярной окраской
- ~грамположительной окраской
- ~подвижностью
- }

Чума относится к заболеваниям: {

- ~%33.33333%особоопасным
- ~%-50%протозойным
- ~%33.33333%карантинным
- ~%-100%грибковым
- ~%-100%вирусным
- }

Для ускоренной диагностики чумы используют: {

- ~реакцию агглютинации
- ~посев по способу шукевича
- ~биологическую пробу
- =прямой иммунофлюоресцентный метод
- ~непрямой иммунофлюоресцентный метод
- }

Возбудитель туляремии: {

- ~крупные грамположительные палочки
- ~грамотрицательные кокки
- =грамотрицательные коккобактерии
- ~спорообразующие бактерии
- ~вибрионы с выраженной подвижностью
- }

Внутрикожная проба бюрне применяется для

Аллергодиагностики: {

- ~чумы
- ~туляремии
- =бруцеллеза
- ~сибирской язвы

~туберкулеза
}

Вакцину сти применяют для специфической
Профилактики: {
~бруцеллеза
~чумы
=сибирской язвы
~туляремии
~холеры
}

Кожно-аллергический метод используется для диагностики: {
%50%бруцеллеза
~%-100%брюшного тифа
%50%туляремии
~%-100%ботулизма
~%-100%холеры
}

Для культивирования bac.anthraxis используются среды: {
=мпа, мпб
~эндо
~плоскирева
~левина
~левенштейна-йенсена
}

Основные пути заражения при бруцеллезе: {
~трансмиссивный
~половой
=алиментарный
~воздушно-капельный
~воздушно-пылевой
}

Возбудитель чумы относится к роду: {
~francisella
~bordetella
~salmonella
=yersinia
~shigella
}

Возбудители, размеры которых находятся на пределе

Разрешающей способности светового микроскопа: {

~у. Pestis

=f. Tularensis

~bac. Anthracis

~e. Coli

~m. Tuberculosis

}

В бактериологических лабораториях обычного режима для диагностики

туляремии используют метод: {

~%-100%бактериоскопический

~%-100%бактериологический

~%-100%биологический

%50%серологический

%50%аллергический

}

При остром бруцеллезе чаще всего удается выделить

Возбудителя из: {

~мокроты

~ликвора

=крови

~гноя

~пунктата костного мозга

}

Реакция агглютинации райта применяется для

Диагностики: {

~туляремии

~чумы

=бруцеллеза

~сибирской язвы

~холеры

}

Кожно-аллергическая реакция для диагностики бруцеллеза: {

~манту

~реакция пирке

~цверкалова

~митсуда

=бюрне

}

Реакция хеддльсона применяется для диагностики: {

=бруцеллеза

- ~туляремии
- ~сибирской язвы
- ~чумы
- ~холеры

}

К карантинным (конвенционным) заболеваниям относятся: {

- =чума
- ~бруцеллез
- ~брюшной тиф
- ~дифтерия
- ~дизентерия

}

Бруцеллы наиболее вирулентные для человека: {

- ~%33.33333%br. Abortus
- %33.33333%br. Melitensis
- ~%-100%br. Ovis
- ~%-100%br. Neotomae
- ~%-100%br. Canis

}

Возбудителями особоопасных инфекций являются: {

- =*Yersinia pestis*
- ~*Mycobacterium tuberculosis*
- ~*Staphylococcus aureus*
- ~*Clostridium tetani*
- ~*Salmonella typhi*

}

Споры располагаются центрально у возбудителей: {

- ~столбняка
- ~газовой гангрены
- =сибирской язвы
- ~ботулизма
- ~дифтерии

}

Микробиологическая диагностика трансмиссивных инфекций

К риккетсиозам относятся: {

=сыпной тиф

~брюшной тиф

~возвратный тиф

~паратиф а

~паратиф в

}

Риккетсии провачека образуют: {

~экзотоксин

=эндотоксин

~споры

~капсулу

~анатоксин

}

Возбудителями эпидемического сыпного тифа являются: {

~гонококк

~стафилококк

=риккетсии провачека

~риккетсии музера

~риккетсии бернетта

}

Риккетсии окрашиваются по: {

~бурри - гинсу

~бурри

~простым методом

~нейссеру

=романовскому – гимзе

}

Механизмы передачи инфекции при сыпной тифе: {

=кровяной

~фекально-оральный

~аэрогенный

~контактный

~вертикальный

}

Переносчиками эпидемического сыпного тифа являются: {

=вши

~комары

~мухи

- ~клещи
- ~собаки
- }

Сыпной тиф относится к инфекциям передающимся путем: {

- =трансмиссивным
- ~алиментарным
- ~воздушно-капельным
- ~воздушно-пылевой
- ~вертикальным
- }

Переносчиками эндемического сыпного тифа являются: {

- ~комары
- ~грызуны
- =клещи
- ~больные животные
- ~больной человек
- }

Риккетсии бернета вызывают: {

- ~эпидемический сыпной тиф
- ~эндемический сыпной тиф
- =ку - лихорадку
- ~марсельскую лихорадку
- ~желтушную лихорадку
- }

Специфическая профилактика сыпного тифа проводится: {

- ~анатоксином
- ~антитоксической сывороткой
- =живой вакциной
- ~антирабической вакциной
- ~интерфероном
- }

Риккетсии относятся к: {

- =бактериям
- ~спирохетам
- ~актиномицетам
- ~хламидиям
- ~простейшим
- }

Источником инфекции при эпидемическом сыпном тифе

Являются: {
~больные животные
=больной человек
~бактерионоситель
~вирусоноситель
~комары
}

Для культивирования риккетсий бернета используют: {
~искусственные питательные среды
~мпа
=куриные эмбрионы
~среду эндо
~среду сабура
}

Риккетсии бернета проявляют тропизм к: {
~центральной нервной системе
~иммунной системе
=легочной ткани
~желудочно - кишечному тракту
~лимфатическим сосудам
}

Возбудитель эндемического сыпного тифа: {
~r. Prowazekii
=r. Typhi
~r. Conorii
~r. Sibirica
~r. Burneti
}

Болезнь брилла - цинссера является результатом: {
~повторного инфицирования риккетсиями
~эндогенного рецидива эпидемического сыпного тифа
~суперинфекции
=рецидива эндемического сыпного тифа
~рецидива ку-лихорадки
}

Возбудитель ку-лихорадки: {
~сальмонеллы
~риккетсия провачека
~риккетсия музера
=риккетсия бернета

~риккетсия конори
}

Рецидив эпидемического сыпного тифа называется: {

~ку-лихорадка
~эндемический сыпной тиф
=болезнь брилля - цинссера
~лихорадка цуцугамуши
~желтая лихорадка
}

К патогенным спирохетам относятся: {

~кишечная палочка
~сальмонелла
=бледная трепонема
~пневмококки
~актиномицеты
}

Возбудитель сифилиса относится к роду: {

=treponema
~staphylococcus
~streptococcus
~escherichia
~salmonella
}

Трепонемы: {

=подвижны
~не подвижны
~образуют споры
~растут на простых питательных средах
~образуют капсулу
}

Treponema pallidum по романовскому - гимзе

Окрашивается в цвет: {

~синий
~голубой
=бледно - розовый
~красный
~зеленый
}

Источником инфекции при сифилисе являются: {

=больной человек
~вирусоноситель
~бактерионоситель
~животные
~насекомые
}

Основной путь заражения сифилисом: {
~алиментарный
~воздушно - капельный
=половой
~трансмиссивный
~водный
}

Иммунитет при сифилисе: {
~стерильный
=нестерильный
~антитоксический
~врожденный
~антипаразитарный
}

Для диагностики сифилиса применяется реакция: {
~борде - жангу
~видаля
~асколи
=вассермана
~дика
}

Возбудитель возвратного тифа относится к роду: {
~трепонема
=боррелия
~лептоспира
~сальмонелла
~эшерихия
}

Материалом микробиологического исследования при
Возвратном тифе является: {
~ликвор
=кровь
~гной
~мокрота

~испражнения

}

Эпидемический возвратный тиф передается: {

~клопами

=вшами

~клещами

~комарами

~блохами

}

Материал исследования при первичном сифилисе: {

~кровь

~ликвор

=содержимое твердого шанкра

~содержимое мягкого шанкра

~испражнения

}

Возбудитель эпидемического возвратного тифа был открыт: {

~кохом

~пастером

=обермейером

~ивановским

~мечниковым

}

Боррелии: {

~образуют экзотоксин

=образуют эндотоксин

~неподвижны

~образуют споры

~образуют капсулу

}

Специфическая профилактика сифилиса: {

~разработана

=не разработана

~вакцина живая

~бцж

~специфическая иммунная сыворотка

}

Лечение возвратного тифа проводят: {

~анатоксином

~антитоксической сывороткой

~вакциной
=антибиотиками
~бактериофагом
}

Для лечения сифилиса используют: {
~анатоксин
=антибиотики
~лечебную сыворотку
~иммуноглобулин
~вакцину
}

Эндемический возвратный тиф: {
=природно - очаговая инфекция
~кишечная инфекция
~особоопасная инфекция
~протозойная инфекция
~вирусная инфекция
}

Лептоспиры относятся к: {
=спирохетам
~бактериям
~грибам
~вирусам
~актиномицетам
}

Основной источник инфекции при лептоспирозе: {
~больной человек
=животные
~клещи
~вши
~блохи
}

Для специфической профилактики лептоспироза
Применяют: {
~гаммаглобулин
~антибиотики
=убитую вакцину
~бактериофаг
~специфические сыворотки
}

Лептоспиры вызывают: {

~возвратный тиф

~сыпной тиф

=инфекционную желтуху (болезнь васильева - вейля)

~актиномикоз

~кандидоз

}

К боррелиозам относятся: {

~сифилис

~сыпной тиф

=болезнь лайма

~фрамбезия

~лептоспироз

}

Риккетсии являются: {

=внутриклеточными паразитами

~сапрофитами

~аутотрофами

~гетеротрофами

~вирусами

}

Риккетсии размножаются: {

~на искусственных питательных средах

~на среде эндо

=внутриклеточно, поперечным делением

~на мпа

~на среде левина

}

Риккетсии являются возбудителями: {

~туберкулеза

~дифтерии

~дизентерии

~брюшного тифа

=сыпного тифа

}

Риккетсии культивируют: {

=в курином эмбрионе

~на простых питательных средах

~на дифференциально-диагностических питательных средах

- ~в анаэробных
- ~в среде 199

}

Внеклеточная форма хламидий называется: {

- ~зерна воллютина
- ~зерна муха
- ~липидные включения
- =элементарные тельца
- ~I - форма

}

Хламидии являются возбудителями: {

- ~сыпного тифа
- =трахомы
- ~гонореи
- ~сифилиса
- ~лептоспироза

}

Хламидии: {

- ~хорошо растут на питательных средах
- =являются внутриклеточными паразитами
- ~грамположительные
- ~образуют споры
- ~не имеют клеточной стенки

}

Микоплазмы: {

- ~образуют споры
- ~грамположительные
- ~не растут на искусственных питательных средах
- =не имеют клеточной стенки
- ~имеют капсулу

}

Микоплазмы могут быть возбудителями: {

- ~кори
- ~гриппа
- =пневмонии
- ~ку-лихорадки
- ~дифтерии

}

Спирохеты: {

- =имеют спиралевидную форму
- ~не подвижны
- ~грамположительные
- ~относятся к эукариотам
- ~образуют споры
- }

Спирохеты окрашиваются: {

- ~по циллю - нильсену
- ~по здродовскому
- ~по нейссеру
- =по романовскому - гимзе
- ~по гинсу

}

Спирохеты вызывают: {

- ~хламидиоз
- ~токсоплазмоз
- =лептоспироз
- ~орнитоз
- ~актиномикоз

}

Возбудитель сифилиса имеет: {

- ~редкие глубокие завитки
- =равномерные мелкие завитки
- ~форму наподобие буквы s
- ~мицелий
- ~споры

}

Спирохеты являются возбудителями: {

- ~фурункулеза
- ~туберкулеза
- =лептоспироза
- ~кандидоза
- ~токсоплазмоза

}

Риккетсии характеризуются: {

- ~постоянством формы
- ~положительной окраской по граму
- =внутриклеточным паразитизмом
- ~отсутствием днк
- ~наличием спор

}

Для окраски риккетсий применяют метод: {

- ~ожешки
 - ~циля-нильсена
 - =здродовского
 - ~бурри
 - ~нейссера
- }

Извитые формы бактерий: {

- ~стрептококки
 - ~стафилококки
 - =спириллы
 - ~эшерихии
 - ~кlostридии
- }

Методы микробиологической диагностики микоплазмозов / уреаплазмозов все, кроме: {

- ~генодиагностики
 - ~серологического
 - ~бактериологического
 - = аллергического
 - ~микроскопического
 - ~лецитиназная активность
 - ~положительная биопроба на животных
 - ~гемолитическая активность
- }

Для биологии микоплазм / уреаплазм характерно все кроме: {

- ~размножение бинарным делением
 - = специфический жизненный цикл
 - ~потребность в стероидах
 - ~отсутствие клеточной стенки
 - ~мембранный паразитизм.
- }

Возбудители микоплазмозов / уреаплазмозов все, кроме: {

- ~m.hominis
 - ~m.pneumoniae
 - ~m.urealyticum
 - ~m.fermentans
 - = m.tuberculosis
- }

Исследуемый материал при урогенетальном хламидиозе: {

- ~моча
- ~ликвор
- ~мазок из уретры, цервикального канала
- = соскоб из уретры, цервикального канала
- ~мокрота
- }

Для риккетсий и хламидий характерны: {

- = абсолютный внутриклеточный паразитизм
- ~наличие днк или рнк
- ~размножение в соответствии с генетической информацией клетки-хозяина
- ~отсутствие клеточной организации
- ~неспособность к формированию лекарственной устойчивости

}

профилактика трахомы: {

- ~плановая вакцинация
- ~вакцинация по эпид. Показаниям
- = своевременное выявление и лечение больных и соблюдение правил личной гигиены при контакте с ними
- ~полноценное питание
- ~использование контрацептивов

}

chlamydomphila pneumoniae: {

- = возбудитель атипичной пневмонии
- ~частая причина бесплодия, внематочной беременности
- ~хорошо культивируется in vitro
- ~патогенна для человека и животных
- ~индуцирует напряженный иммунитет

}

Для специфической профилактики риккетсиозов используют: {

- ~иммуноглобулины
- ~антибиотики
- ~борьбу с педикулезом
- ~дератизацию
- = вакцины

}

Материал для выделения риккетсиозов: {

- ~содержимое элементов сыпи
- ~спинномозговая жидкость
- = кровь
- ~сыворотка

~испражнения

}

Твердый шанкр представляет собой: {

~место локализации входных ворот инфекции;

=место первичного размножения трепонем;

~проявление генерализованной инфекции;

~результат действия бактериальных токсинов;

~очаг неспецифического гранулематозного воспаления