

Спорами размножаются: {

~простейшие

~бактерии

~вирусы

=грибы

~хламидии

}

Половой цикл развития токсоплазм с образованием

Ооцист происходит в кишечнике: {

~птиц

~человека

=кошек

~собак

~мышей

}

К какому классу простейших относятся токсоплазмы: {

~жгутиконосцам

~реснитчатым

=споровикам

~амебам

~саркодовым

}

Токсоплазма имеет форму: {

~кокковидную

~палочковидную

=полумесяца

~спиралевидную

~нитевидную

}

Вертикальный (трансплацентарный) путь передачи возможен при: {

~лямблиозе

~лейшманиозе

=токсоплазмозе

~трихомониазе

~амебиазе

}

К противогрибковым антибиотикам относятся: {

~фуразолидон

~оксациллин
=леворин
~стрептоцид
~фарингосепт
}

Мицелий грибов представляет собой: {
~скопление хламидоспор
=скопления гиф
~конидии
~спорангии
~скопление ядер
}

Образование цист характерно для: {
~бактерий
=простейших
~вирусов
~риккетсий
~грибов
}

Спорами размножаются: {
~простейшие
~бактерии
~вирусы
=грибы
~хламидии
}

Для окраски простейших используют способ: {
~Циля - нильсена
~Ожешко
=Романовского - Гимзе
~Нейссера
~Гинса
}

Метод окраски препарата толстой капли крови по Романовскому - Гимзе применяют для диагностики: {
=малярии
~брюшного тифа
~туберкулеза
~дифтерии
~коклюша

}

Простейшие: {

~относятся к прокариотам

~имеют нуклеоид

=относятся к эукариотам

~не имеют ядерную мембрану

~не имеют клеточного строения

}

Нитчатый гриб, образующий эндоспоры: {

~аспергилл

~пеницилл

~дрожжи

=мукор

~кандида

}

К дрожжеподобным грибам относятся: {

~дрожжи

~мукор

=кандида

~аспергилл

~пеницилл

}

Дрожжеподобные грибы candida: {

~многоклеточные микроорганизмы

~размножаются экзоспорами

=размножаются почкованием

~не имеют оболочки

~не имеют ядра

}

Для лечения грибковых инфекций используют антибиотики: {

~беталактамы антибиотики

~тетрациклины

~рифамицины

=полиеновые антибиотики

~макролиды

}

Мицелий представляет собой: {

~эндоспоры

~экзоспоры

- =переплетение гиф
- ~споры с плотной двойной оболочкой
- ~конидии

}

Эндоспоры это: {

- =споры, созревающие внутри спорангия
- ~споры, созревающие без ограничительной оболочки
- ~споры с плотной двойной оболочкой
- ~споры, развивающиеся на вегетативном мицелии
- ~споры, формирующиеся за счет фрагментации гиф

}

Экзоспоры это : {

- ~%-33.33333%споры, созревающие внутри спорангия
- ~%50%споры, не ограниченные оболочкой
- ~%50%конидии
- ~%-33.33333%споры, созревающие в сумке (аске)
- ~%-33.33333%споры, имеющие жгутики

}

Конидии это все кроме: {

- ~на них формируются экзоспоры
- =на них формируются эндоспоры
- ~образования на стеригмах
- ~одноклеточные
- ~многоклеточные

}

Таллоспоры развиваются на: {

- ~спорангиеносцах
- ~конидиофорах
- ~репродуктивном мицелии
- =вегетативном мицелии
- ~базидиях

}

Аскоспоры развиваются: {

- ~ на стеригмах
- ~внутри спорангиев
- =при половом способе размножения в сумках
- ~ при бесполом способе размножения
- ~на конидиофорах

}

Дерматомикозы принадлежат группе: {
~системных, глубоких микозов
=эпидермомикозов
~подкожных, субкутанных микозов
~поверхностных микозов
~актиномикозов
}

К возбудителям эпидермомикозов относят все кроме: {
~eidermophyton
~microsporum
~trichophyton
~keratomyces
=coccidioides
}

Антигены дерматофитов связаны с: {
~жгутиками
~экзотоксинами
~нейраминидазой
=гликопротеинами клеточной стенки
~ спорами
}

Дерматофиты не поражают у человека: {
~эпидермис
~волосы
~ногти
~лимфоузлы
=цнс
}

В лабораторной диагностике дерматомикозов используются методы кроме: {
~микроскопический
~микологический
~аллергический
~темнопольной микроскопии
=ультрафиолетовой микроскопии
}

Факторами патогенности возбудителей кандидоза являются все кроме: {
~гемолизин
~эндоплазмокоагулаза
~липиды, полисахариды
=тейхоевые кислоты

~способность к филаментации
}

Дрожжи имеют вид: {
=овальных клеток.
~сплетающихся нитей.
~гроздевидных скоплений.
~друзы.
~v-образно расположенных палочек
}

К структуре грибов относятся: {
= гифы.
~включения.
~опорные фибриллы.
~цепочкой расположенные палочки.
~аксиальная нить
}

Мукор относится к царству: {
~procaryotae
=eucaryotae
~nocardia
~vira
~sarcodina
}

Для candida характерно: {
~отсутствие клеточной стенки
~грамотрицательная окраска
=наличие истинного ядра
~кислотоустойчивость
~диффузно расположенная ядерная субстанция
}

Многие простейшие при неблагоприятных условиях образуют: {
~протопласты
= цисты
~капсулы
~споры
~сферопласты
}

К зооантропонозным микозам относятся все кроме: {
~ микроспория

~ дерматофития
= онихомикоз
~ споротрихоз
}

Факторы передачи возбудителей дерматомикозов: {
~%33.33333%предметы обихода
~%33.33333%шерсть больных животных
~%33.33333%почва
~%-100%Молоко
}

Путь передачи дерматомикозов: {
=контактно-бытовой
~трансмиссивный
~парентеральный
~воздушно-капельный
}

Онихомикоз – это: {
~Микоз кистей и стоп
=микоз ногтей
~Микоз гладкой кожи туловища
~Микоз паховых складок
}

Грибковые заболевания волосистой части головы: {
~%-100%онихомикоз
%33.33333%микроспороз
%33.33333%трихофития
%33.33333%эпидермофития

Назовите бактерии, доминирующие в полости рта человека: {

=стрептококки

~стафилококки

~бактероиды

~вейлонеллы

}

К какой области ротоглотки наиболее тропен *Streptococcus salivarius*: {

~эпителий щек

~поверхность зубов

=сосочки языка

}

К какой области ротоглотки наиболее тропны *Streptococcus sanguis* и *Streptococcus mutans*: {

~эпителий щек

=поверхность зубов

~сосочки языка

}

Перечислите облигатно-анаэробные грамположительные кокки: {

= пептострептококки

~вейлонеллы

~фузобактерии

~бактероиды

}

Назовите облигатно-анаэробные грамотрицательные кокки: {

~пептококки

=вейлонеллы

~фузобактерии

~пептострептококки

~бактероиды

}

Назовите облигатно-анаэробные грамотрицательные палочки:

~%50%бактероиды

~%-33.33333%пропионебактерии

~%-33.33333%пептококки

~%50%фузобактерии

~%-33.33333%эубактерии

}

Назовите облигатно-анаэробные грамположительные палочки: {

~%-33.33333%бактероиды
~%50%пропионебактерии
~%-33.33333%пептококки
~%-33.33333%фузобактерии
~%50%эубактерии
}

Перечислите микроаэрофильных представителей микрофлоры полости рта: {
~пептострептококки
=кампилобактерии
~пептококки
~стафилококки
~вейлонеллы
}

К аутохтонной микрофлоре полости рта относятся микроорганизмы: {
~%25%фузобактерии
~%25%вейлонеллы
~%25%лактобациллы
~%-100%иерсинии
~%25%бактероиды
}

В полости рта могут быть обнаружены следующие виды микоплазм: {
~%-33.33333%M. hominis
~%-33.33333%M. fermentans
~%-33.33333%M. pneumoniae
~%50%M. orale
~%50%M.salivarium
}

Назовите представителя аутохтонной микрофлоры полости рта, обладающего следующими свойствами: неподвижные анаэробные или факультативно-анаэробные грамположительные палочки неправильной формы, часто образующие ветвящиеся нити: {
~вейлонеллы
~фузобактерии
=актиномицеты
~бактероиды
~пропионебактерии
}

Перечислите актиномицеты, обитающие в полости рта: {
~%-100%A. bovis
~%25%A. israelii

~%25%A. naeslundii
~%25%A. odontolyticus
~%25%A. viscosus
}

Для культивирования анаэробов применяют среды:
~МПА, МПБ
~Среды Гиса
=Китт-Тароцци
~Гисса
}

Назовите представителя аутохтонной микрофлоры полости рта, обладающего следующими свойствами: анаэробные полиморфные, часто веретенообразные, неподвижные аспорогенные грамотрицательные палочки, образующие масляную кислоту: {
~вейлонеллы
=фузобактерии
~актиномицеты
~бактероиды
~пропионебактерии
}

Назовите представителя аутохтонной микрофлоры полости рта, обладающего следующими свойствами: анаэробные неподвижные грамотрицательные кокки, располагающиеся парами, беспорядочными скоплениями: {
=вейлонеллы
~фузобактерии
~актиномицеты
~бактероиды
~пропионебактерии
}

Перечислите анаэробные грамположительные кокки: {
~%33.33333%Peptostreptococcus niger
~%33.33333%Peptostreptococcus micros
~%-50%Veilonella parvula
~%-50%Bacteroides fragilis
~%33.33333%Peptococcus anaerobius
}

Перечислите структуры микроорганизмов, обеспечивающие их способность к адгезии в полости рта: {
~%33.33333%адгезины

~%33.33333%пили
~%-100%опсонины
~%33.33333%капсулы
}

Какие экстрацеллюлярные полимеры способствуют адгезии *S.sanguis* и *S.mutans* в полости рта: {
=декстраны и леваны
~гиалуроновая кислота
~муцин
}

Какие экстрацеллюлярные полимеры способствуют адгезии *Actinomyces naeslundii* в полости рта: {
~декстраны и леваны
=гиалуроновая кислота
~муцин
}

Чем обеспечивается протекция представителей резидентной микрофлоры в полости рта: {
~%50%полисахаридной капсулой
~%-50%наличием пилей
~%50%ферментами бактерий, расщепляющих иммуноглобулины и фракции комплемента
~%-50%наличием жгутиков
}

Чем обеспечивается инвазивность представителей резидентной микрофлоры полости рта: {
~полисахаридной капсулой
=ферментами агрессии с гистолитическим действием
~ферментами бактерий, расщепляющих иммуноглобулины
~наличием клеточной стенки
}

Какие из нижеперечисленных микроорганизмов преобладают в составе микрофлоры корневого канала при пульпите: {
~%33.33333%облигатно-анаэробные бактерии
~%-100%аэробные бактерии
~%33.33333%факультативно-анаэробные бактерии
~%33.33333%грибы
}

Какие изменения качественного и количественного состава микрофлоры полости рта характерны для заболеваний пародонта: {

~%50%общее число микробов в 10-20 и более раз больше

~%50%общее число микробов не меняется

~%50%увеличение грамотрицательной флоры и смена кокковой флоры палочковидными формами

~%50%увеличение грамположительной флоры и смена палочковидной флоры кокковыми формами

}

Назовите основные причины развития кандидоза полости рта: {

~%100%изменение количества грамотрицательной флоры

~%33.33333%нарушения иммунологической реактивности организма

~%33.33333%дисбиоз при длительном применении антибактериальных препаратов широкого спектра действия

~%33.33333%наличие зубных протезов

}

Какие микроорганизмы наиболее часто являются причиной неodontогенных воспалительных процессов (фурункула или карбункула лица): {

~%50%*Candida albicans*

~%50%*Staphylococcus aureus*

~%50%*Streptococcus pyogenes*

~%50%*Veillonella parvula*

}

Какие препараты используют для этиотропной терапии кандидоза полости рта: {

~%50%левомеколь

~%50%ируксол

~%50%клотримазол

~%50%миконазол

}

Перечислите стрептококки, которые относятся к кариесогенной флоре: {

~%25%*S.mutans*

~%25%*S.ferus*

~%25%*S.ratus*

~%100%*S.pyogenes*

~%25%*S.milleri*

}

Основные факторы, влияющие на микрофлору полости рта: {

~%25%свойства слюны и интенсивность ее образования

~%25%анатомо-физиологические особенности полости рта

~%25%характер питания
~%25%соматические заболевания
~%-100%группа крови
}

Основные факторы, влияющие на микрофлору полости рта: {
~%25%буферная емкость слюны
~%25%гигиеническое содержание полости рта
~%25%состояние иммунной системы
~%25%вредные привычки
~%-100%резус-фактор
}

Положительная роль микрофлоры полости рта: {
~%25%иммуномодулирующая
~%25%витаминообразующая
~%25%участие в переваривании пищи
~%25%антагонистическая
~%-100%деминерализующая
}

Биотопы полости рта с наиболее низким содержанием O₂: {
~поверхность зубов и языка
~слизистая щеки и неба
=парадонтальный карман и зубная бляшка
~складки и крипты слизистой
~ротовая жидкость
}

Соотношение анаэробы : аэробы на поверхности зубов: {
~1:1
~10 : 1
=100 : 1
~1000 : 1
~10000 : 1
}

Соотношение анаэробы : аэробы в гингивальной борозде:
~1:1
~10 : 1
~100 : 1
=1000 : 1
~10000 : 1
}

При прорезывании молочных зубов в полости рта: {

- ~исчезают облигатные аэробы
 - ~появляются облигатные аэробы
 - =увеличивается количество облигатных анаэробов
 - ~появляются вейлонеллы и фузобактерии
 - ~уменьшается количество *S. mutans* и *S. salivarius*
- }

Среди микрофлоры полости рта здорового взрослого человека преобладают: {

- ~%-33.33333%капнофилы
 - ~%-33.33333%микроаэрофилы
 - ~%50%факультативные анаэробы
 - ~%50%облигатные анаэробы
 - ~%-33.33333%облигатные аэробы
- }

При потере зубов в пожилом возрасте: {

- =снижается количество облигатных анаэробов
 - ~повышается количество облигатных анаэробов
 - ~снижается количество дрожжевых грибов рода *Candida*
 - ~исчезают факультативно-анаэробные бактерии
 - ~исчезают аэробные бактерии
- }

Протоки слюнных желез в норме: {

- ~интенсивно обсеменены облигатно-анаэробной флорой
 - =содержат незначительное количество облигатно-анаэробных бактерий
 - ~заселены гемофилами, псевдомонадами
 - ~заселены микрофлорой зубного налета
 - ~колонизированы подвижными микроорганизмами
- }

Концентрацию органических кислот в полости рта снижают: {

- ~стрептококки
 - ~лактобациллы
 - ~актиномицеты
 - =вейлонеллы
- }

Для лактобактерий характерно: {

- ~%25%ацидофильность
- ~%-100%образуют споры
- ~%25%не вирулентные
- ~%25%продуценты бактерицинов

~%25%факультативные анаэробы
}

Вейлонеллы – антагонисты кариесогенной микрофлоры за счет: {
=активного потребления молочной кислоты
~активного закисления среды
~выделения бактериоцинов против *S. mutans*
~активного потребления O₂
}

Для пептострептококков характерно:
~%100%образуют споры
~%25%низкая сахаролитическая активность
~%25%высокая протеолитическая активность
~%25%могут вызывать гнойно-воспалительные инфекции челюстно-лицевой области
~%25%грамположительные
}

Для актиномицетов характерно:
~%25%палочки или ветвящиеся нитчатые элементы
~%100%относятся к грибам
~%25%ферментируют углеводы до органических кислот
~%25%составляют основу зубных бляшек
~%25%коагрегируют с другими бактериями
}

Структура созревшего зубного налета включает: {
~%25%приобретенная пелликула
~%100%внутренний слой коринибактерий
~%25%слой палисадно расположенных нитчатых форм микроорганизмов
~%25%сеть нитчатых микроорганизмов с адсорбированными на них микроорганизмами
~%25%поверхностный слой кокковых микроорганизмов
}

В зубном налете в первые сутки формирования преобладают: {
=грамположительные аэробы и факультативные анаэробы
~грамположительные анаэробы
~нитевидные формы бактерий
~грамотрицательные анаэробы
~грамположительные и грамотрицательные анаэробы
}

На поздних стадиях формирования зубного налета увеличивается удельный вес: {
=анаэробов и факультативных анаэробов
~аэробов и капнофилов
~строгих аэробов
~микроаэрофилов
}

Молочная кислота, образуемая микрофлорой зубной бляшки, вызывает: {
~реминерализацию эмали
=деминерализацию эмали
~повышение буферной емкости слюны
~агглютинацию бактерий
}

Микроорганизмы, относящиеся к кариесогенным микроорганизмам полости рта: {
~%33.33333%стрептококки
~%-100%вейлонеллы
~%33.33333%актиномицеты
~%33.33333%лактобактерии
}

Бактероиды тормозят образование матрикса зубной бляшки за счет: {
~утилизации молочной кислоты
=разрушения полисахаридов (декстранов и леванов)
~продукции гиалуронидазы
~синтеза декстранов
~синтеза леванов
}

Факторы, препятствующие развитию кариеса: {
~%33.33333%антимикробные системы слюны
~%33.33333%оптимальные концентрации фтора в пище и воде
~%33.33333%буферная емкость слюны
~%-100%действие молочной кислоты
}

Кариесогенность *S. mutans* связана с: {
~%25%продукцией декстранов
~%25% продукцией леванов
~%25%образованием органических кислот
~%25%прикреплением к поверхности эмали
~%-100%наличием эндотоксина
}

Функции фимбрий актиномицетов: {

=адгезия на поверхности зуба и коагрегация микроорганизмов

~связывать молочную кислоту

~разрушать эмаль зуба

~нейтрализовать pH

}

Кариесогенность актиномицетов не связана с: {

~способностью адсорбироваться на поверхности зуба

~продукцией органических кислот

~синтезом леванов и декстранов

~способностью агрегировать микроорганизмы

=наличием эндотоксина

}

Показатели индивидуального риска возникновения кариеса: {

~%33.33333%количество *S. mutans*

~%-100%количество *S. pyogenes*

~%33.33333%количество лактобацилл

~%33.33333%буферная емкость слюны

}

В возникновении кариеса зубов ведущая роль принадлежит микроорганизмам: {

~актиномицетам

~вирусам

=стрептококкам

~стафилококкам

~вейлонеллам

}

В возникновении кариеса важную роль играет свойство микроорганизмов: {

~устойчивость к антибиотикам

=способность синтезировать органические кислоты

~способность к колонизации на поверхности зуба

~способность к продукции экзотоксинов

~способность к продукции эндотоксинов

}

Ведущая роль в развитие кариеса принадлежит: {

~*Streptococcus salivaris*

=*Streptococcus mutans*

~*Lactobacillus* spp.

~*S. sangius*

~*S. aureus*

}

Фактором передачи возбудителя при кандидозах полости рта является инструментарий: {

~после стерилизации ультразвуком

~после автоклавирования

~после стерилизации сухим жаром

~после холодной стерилизации

=*Streptococcus mutans*

промытый проточной водой

}

Возникновению кандидоза слизистой оболочки полости рта не способствует: {

~неадекватная антибиотикотерапия

~применение цитостатиков, гормонов

~некачественные зубные протезы

~ортодонтические манипуляции

=*Streptococcus mutans*

витаминотерапия

}

Основной исследуемый материал при микробиологической диагностике кандидоза ротовой полости: {

~содержимое кариозной полости

~зубная бляшка

~слюна

=смыв (соскоб) со слизистой оболочки

~содержимое десневого кармана

}

Возбудителями при фурункулах челюстно-лицевой области чаще всего являются: {

~стрептококки

~лучистые грибы

~бледные спирохеты

=золотистые стафилококки

~микобактерии

}

Язвенно-некротический гингивит Венсана вызывается симбиозом: {

~стафилококков и пептострептококков

=фузобактерий и спирохет

~стрептококков и фузобактерий

~стрептококков и лактобацилл

}

Поверхностные грибковые поражения слизистой оболочки полости рта вызывают: {

~эпидермофиты

~актиномицеты

~трихофиты

=кандида

~спирохеты

}

Перечислите методы стерилизации, применяемые в стоматологии: {

=автоклавирование

~пастеризация

~кипячение

~фильтрация

}

Дайте характеристику автоклавирования: {

=включает обработку горячим паром (121°C) под высоким давлением (1,2-1,5 атм); термоустойчивые споры погибают в течение 15 минут

~проводят в сухожаровых шкафах при 160°C в течение 1,5-2 часов; метод позволяет уничтожить вегетативные формы и споры микроорганизмов

~метод позволяет эффективно уничтожать микроорганизмы инкубацией материала при температуре 71,7°C в течение 15 с последующим быстрым охлаждением или более длительная экспозиция (30 мин) при 60°C

~метод дробной стерилизации при низких температурах: прогревание сред при 56-58 °C в течение 1 часа на протяжении 5-6 суток; позволяет уничтожить вегетативные клетки бактерий, проросших из термостойких спор

}

Дайте характеристику стерилизации сухим жаром: {

~включает обработку горячим паром (121°C) под высоким давлением (1,2-1,5 атм); термоустойчивые споры погибают в течение 15 минут

=включает обработку при температуре 160°C в течение 1,5-2 часов; метод позволяет уничтожить вегетативные формы и споры микроорганизмов

~метод позволяет эффективно уничтожать микроорганизмы инкубацией материала при температуре 71,7°C в течение 15 с с последующим быстрым охлаждением или более длительная экспозиция (30 мин) при 60°C

~метод дробной стерилизации при низких температурах: прогревание сред при 56-58 °C в течение 1 часа на протяжении 5-6 суток; позволяет уничтожить вегетативные клетки бактерий, проросших из термостойких спор

}

Металлический стоматологический инструментарий стерилизуют: {

=сухим жаром
~кипячением
~тиндализацией
~пастеризацией
}

Для дезинфекции оборудования стоматологического кабинета, не имеющего контакта с раневой поверхностью или кровью используются: {

~%50%96% спирт
~%50%раствор перманганата калия
~%50%6% перекись водорода
~%50%70% спирт
}

Какие этапы обработки проходят инструменты стоматологического кабинета после использования:

~%-100%прокаливание
~%33.33333%дезинфекцию
~%33.33333%предстерилизационную подготовку
~%33.33333%стерилизацию
}

Для контроля эффективности стерилизации не используют следующие методы: {

~по показаниям приборов (мановакуумметров, термометров, таймеров)
~с использованием физико-химических тестов
=с использованием ИФА
~с использованием биологических тестов
~с использованием молекулярно-генетических методов контроля
}

Укажите сохранность стерильности невскрытых биксов с фильтрами: {

~5 суток
~30 суток
=20 суток
~3 суток
}

Укажите сохранность стерильности вскрытых биксов с фильтрами: {

~5 суток
~30 суток
~20 суток
=1 сутки
}

Укажите сохранность стерильности невскрытых биксов без фильтров: {
~5 суток
~30 суток
~20 суток
=3 суток
}

Укажите сохранность стерильности вскрытых биксов без фильтров: {
~5 суток
~6 часов
~20 суток
~3 суток
}

Методом химической (холодной) стерилизации обрабатывают: {
~50%зеркала, изделия из стекла
~50%наконечники
~33.33333%боры
~33.33333%одноразовые шприцы
~33.33333%перевязочный материал
}

Стоматологические зеркала стерилизуются методом химической стерилизации по времени (часов):
=1-2
~2-3
~3-4
~4-5
}

Автоклавированием стерилизуются: {
~зеркала
=ватные и марлевые тампоны
~одноразовый шприц
~пластмассовый шпатель
~боры
}

В гласперленовом стерилизаторе стерилизация инструментов проводится: {
~горячим паром
~сухим теплом
~облучением
=нагретыми стерильными шариками
~раствором глутаральдегида

}

В глассперленовом стерилизаторе стерилизуют: {

~стоматологические зеркала

=боры, эндодонтический инструментарий

~вату

~белье

~оттиски

}

Слепки-оттиски дезинфицируются у больных: {

~ВИЧ – инфицированных

~гепатит – инфицированных

~ВИЧ – и гепатит инфицированных

=всех больных

~с заболеванием сифилиса

}

Поверхность стоматологической установки обрабатывается
дезинфицирующим раствором: {

~один раз в день

~два раза в день

~три раза в день

=после приема каждого пациента

}

Для профилактики профессионального заражения стоматологов гриппом не
применяется: {

~вакцинация

~ношение маски

~интраназальное использование оксолиновой мази

=прием антибиотиков широкого спектра действия

}