

РАЗМЕРЫ ВИРУСОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ: {

- =электронной микроскопией
 - ~радиальной иммунодиффузией
 - ~люминесцентным микроскопом
 - ~световым микроскопом
 - ~осаждением трихлоруксусной кислотой (ТХУ)
- }

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМ ВИРУСОМ ЯВЛЯЕТСЯ: {

- ~вирус полиомиелита
 - =вирус натуральной оспы
 - ~вирус ящура
 - ~вирус гриппа
 - ~вирус кори
- }

В СОСТАВ ВИРИОНА ВХОДИТ: {

- ~цитоплазма
 - =капсид
 - ~ядро
 - ~липосомы
 - ~клеточная стенка
- }

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ: {

- =серологический
 - ~аллергический
 - ~бактериологический
 - ~паразитологический
 - ~биохимический
- }

ДЛЯ ВИРУСОВ ХАРАКТЕРНО: {

- =наличие только одной нуклеиновой кислоты
 - ~относительный паразитизм
 - ~рост на искусственных питательных средах
 - ~размножение путем поперечного деления
 - ~наличие РНК и ДНК
- }

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТКИ ОБРАЗУЮТ

ВИРУСЫ: {

=бешенства

~паротита

~полиомиелита

~гриппа

~ВИЧ

}

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВИРУСА ПРИМЕНЯЕТСЯ: {

=культура перевиваемых клеток

~среда Эндо

~среда Вильсона - Блера

~среда Китта - Тароцци

~среды Гисса

}

МЕТОДЫ ИНДИКАЦИИ ВИРУСОВ: {

=цитопатогенное действие (ЦП5)

~метод Вейнберга - Перетца

~метод Цейслера

~реакция Вассермана (RW)

~проба Манту

}

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИРУСОВ: {

=дисъюнктивная репродукция

~митоз

~амитоз

~почкование

~спорообразование

}

ТИП СИММЕТРИИ ВИРУСНОГО НУКЛЕОКАПСИДА: {

=кубический

~шаровидный

~кокковидный

~палочковидный

~веретенообразный

}

ВИРУСЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: {

~одним типом нуклеиновой кислоты

~абсолютным внутриклеточным паразитизмом

~отсутствием рибосом

=дисъюнктивной репродукцией

~верно все перечисленное
}

ВНУТРИЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗУЕТ: {

~вирус гриппа
=вирус натуральной оспы
~вирус полиомиелита
~ВИЧ
~вирусы коксаки
}

ПРИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТЕЛЬЦА ВНУТРИ
КЛЕТКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ: {

=собственно вирусные частицы
~включения жира
~гранулы волютина
~фрагменты хромосомы
~РНК
}

ВИРУСНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОНКОГЕНЕЗА
РАЗРАБОТАНА: {

~Пастером
~Кохом
=Зильбером
~Ивановским
~Видалем
}

БАКТЕРИОФАГ - ЭТО ВИРУС, ПОРАЖАЮЩИЙ: {

~животных
~насекомых
~птиц
=бактерий
~человека
}

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ПРОВОДИТСЯ
ВАКЦИНОЙ: {

~Солка
~Сэбина
~БЦЖ
=антирабической

~Коха
}

ВИРУСЫ ЦИТОМЕГАЛИИ ОТНОСЯТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {

~рабдовирусов
~пикорнавирусов
=герпесвирусов
~аденовирусов
~ареновирусов
}

ВИРУС БЕШЕНСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНО ПОРАЖАЕТ: {

~серое вещество передних рогов спинного мозга
=клетки Пуркинье мозжечка и амоннова рога
~кожу
~органы дыхания
~спинной мозг
}

АНТИРАБИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧЕНА: {

~Солком
~Сэбином
~Мечниковым
~Кохом
=Пастером
}

ТЕЛЬЦА ГАВРНИЕРИ, КАК ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ,
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ВИРУСА: {

~кори
~гриппа
~бешенства
=натуральной оспы
~ветряной оспы
}

ВИРУСЫ СПОСОБНЫ РАЗМНОЖАТЬСЯ: {

~на МПА
~на среде Эндо
~на среде Левенштейна-Йенсена
~на яичных средах
=в курином эмбрионе
}

К ВИРУСНЫМ ИНФЕКЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ: {

~туберкулез

- ~холера
- =корь
- ~брюшной тиф
- ~сыпной тиф
- }

АРБОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ВЫЗЫВАЮТСЯ: {

- ~рабдовирусами
- =тогавирусами
- ~пикорнавирусами
- ~аденовирусами
- ~поксвирусами
- }

ЗАРАЖЕНИЕ АРБОВИРУСАМИ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩИМ ПУТЕМ: {

- ~контаминационным
- =трансмиссивным
- ~алиментарным
- ~трансплацентарным
- ~воздушно-капельным
- }

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ: {

- =антропонозным
- ~зоонозным
- ~антропозоонозным
- ~конвенционным
- ~трансмиссивным
- }

ВИРУСЫ ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТЫ: {

- ~Пастером
- ~Кохом
- =Ивановским
- ~Мечниковым
- ~Эрлихом
- }

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ВИРУСЫ: {

- ~гриппа
- =гепатита В
- ~кори
- ~ветряной оспы
- ~эпидемического паротита

}

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ВИРУСА НАЗЫВАЕТСЯ: {

=вирион

~бактериофаг

~профаг

~колицин

~лизин

}

ВИРУСЫ ИМЕЮТ: {

~цитоплазму

~ядро

=нуклеиновую кислоту

~клеточную стенку

~ЦПМ

}

ВИРУСЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДНК: {

=герпесвирусы

~пикорнавирусы

~ретровирусы

~коронавирусы

~арбовирусы

}

РАЗМЕРЫ ВИРУСОВ ИЗМЕРЯЮТСЯ В: {

~капсомерах

=нанометрах

~миллиметрах

~дециметрах

~сантиметрах

}

ВИРУС ГРИППА СОДЕРЖИТ ФЕРМЕНТ: {

~коллагеназу

=нейраминидазу

~гиалуронидазу

~плазмокоагулазу

~каталазу

}

ВИРИОН СЛОЖНОУСТРОЕННЫХ ВИРУСОВ СОСТОИТ ИЗ: {

=нуклеиновой кислоты, суперкапсида

- ~аппарата Гольджи, нуклеоида
- ~зерен валютина, гликопротеида
- ~митохондрий
- ~ядра, капсулы

}

ВИРУС НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ ОТНОСИТСЯ К ВИРУСАМ: {

- ~нейротропным
- =дермотропным
- ~пневмотропным
- ~энтеротропным
- ~иммуноотропным

}

В СТРУКТУРЕ ВИРУСОВ ИМЕЮТСЯ: {

- ~рибосомы
- =нуклеиновая кислота
- ~зерна валютина
- ~зерна Муха
- ~споры

}

ВИРУСЫ РАЗМНОЖАЮТСЯ ПУТЕМ: {

- ~поперечного деления
- =дисъюнктивной репродукции
- ~спорообразования
- ~бинарного деления
- ~почкованием

}

ВИРУСЫ МОГУТ РАЗМНОЖАТЬСЯ: {

- ~на искусственных питательных средах
- =в курином эмбрионе
- ~на среде Эндо
- ~на среде Китта - Тароцци
- ~на среде Левина

}

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А: {

- =алиментарный
- ~половой
- ~трансмиссивный
- ~парентеральный
- ~воздушно-капельный

}

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ТЕЛЬЦА БАБЕША - НЕГРИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ВИРУСА: {

=бешенства

~натуральной оспы

~полиомиелита

~кори

~СПИДа

}

ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: {

~алиментарный

~водный

~трансмиссивный

~половой

=воздушно-капельный

}

К ГЕРПЕСВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ ВИРУСЫ: {

= цитомегалии

~полиомиелита

~парагриппа

~гриппа

~бешенства

}

ВИРУСЫ СОСТАВЛЯЮТ ЦАРСТВО: {

~эукариотов

~прокариотов

=вира

~мицетов

~простейших

}

ВИРИОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: {

=внеклеточную форму вируса

~внутриклеточную форму вируса

~профаг

~изолированную клетку

~клетку в стадии деления

}

К ГЕРПЕСВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ ВИРУСЫ: {

~гриппа

- ~парагриппа
- ~эпидемического паротита
- =ветряной оспы
- ~вирус гепатита В

}

СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВИРУСОВ ГЕРПЕСА: {

- ~%33.33333% способность размножаться на простых питательных средах
- ~%50% наличие ДНК
- ~%50% длительная персистенция в организме
- ~%33.33333% наличие РНК
- ~%33.33333% быстрое выведение из организма

}

ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ ИНФОРМАЦИИ С РНК НА ДНК ХАРАКТЕРНА: {

- ~пикорнавирусам
- =ретровирусам
- ~рабдовирусам
- ~миксовирусам
- ~ареновирусам

}

ОБРАТНУЮ ТРАНСКРИПТАЗУ (РЕВЕРТАЗУ) ОБРАЗУЮТ: {

- ~рабдовирусы
- =ретровирусы
- ~миксовирусы
- ~тогавирусы
- ~поксвирусы

}

ВИРОГЕНИЯ – ЭТО: {

- =объединение вирусной нуклеиновой кислоты с хромосомой клетки хозяина
- ~объединение вирусной нуклеиновой кислоты с цитоплазмой клетки хозяина
- ~объединение вируса с ядром клетки хозяина
- ~объединение с жгутиками
- ~объединение с зернами воллютина

}

ПРОВИРУС - ЭТО ВИРУС: {

- =интегрированный с клеточным геномом
- ~интегрированный в цитоплазму
- ~интегрированный в капсулу
- ~интегрированный в ядро
- ~интегрированный в клеточную стенку

}

ДЛЯ ВИРУСОВ ХАРАКТЕРНО: {

~наличие собственных энергообразующих систем

~наличие рибосом

~клеточное строение

=дисъюнктивная репродукция

~рост на искусственных питательных средах

}

ДНК - СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ: {

=поксвирусы

~пикорнавирусы

~ретровирусы

~ареновирусы

~рабдовирусы

}

ВИРУС ГРИППА ПРИНАДЛЕЖИТ К СЕМЕЙСТВУ: {

~парамиксовирусов

=ортомиксовирусов

~пикорнавирусов

~аденовирусов

~рабдовирусов

}

«БЕШЕНСТВО» В ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: {

~Variola

=Rabies

~Anthrax

~Pestis

~Pertussis

}

К АРБОВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ: {

~50% вирус клещевого энцефалита

~50% вирус желтой лихорадки

~33.33333% вирус иммунодефицита человека

~33.33333% ротавирусы

~33.33333% вирус гриппа

}

РЕЗЕРВУАР РАБДОВИРУСОВ В ПРИРОДЕ: {

=собаки, волки, шакалы, лисы, кошки

- ~клещи
- ~комары
- ~человек
- ~птицы

}

РАБДОВИРУС В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОПАДАЕТ: {

- ~с фекалиями больных животных
- ~с кровью больных животных
- =со слюной больных животных
- ~с водой
- ~через укусы комаров

}

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА
ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАКЦИНА: {

- ~БЦЖ
- ~СТИ
- =вакцина антирабическая
- ~вакцина Солка
- ~вакцина Сэбина

}

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ: {

- ~%50% половой
- ~%-33.33333% контактно - бытовой
- ~%50% вертикальный
- ~%-33.33333% воздушно-капельный
- ~%-33.33333% алиментарный

}

КЛЕТОЧНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К
ИНФИЦИРОВАНИЮ ВИЧ: {

- =СД-4 лимфоциты (хелперы)
- ~эндотелиоциты
- ~гепатоциты
- ~В-лимфоциты
- ~эпителиальные клетки

}

ИСТОЧНИКОМ И РЕЗЕРВУАРОМ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
ЯВЛЯЮТСЯ: {

- ~животные
- ~пищевые продукты
- =вирусоносители

~птицы

~грызуны

}

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВИРУСОВ ИСПОЛЬЗУЮТ: {

~среды Эндо, Левина

~МПА, МПБ

=развивающийся куриный эмбрион

~щелочные среды

~среда Вильсон - Блера

}

К ПЕРЕВИВАЕМЫМ КУЛЬТУРАМ ТКАНЕЙ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
ОТНОСЯТСЯ: {

=HeIa

~Эндо

~Левина

~БЦЖ

~СТИ

}

ДЛЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ: {

~агглютинации

=иммуноферментный метод (ИФМ)

~преципитации

~РСК

~РТГА

}

ВИРИОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ: {

=нуклеокапсида

~хроматиновой субстанции

~митохондрий

~жгутиков

~внутриклеточных включений

}

ВИРИОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: {

~обособленную клетку

~скопление вирусов

~чистую культуру вирусов

=отдельную вирусную частицу

~внутриклеточные включения

}

ВИРУСНАЯ ОБОЛОЧКА (КАПСИД) СОСТОИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

ИЗ: {

- ~миколовой кислоты
- ~нуклеиновой кислоты
- ~полисахаридов
- =белков
- ~липидов

}

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИМЕЮТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ: {

- ~сыпном тифе
- =бешенстве
- ~сапе
- ~гриппе
- ~клещевом энцефалите

}

ВИРУСЫ РАЗМНОЖАЮТСЯ: {

- ~делением
- ~сегментированием
- =репродукцией
- ~конъюгацией
- ~с помощью митоза

}

ПРИСУТСТВИЕ ВИРУСОВ В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ ВЫЯВЛЯЮТ: {

- =по цитопатогенному действию
- ~реакцией Борде - Жангу
- ~реакцией Асколи
- ~реакцией Шика
- ~феноменом Исаева - Пфейффера

}

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТУР КЛЕТОК: {

- =среда 199
- ~среда Леффлера
- ~среда Эндо
- ~желчный бульон
- ~среда Сотона

}

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЮТСЯ ВИРУСЫ: {

- ~вирус гепатита В
- ~ВИЧ
- =вирус кори
- ~вирус клещевого энцефалита

~вирус бешенства
}

ДЛЯ ИНТЕРФЕРОНА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ: {

~синтезируется эритроцитами
=блокирует синтез вирусной нуклеиновой кислоты в клетке
~токсичен для клеток макроорганизма
~имеет узкий спектр противовирусного действия
~продуцируется антителами
}

ПРОЧНЫЙ (ПОЖИЗНЕННЫЙ) ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ИММУНИТЕТ: {
ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ

=кори
~гриппа
~парагриппа
~аденовирусных инфекций
~цитомегалии
}

К РНК СОДЕРЖАЩИМ ВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ: {

~поксвирусы
=пикорнавирусы
~паповавирусы
~парвовирусы
~герпесвирусы
}

В СЕМЕЙСТВО ОРТОМИКСОВИРУСОВ ВХОДЯТ ВОЗБУДИТЕЛИ: {

=гриппа
~ВИЧ
~натуральной оспы
~полиомиелита
~бешенства
}

МИКСОВИРУСЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ПРИЗНАКАМИ: {

~поражают кожу
~образуют внутриклеточные включения
=обладают тропизмом к мукоидным тканям
~содержат ДНК
~верно все перечисленное
}

ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ВИРУСА ГРИППА: {

- ~размножается поперечным делением
 - ~содержит митохондрии
 - =характеризуется изменчивостью антигенной структуры
 - ~относится к пикорнавирусам
 - ~культивируется на искусственных питательных средах
- }

ВИРУС БЕШЕНСТВА: {

- ~относится к дермотропным вирусам
 - ~поражает иммунную систему
 - ~содержит ДНК
 - =содержит РНК
 - ~относится к группе пикорнавирусов
- }

УЛИЧНЫЙ ВИРУС БЕШЕНСТВА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ: {

- =циркулирует в природе в организме диких животных
 - ~не образует в клетках ЦНС тельца-включения
 - ~патогенен только для кроликов
 - ~неверно все перечисленное
 - ~верно все перечисленное
- }

ВИРУС ПОЛИОМИЕЛИТА: {

- =относится к пикорнавирусам
 - ~относится к реовирусам
 - ~содержит ДНК
 - ~обладает иммуотропным действием
 - ~чувствителен к эфиру
- }

ДНК - СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ: {

- ~арбовирусы
 - ~миксовирусы
 - ~реовирусы
 - ~пикорнавирусы
 - =поксвирусы
- }

К ПИКОРНАВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ: {

- =вирус полиомиелита
- ~арбовирусы
- ~ВИЧ
- ~вирус гриппа

~гепаднавирусы
}

«ФИКСИРОВАННЫЙ» ВИРУС БЕШЕНСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ: {
=приготовления вакцины
~диагностики бешенства
~постановки серологических реакций
~лечения бешенства
~постановки аллергических проб
}

ВИРУС БЕШЕНСТВА В ОРГАНИЗМЕ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ: {
=в клетках центральной нервной системы
~в иммунокомпетентных клетках
~в мышечной ткани
~в кишечнике
~в паренхиматозных органах
}

К СЕМЕЙСТВУ ГЕРПЕСВИРУСОВ ОТНОСЯТСЯ: {
~рабдовирусы
~поксвирусы
~пикорновирусы
=цитомегаловирусы
~аденовирусы
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ: {
~антитоксическую сыворотку
=интерферон
~бактериофаг
~анатоксин
~колибактерин
}

ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {
~арбовирусов
~рабдовирусов
~пикорновирусов
=герпесвирусов
~гепадновирусов
}

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {

~тогавирусов
~парвовирусов
~миксовирусов
~аренавирусов
=ретровирусов
}

ВИРУС, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В КЛЕТОЧНЫЙ ГЕНОМ, НАЗЫВАЕТСЯ: {
~рабдовирус
~пикорновирус
=провирус
~аденовирус
~реовирус
}

ИНТЕГРАЦИЯ ВИРУСНОЙ НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ХРОМОСОМУ
КЛЕТКИ ХОЗЯИНА НАЗЫВАЕТСЯ: {
~бактериемией
~вирусемией
=вилогением
~токсинемией
~септикопиемией
}

ВИРУСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ РАЗВИТИЕ ОПУХОЛЕЙ У
ЧЕЛОВЕКА: {
~вирус гриппа
~вирус полиомиелита
~вирус геморрагической лихорадки
=вирус папилломы человека
~вирус бешенства
}

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОФАГ, НАЗЫВАЮТСЯ: {
=лизогенными
~дефектными
~колициногенными
~фаголизабельными
~полирезистентными
}

ВИРУС ГЕПАТИТА В ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {
~пикорнавирусов
~рабдовирусов
=гепаднавирусов
~аденовирусов

~ортомиксовирусов
}

АНТИТЕЛА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИОМИЕЛИТА: {

~агглютинины
~преципитины
=вируснейтрализующие антитела
~антитоксины
~лизины
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВИРУСАМИ КОКСАКИ ИСПОЛЬЗУЮТ: {

~аллергический метод
=заражение чувствительных животных
~обнаружение вирусных антигенов в сыворотке крови
~реакцию преципитации в геле
~реакцию агглютинации Райта
}

ДЛЯ АКТИВНОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ ПРИМЕНЯЮТ: {

~инактивированную вакцину
=живую вакцину
~химическую вакцину
~антитоксическую сыворотку
~антибиотики
}

К ОНКОГЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ ВИРУСЫ СЕМЕЙСТВ: {

~%33.33333% ортомиксовирусов
~%33.33333% рабдовирусов
~%33.33333% парамиксовирусов
~%50% герпесвирусов
~%50% гепаднавирусов
}

АФТОВИРУСЫ ОТНОСЯТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {

~реовирусов
~ретровирусов
=пикорнавирусов
~аденовирусов
~коронавирусов
}

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЕРОТИПОВ ВИРУСА ПОЛИОМИЕЛИТА
ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕАКЦИИ: {

=биологической нейтрализации вируса

~преципитации

~агглютинации

~бактериолиза

~нейтрализации токсина

}

ВИРУС КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОТНОСИТСЯ К: {

~пикорнавирусам

~рабдовирусам

~ретровирусам

~тогавирусам

=флавивирусам

}

ДЛЯ РЕПРОДУКЦИИ ДЕФЕКТНОГО ВИРУСА ГЕПАТИТА D
НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ ВИРУСА-ПОМОЩНИКА. ЕГО РОЛЬ
ВЫПОЛНЯЕТ: {

~вирус гепатита A

=вирус гепатита B

~вирус гепатита C

~вирус гепатита E

~вирус гепатита F

}

ВИРУСЫ КОКСАКИ ОТНОСЯТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {

~рабдовирусов

~лентивирусов

~герпесвирусов

=пикорнавирусов

~коронавирусов

}

ВИРУСЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКОЙ МИОТРОПНОСТЬЮ

~вирусы гриппа

=вирусы Коксаки

~аденовирусы

~герпесвирусы

~поксвирусы

}

АБСОЛЮТНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА

ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ: {

- ~наличие антител в сыворотке крови
 - ~обнаружение вирусов в носоглотке
 - ~обнаружение вирусов в моче
 - ~обнаружение вирусов в смывах носоглотки
 - =нарастание титра антител в парных сыворотках в 4 раза
- }

К ЭНТЕРОВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ: {

- =вирус Коксаки
 - ~аденовирус
 - ~вирус герпеса
 - ~вирус гепатита В
 - ~вирус бешенства
- }

ВИРУС ЯЩУРА ОТНОСИТСЯ К

- ~энтеровирусам
 - ~тогавирусам
 - ~парамиксавирусам
 - =афтоввирусам
 - ~орбивирусам
- }

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА БЫЛ ОТКРЫТ: {

- ~Л. Пастером
 - =Р. Галло, Л. Монтанье
 - ~Р. Кохом
 - ~Кальметом и Гереном
 - ~Д. Ивановским
- }

НАЗОВИТЕ МАРКЕРЫ СУПЕРКАПСИДНОЙ ОБОЛОЧКИ ВИЧ: {

- ~p7
 - ~p9
 - =gp 120
 - ~p 18
 - ~gp 24
- }

ВИРУС ВЕЗИКУЛЯРНОГО СТОМАТИТА ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {

- =рабдовирусов
- ~ортомиксовирусов
- ~парамиксовирусов
- ~аденовирусов

~флавивирусов
}

К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ЭНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ ОТНОСЯТСЯ: {
~%-33.33333% вирус гепатита В
~%-33.33333% вирус гепатита D
~%-33.33333% вирус гепатита С
~%50% вирус гепатита А
~%50% вирус гепатита Е
}

ВИРУС ЭПШТЕЙН-БАРР ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ: {
~%-33.33333% алиментарным
~%-33.33333% половым
~%50% воздушно-капельным
~%50% через слюну
~%-33.33333% вертикальным
}

ГЕНИТАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТ: {
~ВПГ-1
=ВПГ-2
~ЦМВ
~Вирус Эпштейн-Барр
~ВГЧ-6
}

ВИРУС ЭПШТЕЙН-БАРР ВЫЗЫВАЕТ: {
~инфекционный мононуклеоз
~лимфому Беркитта
~назофарингеальную карциному
=все перечисленное
~неверно все перечисленное
}

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЦМВ-ИНФЕКЦИИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: {
~вакцина Солка
~убитая вакцина
~живая вакцина
~вакцина Сэбина
=не разработана
}

К АЛЬФА-ГЕРПЕСВИРУСАМ ОТНОСИТСЯ: {

~ЦМВ
=ВПГ-1
~Вирус Эпштейн-Барр
~ВГЧ-6
~ВГЧ-7
}

ВИРУС ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ VARICELLA-ZOSTERVIRUS
ВЫЗЫВАЕТ: {

~натуральную оспу
=ветряную оспу
~желтую лихорадку
~цетомегамию
~полиомиелит
}

ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ОТНОСИТСЯ К: {

~вирусам герпеса человека 1
~вирусам герпеса человека 2
=вирусам герпеса человека 3
~поксвирусам
~реовирусам
}

ВИРУС ЭПШТЕЙН-БАРР ВЫЗЫВАЕТ: {

~саркому Капоши
~цитомегалию
~опоясывающий лишай
=лимфоме Беркитта
~эпидемический паротит
}

ДЛЯ АДЕНОВИРУСОВ ХАРАКТЕРНО: {

~содержание РНК
~размножение бинарным делением
~спиральный тип симметрии
~клеточное строение
=содержание ДНК
}

К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ С ЭНТЕРАЛЬНЫМ
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ОТНОСЯТСЯ: {

~%50% НАV
~%-33.33333% HBV
~%-33.33333% HCV

~%-33.33333% HDV
~%50% HEV
}

ДЖЕННЕР ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛ ЭФФЕКТИВНУЮ ИСКУССТВЕННУЮ ПРИВИВКУ (ВАКЦИНАЦИЮ) ПРОТИВ: {
~туберкулеза
~гриппа
~полиомиелита
~кори
=натуральной оспы
}

ЧАСТИЦАМИ ДЕЙНА НАЗЫВАЮТ ВИРИОН: {
~вируса гепатита А
=вируса гепатита В
~вируса кори
~вируса паротита
~вируса везикулярного стоматита
}

АВСТРАЛИЙСКИМ НАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЙ АНТИГЕН ВИРУСА ГЕПАТИТА В: {
=HBS
~HBc
~HBe
~HBx
~ни один из перечисленных
}

ВИРУС ГЕПАТИТА А ПРИНАДЛЕЖИТ К: {
~поксвирусам
~рабдовирусам
~тогавирусам
=гепаднавирусам
~пикорнавирусам
}

ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ БОТКИНА: {
~вирус Коксаки
=вирус гепатита А
~аденовирусы
~вирус ЕСНО
~вирус кори
}

ДЛЯ ПАССИВНОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА А: {

~вакцину СТИ

~вакцина Солка

~вакцина Сэбина

~анатоксин

=иммуноглобулин, полученный из смеси донорских сывороток

}

ВИРУС ГРИППА ТИПА В ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ: {

~парамиксовирусов

~аденовирусов

=ортомиксовирусов

~парвовирусов

~герпесвирусов

}

HERPES ZOSTER – ВОЗБУДИТЕЛЬ: {

=ветряной оспы

~натуральной оспы

~эпидемиологического паротита

~полиомиелита

~кори

}

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ПРИМЕНЯЮТ: {

~живую вакцину

~инактивированную вирионную вакцину

~инактивированную субъединичную вакцину

=все перечисленные

~специфическая профилактика не разработана

}

К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ЭНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
ОТНОСЯТСЯ: {

~%-33.33333% HBV

~%-33.33333% HCV

~%-33.33333% HDV

~%50% HAV

~%50% HEV

}

К СЕМЕЙСТВУ ПАРАМИКСОВИРУСОВ ОТНОСЯТСЯ: {

- ~вирус гриппа
- =вирус паротита
- ~вирус полиомиелита
- ~риновирус
- ~вирус везикулярного стоматита

}

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОЛИОМИЕЛИТА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРИМЕНЯЮТ: {

- ~иммуноглобулин
- ~интерферон
- ~анатоксин
- ~химическую вакцину
- =живую вакцину

}

ВИРУС БЕШЕНСТВА ОТНОСИТСЯ К РОДУ: {

- ~Vesiculovirus
- ~Morbillivirus
- ~Pneumovirus
- =Lissavirus
- ~Paramyx

}

ВИРУСЫ РАЗМНОЖАЮТСЯ: {

- ~почкованием
- ~поперечным делением
- =репродукцией
- ~спорообразованием
- ~образованием микроколоний

}

ВИРУСЫ: {

- ~растут на питательных средах
- =являются облигатными внутриклеточными паразитами
- ~имеют клеточные структуры
- ~размножаются почкованием
- ~имеют мицелий

}

РНК-СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ: {

- ~аденовирусы
- ~паповавирусы
- =пикорнавирусы
- ~герпесвирусы

~поксвирусы
}

ДНК-СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ: {

~парамиксовирусы
~рабдовирусы
=гепаднавирусы
~флавивирусы
~ретровирусы
}

СОЗДАНИЕ Э. ДЖЕННЕРОМ ВАКЦИНЫ: {

~позволило успешно бороться с бешенством
=связано с вакцинацией против оспы
~относится к пастеровскому периоду в микробиологии
~явилось результатом химических экспериментов
~явилось результатом опытов на лабораторных животных
}

ВАКЦИНА ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ВПЕРВЫЕ БЫЛА СОЗДАНА: {

~Р. Кохом
=Л.Пастером
~И.Мечниковым
~А.Флемингом
~С.Н.Виноградским
}

ВИРУСЫ ОТКРЫЛ: {

~Л.Пастер
~Р.Кох
=И.Ивановский
~И.И.Мечников
~Д.К.Заболотный
}

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВИРУСОВ: {

=вирион
~капсид
~капсомер
~суперкапсид
~элементарные тельца
}

ТЕЛЬЦА ГВАРНИЕРИ ОТМЕЧАЮТСЯ ПРИ: {

~бешенстве
~трахоме
~гриппе
=натуральной оспе
~герпесе
}

К ПИКОРНАВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ: {

~вирус гриппа

~вирус кори

~вирус краснухи

~вирус клещевого энцефалита

=вирус гепатита А

}

ВИРУСЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ: {

~эукариоты

=внеклеточную форму жизни

~прокариоты

~прионы

~одноклеточные организмы

}

К ОРТОМИКСОВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ ВИРУСЫ: {

~бешенства

~клещевого энцефалита

~реовирусы

~гепатита А

=гриппа

}

К РЕТРОВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ ВИРУСЫ: {

~желтой лихорадки

=иммунодефицита человека

~бешенства

~кори

~ротавирусы

}

К ГЕПАДНАВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ ВИРУСЫ: {

~везикулярного стоматита

~краснухи

=гепатита В

~Коксаки

~болезни Ласса

}

ПАЛОЧКОВИДНУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ ВИРУС: {

~гриппа

~бешенства

=табачной мозаики

~оспы
~осповакцины
}

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИРУСОВ ПРОИСХОДИТ ПУТЕМ: {
~бинарного деления
=дисъюнктивной репродукции
~почкования
~спорообразования
~половым
}

ПУЛЕВИДНУЮ ФОРМУ МОГУТ ИМЕТЬ ВИРУСЫ: {
~гриппа
~кори
~табачной мозаики
=бешенства
~ящура
}

ГОЛОВЧАТУЮ ФОРМУ ИМЕЮТ ВИРУСЫ: {
~гриппа
~табачной мозаики
~оспы
~ротавирус
=бактериофаг
}

НЕ СОДЕРЖАТ РНК: {
~микоплазмы
=герпесвирусы
~миксовирусы
~бактерии
~риккетсии
}

НЕ ИМЕЮТ СОБСТВЕННЫХ БЕЛОКСИНТЕЗИРУЮЩИХ СИСТЕМ: {
~микоплазмы
~бактерии
=вирусы
~риккетсии
~спирохеты
}

НЕ СОДЕРЖАТ ДНК: {
~бактерии

- =пикорнавирусы
- ~герпесвирусы
- ~спирохеты
- ~риккетсии

}

РАЗМНОЖЕНИЕ ДИСЪЮНКТИВНОЙ РЕПРОДУКЦИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ: {

- ~грибов
- ~бактерий
- ~спирохет
- ~простейших
- =вирусов

}

АНТИГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИРУСА ГРИППА В ВИДЕ "ДРЕЙВА": {

- ~%-33.33333% происходит редко
- ~%50% происходит постоянно
- ~%-33.33333% результат рекомбинаций
- ~%50% результат мутаций
- ~%-33.33333% результат трансформации

}

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА (ОДИН ОТВЕТ): {

- = убитая вакцина
- ~живая вакцина
- ~ анатоксин
- ~ субклеточная вакцина
- ~ инактивированная вакцина

}

ВИРУСЫ: {

- ~%50% ОБЛИГАТНЫЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ
- ~%-33.33333% Имеют клеточное строение
- ~%50% содержат один тип нуклеиновой кислоты
- ~%-33.33333% размножаются бинарным делением
- ~%-33.33333% культивируются на сложных питательных средах

}

К АРБОВИРУСАМ ОТНОСЯТСЯ: {

- ~%-33.33333% вирус бешенства
- ~%50% вирусы клещевого энцефалита
- ~%-33.33333% вирусы полиомиелита
- ~%50% вирусы крымской геморрагической лихорадки

~%-33.33333% вирусы краснухи
}

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВИРУСАМИ: {

~%50% полиомиелит
~%-33.33333% коклюш
~%-33.33333% возвратный тиф
~%50% клещевой энцефалит
~%-33.33333% ку-лихорадка
}

ВОЗБУДИТЕЛИ ОРВИ: {

~%-33.3333% герпесвирусы
~%50% вирусы гриппа
~%-33.3333% вирус краснухи
~%50% коронавирусы
~%-33.3333% вирусы Коксаки
}

ВИРУСЫ ГРИППА СОДЕРЖАТ: {

~%-33.33333% Гиалуронидазу
~%-33.33333% ДНК –Ревертазу
~%50% Геммаглютинин
~%50% Нейраминидазу
~%-33.33333% трансферазу
}

АНТИГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ВИДЕ ШИФТА: {

~%-33.33333% происходит постоянно
~%-33.33333% результат мутаций
~%50% происходит редко
~%50% результат рекомбинаций
~%-33.33333% результат трансдукции
}

АНТИГЕНЫ суперкапсида ВИЧ: {

~%50% gp41
~%50% gp120
~%-33.33333% p-24
~%-33.33333% HBS-антиген
~%-33.33333% HBC-антиген
}

ДЛЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА А ХАРАКТЕРНО: {

=имеет мелкие размеры

- ~передается кровяным механизмом
- ~культивируют в куриных эмбрионах
- ~обладают высоким уровнем изменчивости
- ~содержит ДНК

}

ИСТОЧНИК ВИРУСА ГЕПАТИТА В: {

- ~%-33.33333% вода, пищевые продукты
- ~%-33.33333% клещи, комары
- ~%50% вирусоноситель
- ~%50% больной человек
- ~%-33.33333% животные

}

ЭКСПРЕСС - ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ: {

- ~%-33.33333% выявление сенсibilизации с помощью кожных проб
- ~%-33.33333% индикация вируса в культуре клеток
- ~%-33.33333% определение сероконверсии в парных сыворотках
- ~%50% обнаружение генома вируса в исследуемом материале с помощью ПЦР
- ~%50% обнаружение антигенов вируса в исследуемом материале с помощью РИФ

}

ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЮТСЯ: {

- ~%-33.33333% вирусы герпеса
- ~%50% вирусы гепатита А
- ~%-33.33333% полиовирусы
- ~%-33.33333% вирусы гепатита В
- ~%50% ротавирусы

}

АНТИГЕНЫ ВИРУСОВ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ: {

- ~%-33.33333% H1N1 антиген
- ~%-33.33333% H3N2 антиген
- ~%50% HBS антиген
- ~%50% HBc антиген
- ~%-33.33333% gp120 антиген

}

ЛАТЕНТНУЮ ИНФЕКЦИЮ В НЕЙРОНАХ ВЫЗЫВАЮТ: {

- ~%50% вирус простого герпеса
- ~%-33.33333% цитомегаловирус
- ~%50% вирус опоясывающего лишая

~%-33.33333% вирус Эпштейн- Барр

~%-33.33333% вирус папилломы

}

НАИБОЛЕЕ МЕЛКИЕ РАЗМЕРЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИРУСЫ: {

=вирус полиомиелита

~вирус натуральной оспы

~вирус ящура

~вирус осповакцины

~рабдовирусы

}