

Первичная костная мозоль образуется из: {

- = камбиального слоя надкостницы
 - ~ кровеносных сосудов
 - ~ лимфатических сосудов
 - ~ гематомы
 - ~ костных балок
- }

Замедление консолидации отломков костей возникает при: {

- ~ гиперкальцемии
 - ~ интерпозиции тканей между отломками
 - ~ повреждении лимфатических сосудов
 - = повреждении надкостницы
 - ~ чрезмерно длительной иммобилизации
- }

В отдаленном периоде после консолидации отломков костей наблюдаются осложнения: {

- = боли, атрофия мягких тканей, контрактуры
- ~ гиперемия
- ~ гипертрофия мышц
- ~ патологическая подвижность
- ~ жировая эмболия

Оперативное лечение переломов костей применяется при: {

- = при поперечных смещенных переломах
 - ~ ложных суставах
 - ~ поперечном переломе без смещения
 - ~ поднадкостничных переломах
 - ~ косом переломе без смещения
- }

Противопоказанием к остеосинтезу отломков является: {

- = сепсис
 - ~ поперечный перелом
 - ~ отрывной перелом
 - ~ ложный сустав
 - ~ перелом, сросшийся со смещением
- }

По анатомической локализации различают следующие переломы: {

- = диафизарные
- ~ интрамедуллярные

- ~ косые
- ~ поперечные
- ~ интраспонгиозные

}

В первые часы перелома отсутствует: {

- = повышение температуры
- ~ боль
- ~ нарушение функции
- ~ деформация на месте перелома
- ~ крепитация

}

Эпифизарные переломы характеризуются: {

- = внутрисуставным расположением линии излома
- ~ легкостью сопоставления отломков
- ~ быстрым срастанием отломков
- ~ склонностью к жировой эмболии
- ~ значительным укорочением длины конечности

}

Метафизарные переломы характеризуются: {

- = чаще вколоченностью отломков
- ~ плохим срастанием отломков
- ~ подвижностью отломков
- ~ значительным смещением отломков
- ~ неблагоприятным течением

}

Источником костеобразования при переломе не является: {

- ~ костная ткань
- ~ костный мозг
- ~ надкостница
- ~ гаверсовы каналы
- = мышцы

}

При транспортировке больного с переломом бедра лучше всего использовать шину: {

- ~ Крамера
- ~ Майорова
- = Дитерихса
- ~ Кузьминского
- ~ Богданова

}

Переломы не бывают: {
 ~ внутриутробные
 = наследственные
 ~ патологические
 ~ приобретенные
 ~ несросшиеся
 }

Наиболее часто привычный вывих возникает в: {
 ~ коленном суставе
 ~ тазобедренном суставе
 = плечевом суставе
 ~ локтевом суставе
 ~ голеностопном суставе
 }

К методам вправления вывиха плеча не относится: {
 = Бормана
 ~ Кахера
 ~ Мота
 ~ Гиппократа
 ~ Пирогова
 }

Вколоченным перелом считается в случае если: {
 = один отломок внедряется в другой
 ~ перелом сочетается с вывихом
 ~ не нарушается целостность кожных покровов
 ~ не нарушается целостность надкостницы
 ~ не происходит смещение отломков
 }

Аппарат Илизарова применяется для: {
 = внеочагового остеосинтеза
 ~ скелетного вытяжения
 ~ контроля качества гипса
 ~ иммобилизации конечности
 ~ транспортировки в лечебное учреждение
 }

Шина Дитерихса применяется при: {
 ~ репозиции отломков
 = транспортировке больного
 ~ скелетном вытяжении
 ~ лечении осложненных переломов
 ~ оперативном лечении

}

Первая помощь при переломе на месте происшествия заключается в: {

- ~ введении антибиотиков
 - = иммобилизации
 - ~ введении новокаина
 - ~ наложении швов
 - ~ переливании крови
- }

К наркотическим анальгетикам относится: {

- ~ камфора
 - = морфин
 - ~ кордиамин
 - ~ викасол
 - ~ димедрол
- }

С целью транспортной иммобилизации применяется шина: {

- ~ Волкова
 - ~ Белера
 - ~ Пирогова
 - = Крамера
 - ~ Киршнера, Вишневого
- }

Какой способ лечения является правильным, если у больного косой перелом без смещения отломков? {

- ~ оперативное лечение
 - = гипсовая повязка
 - ~ скелетное вытяжение
 - ~ иммобилизация шиной
 - ~ липкопластырное вытяжение
- }

При переломе средней трети плеча следует наложить гипсовую повязку с охватом: {

- ~ одного сустава
 - ~ двух суставов
 - = трех суставов
 - ~ не имеет значения
 - ~ только на диафиз плеча
- }

Оптимальная длина гипсового бинта составляет: {

- ~ 0,5 - 1 м

= 1,5- 2 м
 ~ 2,5 - 3 м
 ~ 3,5 - 4 м
 ~ 4,5 - 5 м
 }

Оптимальной температурой для смачивания гипсового бинта (лангеты) является: {
 ~ 20°
 ~ 30°
 = 40°
 ~ 50°
 ~ 60°
 }

Качество гипса считается хорошим, если наложенная в 4-5 слоя циркулярная гипсовая повязка затвердевает за: {
 ~ 1 -2 мин.
 ~ 3-4 мин.
 = 6-15 мин.
 ~18-20 мин.
 ~ 22-30 мин.
 }

Какой из перечисленных переломов лечится гипсовой повязкой? {
 ~ отрывной перелом
 ~ перелом шейки бедра
 ~ поперечный перелом диафиза бедра со смещением отломков
 = поднадкостничный перелом
 ~ перелом таза
 }

Перелом по типу «зеленой веточки» это—: {
 ~ открытый перелом
 = перелом кости с сохранением целостности надкостницы
 ~ перелом выступающих частей кости
 ~ внутрисуставной перелом
 ~ перелом кости без повреждения мягких тканей
 }

Какую гипсовую повязку применяют при переломе плеча: {
 ~ корсетную
 ~ кокситную
 = торакобрахиальную
 ~ гипсовый тугор
 ~ гипсовую кровать
 }

Какую гипсовую повязку применяют при переломе бедра: {

- ~ корсетную
 - = кокситную (тазобедренную)
 - ~ торакобрахиальную
 - ~ гипсовый тугор
 - ~ гипсовую кровать
- }

Показанием для лечения перелома гипсовой повязкой является: {

- ~ отрывной перелом
 - = поднадкостничный перелом
 - ~ поперечный перелом диафиза со смещением отломков
 - ~ косой перелом диафиза с интерпозицией мягких тканей
 - ~ перелом шейки бедра
- }

Оптимальным методом лечения открытого перелома бедра является: {

- ~ применение повязок с антисептическими растворами
 - ~ лечение гипсовыми повязками
 - ~ наложение скелетного вытяжения
 - ~ закрытая репозиция отломков с ПХО раны
 - = оперативное лечение с ПХО раны, репозицией и фиксацией отломков костей
- }

Какой способ лечения является правильным, если у больного поперечный перелом с интерпозицией мягких тканей: {

- ~ гипсовая повязка
 - ~ скелетное вытяжение
 - = оперативное лечение
 - ~ иммобилизация шиной
 - ~ физиотерапевтическое лечение
- }

Симптомом травматического вывиха конечности является: {

- = изменение относительной длины конечности
 - ~ изменение абсолютной длины конечности
 - ~ патологическая подвижность в суставе
 - ~ крепитация
 - ~ подкожная эмфизема
- }

Какой максимальный срок скелетного вытяжения для больного в возрасте 35 лет с поперечным переломом бедра: {

- ~ 5-6 мес.
- ~ 4-4,5 мес.

- ~ 2-2,5 мес.
- ~ 3-3,5 мес.
- = 1-1,5 мес.
- }

Что является критерием для снятия скелетного вытяжения при лечении переломов: {

- ~ изменение абсолютной длины конечности
- = образование первичной костной мозоли
- ~ исчезновение болей
- ~ изменение относительной длины конечности
- ~ образование вторичной мозоли
- }

Какую шину следует применить для скелетного вытяжения при переломах бедра и большеберцовой кости: {

- ~ Крамера
- = Белера
- ~ Дитерихса
- ~ Кузьминского
- ~ Цито
- }

Укажите вид оперативного вмешательства применяемый при переломах: {

- = металлоостеосинтез
- ~) тендопластика
- ~ миопластика
- ~ артротомия
- ~ остеотомия
- }

Назовите автора вправления вывиха бедра: {

- ~ Фовлер
- = Джанелидзе
- ~ Дезо
- ~ Вельпо
- ~ Кузьминский
- }

К клиническим признакам вывиха относится: {

- = вынужденное положение конечности
- ~ разболтанность в области сустава
- ~ крепитация
- ~ патологическая подвижность
- ~ изменение абсолютной длины конечности
- }

Одним из инструментов для скелетного вытяжения является: {

- = дрель
- ~ костные кусачки
- ~ металлический стержень
- ~ игла Кассирского
- ~ элеватор
- }

При переломе ключицы накладывается стандартная шина: {

- ~ Дитерихса
- ~ Маерова
- = Кузьминского
- ~ Виноградова
- ~ Импровизированная
- }

При переломе ключицы накладывается повязка: {

- = Дезо
- ~ Пирогова
- ~ Черепашья
- ~ Крестообразная
- ~ Колосовидная
- }

Для обезболивания перелома новокаин вводится: {

- ~ подкожно
- ~ внутримышечно
- ~ поднадкостницу
- = в гематому вокруг отломков
- ~ эндоневрально
- }

Универсальной медицинской шиной является: {

- ~ Дитерихса
- = Крамера
- ~ Богданова
- ~ Кузьминского
- ~ Пирогова
- }

При лечении перелома плеча следует использовать шину: {

- ~ Крамера
- ~ Виноградова
- ~ Маерова
- ~ Дитерихса
- = ЦИТО

}

При переломе шейных позвонков иммобилизация производится шиной: {

- = Еланского
 - ~ Крамера
 - ~ Кузминского
 - ~ Виноградова
 - ~ Вакумной
- }

Эпифизиолиз это: {

- ~ перелом эпифиза
 - ~ перелом метафиза
 - ~ внутрисуставной перелом
 - ~ перелом мыщелка
 - = перелом по линии ростковой зоны
- }

Дислокация ad axip – это СМЕЩЕНИЕ ОТЛОМКОВ ПО:

- ~ длине
 - ~ ширине
 - ~ сочетание первых 2х видов
 - ~ в любом направлении
 - ~ под углом
- }

Основным источником костеобразования при переломе является: {

- ~ гематома
 - ~ гаверсовы каналы
 - ~ эндост
 - = камбиальный слой надкостницы
 - ~ соединительная ткань вокруг перелома
- }

Поперечный перелом возникает при:

- ~ сгибании кости
 - ~ скручивании кости
 - = ударе поперек оси кости
 - ~ ударе по оси кости
 - ~ резком сокращении мышц
- }