

К заболеваниям печени и желчных путей, приводящих к нарушению гемостаза относятся: {

- = механическая желтуха
 - ~ хронический гепатит
 - ~ хронический холецистит
 - ~ гемангиома печени
 - ~ аденома печени
- }

Назовите антикоагулянт прямого действия: {

- ~ аспирин
 - ~ фенилин
 - = гепарин
 - ~ фибринолизин
 - ~ дикумарин
- }

При остром тромбозе показано: {

- ~ переливание крови
 - ~ переливание тромбоцитарной массы
 - ~ переливание эритроцитарной массы
 - = переливание фибринолизина
 - ~ переливание физ. раствора
- }

Какие анализы говорят о нарушении свертываемости крови? {

- ~ общий анализ крови
 - ~ определение сахара крови
 - = коагулограмма
 - ~ определение билирубина
 - ~ общий анализ мочи
- }

Тромбиновый индекс в норме составляет: {

- ~ 40-50 %
 - ~ 60-70 %
 - = 80-100 %
 - ~ 110-120%
 - ~ 120-130%
- }

Под воздействием какого вещества фибриноген превращается в фибрин? {

- ~ гепарина
- ~ фибринолизина
- = тромбина

- ~ аспирина
- ~ дикумарина
- }

Для уменьшения свертываемости крови назначают: {

- ~ антибиотики
- = антикоагулянты
- ~ хлористый кальций
- ~ витамины
- ~ аминокапроновую кислоту
- }

При повышении уровня фибриногена крови показано назначение: {

- ~ антикоагулянтов
- ~ вливание физ. раствора
- = вливание фибринолизина
- ~ переливание крови
- переливание гемодеза
- }

Для улучшения реологических свойств крови назначают: {

- ~ физ. раствор
- ~ раствор новокаина
- = реополиглюкин
- ~ раствор глюкозы
- ~ викасол
- }

Факторы способствующие образованию тромба: {

- ~ обморок
- = триада Вирхова
- ~ гипертоническая болезнь
- ~ переливание жидкостей
- ~ внутримышечные инъекции
- }

Какое осложнение возникает при понижении активности свертывающих факторов? {

- ~ тромбообразование
- = кровотечение
- ~ разрыв сосудов
- ~ воспаление легких
- ~ атеросклероз сосудов
- }

У больного выраженное снижение активности свертывающей системы, возможно кровотечение, что нужно назначить больному? {

- ~ переливание декстранов

- ~ назначение спазмолитиков
- = переливание аминакапроновой кислоты
- ~ переливание физ. раствора
- ~ переливание гемодеза
- }

К каким осложнениям может привести понижение свертываемости в области раны? {

- ~ расхождение швов
- ~ нагноение раны
- = кровотечение
- ~ тромбоэмболии
- ~ разрыву сосудов
- }

Влияет ли операционное вмешательство на состояние гемокоагуляции? {

- ~ не влияет
- = усиливает свертываемость крови
- ~ уменьшает свертываемость крови
- ~ нормализует свертываемость крови
- ~ свертываемость приходит в норму через месяц
- }

Из какого вещества образуется тромбин? {

- ~ из гепарина
- ~ из фибриногена
- = из протромбина
- ~ из фибриногена
- ~ из антибиотиков

}