

Первая медицинская неквалифицированная помощь оказывается: {
= средним медперсоналом или немедиками прошедшими подготовку по оказанию первой медицинской помощи.
~ рентгенологами
~ травматологами
~ терапевтами
~ хирургами
}

Первую медицинскую доврачебную помощь оказывают в: {
= фельдшерско-акушерском пункте (ФАП)
~ участковой больнице
~ специализированном хирургическом отделении
~ научно-исследовательском институте
~ научном центре
}

Первую врачебную помощь оказывают в: {
~ ФАП
= участковой больнице
~ хирургическом отделении ЦРБ
~ Республиканской клинической больнице
~ круглосуточном травматологическом пункте
}

Специализированная медицинская помощь оказывают в: {
~ участковой больнице
~ фельдшерско-акушерском пункте
= специализированном отделении больницы
~ приемном покое больницы
~ операционной
}

Первая помощь при вывихах плеча заключается в наложении: {
~ гипсовой повязки
= косыночной повязки
~ шины Дитерихса
~ аппарата Илизарова
~ колосовидной повязки
}

Специализированная помощь при повреждении крупной артерии заключается в: {
~ перевязке артерии
~ наложении жгута
= наложении сосудистого шва

- ~ переливании крови
- ~ наложении жжима
- }

Первую неквалифицированную врачебную помощь оказывает: {

- ~ хирург районной больницы
- = семейный врач
- ~ комбустиолог
- ~ хирург общего профиля
- ~ травматолог
- }

Специализированную хирургическую помощь оказывает врач: {

- = получивший специальную подготовку в определенной области хирургии
- ~ любого профиля
- ~ общего профиля
- ~ интерн
- ~ аспирант первого года обучения
- }

Первая помощь при переломах трубчатых костей заключается в: {

- = иммобилизации перелома
- ~ наложении мягкой повязки
- ~ введении новокаина в область перелома
- ~ наложении жгута
- ~ консультации больного хирургом
- }

Первую помощь при травматическом шоке следует начинать с: {

- ~ иммобилизации при переломах
- ~ транспортировки в лечебное учреждение
- ~ асептической повязки на рану
- = устранения боли
- ~ восстановления ОЦК
- }

Какова первая помощь при остановке сердца: {

- ~переливание крови
- = непрямой массаж сердца
- ~ искусственная вентиляция легких
- ~ переливание кровезаменителей
- ~ прямой массаж сердца
- }

При подъеме температуры в целях первой помощи нельзя назначать: {

- ~ обильное питье
- ~ пузырь со льдом на лобно-височную область

- = внутрь алкоголь
- ~ внутрь аспирин
- ~ обтирание тела прохладной водой
- }

Первая помощь при рвоте больному с лекарственным отравлением заключается в: {

- ~ полоскании ротовой полости молоком
- ~ переливании кровезаменителей
- = быстром многократном промывании желудка до чистой воды
- ~ искусственной вентиляции легких
- ~ катетеризации мочевого пузыря
- }