

Наиболее частым представителем хронической специфической хирургической инфекции является: {

- = Туберкулез (экстрапульмональный)
 - ~ актиномикоз
 - ~ сифилис
 - ~ бруцеллез
 - ~ проказа
- }

Заражение при туберкулезе может происходить через: {

- = дыхательные пути
 - ~ конъюнктиву глаз
 - ~ свежие раны, ожоги и язвы
 - ~ кожные покровы
 - ~ лимфатическую систему
- }

Среди хирургических форм туберкулеза на первом месте стоят поражения: {

- ~ кожных покровов
 - ~ периферических лимфоузлов
 - ~ внутренних органов живота
 - = костей, суставов
 - ~ мочеполовых органов
- }

При абдоминальном туберкулезе наиболее часто поражается: {

- = брюшина и брыжеечные лимфоузлы
 - ~ желчные пути
 - ~ сосуды
 - ~ селезенка
 - ~ поджелудочная железа
- }

Туберкулезный лимфаденит, как правило, наблюдается: {

- ~ у пожилых
 - ~ у стариков
 - = у детей и юношей
 - ~ у беременных
 - ~ в любой возрастной группе
- }

При туберкулезном шейном лимфадените дифференциальный диагноз следует провести с: {

- ~ лимфогранулематозом

- ~ лимфосаркомой
- ~ метастазами злокачественной опухоли
- ~ неспецифическим гнойным лимфаденитом
- = со всеми указанными заболеваниями
- }

Наиболее часто туберкулезом поражаются следующие суставы: {

- = тазобедренный
- ~ коленный
- ~ плечевой
- ~ локтевой
- ~ все указанные суставы
- }

Поражение костей и суставов при туберкулезе происходит, как правило: {

- = гематогенным путем
- ~ Per continuitatem
- ~ лимфогенным путем
- ~ после открытых переломов костей и повреждения суставной капсулы
- ~ все приведенные причины верны
- }

Костно-суставным туберкулезом чаще поражаются: {

- = позвоночник
- ~ дистальные суставы нижних конечностей
- ~ крупные суставы верхних конечностей
- ~ мелкие суставы конечностей
- ~ плоские кости
- }

При костном туберкулезе очаг чаще всего локализуется в: {

- ~ диафизе длинных трубчатых костей
- = эпиметафизах длинных трубчатых костей
- ~ диафизе коротких трубчатых костей
- ~ плоских костях (череп, лопатка)
- ~ любой кости и в любой ее части
- }

При костно-суставном туберкулезе процесс начинается с поражения: {

- ~ синовиальной оболочки
- = метафизарного отдела кости (возникновением первичного остита)
- ~ одновременного поражения костной ткани и синовиальной оболочки
- ~ надкостницы
- ~ мягких тканей, расположенных рядом с суставом
- }

Характерными рентгенологическими признаками при туберкулезном поражении костей являются: {

- ~ атрофия, остеолит кости в начальной стадии
 - ~ расширение суставной щели
 - ~ наличие периостита
 - = появление очагов некроза, образование секвестров в поздних стадиях
 - ~ остеосклероз
- }

Симптом Александра при костном туберкулезе это: {

- ~ атрофия мышц
 - = резкое утолщение кожной складки на стороне поражения
 - ~ появление местной температуры
 - ~ ограничение движений в суставе
 - ~ укорочение конечности
- }

В комплексной терапии туберкулеза костей и суставов используют следующие антибактериальные препараты: {

- = ПАСК, фтивазид, стрептомицин
 - ~ пенициллин, стрептоцид
 - ~ бисептол, ампициллин
 - ~ трихопол, эритромицин
 - ~ тетрациклин, этазол
- }

Возбудителем актиномикоза является: {

- ~ бацилла Коха
 - = актиномицет (лучистый грибок)
 - ~ бледная спирохета
 - ~ бацилла tetani
 - ~ бацилла antracis
- }