

Наиболее часто разрывается: {
~ широчайшая мышца спины
~ прямая мышца живота
~ четырехглавая мышца бедра
~ двуглавая мышца плеча
= икроножная мышца голени
}

Выделите клинический признак ушиба мягких тканей: {
~ понижение местной температуры
~ повышение местной температуры
~ нарушение чувствительности
= припухлость, нарушение функции
гиперемия кожи с четкими границами
}

Выделите основную локализацию внутричерепных гематом: {
~ желудочковая
= субдуральная
~ перидуральная
~ междолевая
~ интрадуральная
}

Клиническая картина травматического токсикоза развивается: {
~ сразу после сдавления конечности
= с момента освобождения конечности находившегося от сдавления
не менее через 2-3 часа
~ через 4-8 ч. после освобождения конечности
~ в течении 24-48 ч. после освобождения конечности
~ через 2-4 сут. после освобождения конечности
}

Выделите основной патогенетический фактор в развитии травматического токсикоза: {
~ гипертермический синдром
~ жировая эмболия внутренних органов
~ парез ЖКТ
~ нарушение свертываемости крови
= травматическая токсемия
}

Клиническая картина сотрясения головного мозга характеризуется: {
~ антеградной амнезией

- ~ выпадением функции тех или иных структур мозга
- ~ нарушением чувствительности
- = потерей сознания в момент травмы
- ~ гемипарезом
- }

К закрытым повреждениям мягких тканей относятся: {

- ~ травматическая асфиксия
- ~ сотрясение грудной клетки
- ~ травматический токсикоз
- = ушибы, растяжение, разрывы
- ~ сдавление грудной клетки
- }

Оказание первой помощи при травматическом токсикозе означает: {

- ~ кровопускание
- ~ введение антибиотиков
- ~ наложение гипсовой повязки
- = наложение жгута на конечность, транспортная иммобилизация, введение болеутоляющих средств, местное применение холода
- ~ интубация
- }

Основные клинические симптомы ушиба мозга - это: {

- ~ полиурия
- ~ гибернация
- = длительная потеря сознания, многократная рвота, появление очаговых симптомов
 - ~ кровоизлияние в области груди
 - ~ потеря аппетита, кахексия
- }

Ориентировочный срок лечения ушиба мозга составляет: {

- ~ 20 дней
- ~ 1,5 месяца
- = 2 месяца
- ~ 5 месяцев
- ~ полгода
- }

Дегидратационная терапия проводится при: {

- ~ повреждениях желудочно-кишечного тракта
- ~ повреждениях грудной клетки
- ~ плазмопотере
- = повреждениях головы
- ~ повреждениях органов брюшной области

}

Применение холода при повреждениях мозга направлено на: {

- ~ остановку желчеистечения
- ~ остановку ликвороистечения
- = остановку кровотечения
- ~ остановку лимфорей
- ~ восстановление чувствительности в конечностях

}

При повреждении головы для транспортной иммобилизации применяют шину: {

- ~ Белера
- ~ Цито
- ~ Виноградова
- = Еланского
- ~ Кузьминского

}

При закрытых повреждениях головы лучшим для транспортировки считается положение: {

- ~ Тренделенбурга
- ~ Фовлера
- = горизонтальное на спине
- ~ на правом боку
- ~ на спине с валиком под шею

}

В лечении сдавления мозга ведущее место занимают: {

- ~ антибактериальная терапия
- ~ гемотрансфузия
- = декомпрессионная трепанация черепа
- ~ спинномозговая пункция
- ~ применение ферментов

}

Клиника разрыва мышцы выражается в: {

- = выпадении функции поврежденной мышцы
- ~ появлении контрактуры
- ~ гипертонусе
- ~ параличе конечности

}

При сотрясении головного мозга одним из компонентов лечения

является: {

- ~ переливание крови
 - ~ вливание физиологического раствора
 - ~ назначение грелки на голову
 - = в/в вливание 40% раствора глюкозы
 - ~ назначение морфина
- }

Травматический токсикоз характеризуется: {

- ~ эйфорией
 - ~ разжижением крови
 - ~ наличием в моче гемоглобина
 - = наличием в моче миоглобина
 - ~ наличием в моче сахара
- }

Оказание первой помощи при травматическом токсикозе заключается в: {

- = новокаиновой футлярной блокаде и наложение жгута на конечность
 - ~ обкладывании поврежденной ноги грелками
 - ~ вливание гипотензивных средств
 - ~ ведение мезатона
 - ~ вливание 40% уротропина
- }

Сотрясение головного мозга характеризуется: {

- = кратковременной потерей сознания
 - расширением зрачков
 - ~ потерей речи
 - ~ экхимозами
 - ~ тахикардией
- }