

К острому сепсису относятся: {

- = молниеносный
 - ~ рецидивирующий
 - ~ возвратный
 - ~ 2^x фазный
 - ~ последовательный
- }

К грамположительным возбудителям сепсиса относятся: {

- ~ бактерииды
 - ~ кишечные палочки
 - = стафилококки
 - ~ клостридий септикум
 - ~ описторхоз
- }

К грамтрицательным возбудителям сепсиса относятся: {

- ~ стрептококки
 - = синегнойная палочка
 - ~ руминококки
 - ~ микобактерии
 - ~ спирахеты
- }

К клостридиальным анаэробным возбудителям сепсиса относятся: {

- ~ менингококки
 - ~ протей
 - = клостридий перфрингес
 - ~ фузобактерии
 - ~ актиномицеты
- }

К неклостридиальным анаэробным возбудителям сепсиса относятся: {

- ~ пневмококки
 - ~ гонококки
 - ~ эхинококки
 - = кампилобактерии
 - ~ C1. эдиматиенс
- }

Из группы гнилостных микробов возбудителем сепсиса являются: {

- а) пентококк
- б) виелонелла
- г) лактобацилла (C1. hystolyticum)

= *Bac. putrificans* (*Bac. putrificans*)
 }

К очагу дремлющей инфекции способного вызвать сепсис относятся: {
 ~ гнойные раны
 ~ гнойные воспалительные процессы мягких тканей
 ~ острые воспалительные заболевания дыхательных органов
 = хронические воспалительные заболевания придаточных пазух носа
 ~ острые гнойные заболевания органов малого таза
 }

Патогенез сепсиса определяется следующими факторами: {
 = микробиологический
 ~ временной
 ~ пространственный
 ~ производственный
 ~ патронажный
 }

Третий фактор патогенеза сепсиса реактивность организма - обусловлен: {
 ~ площадью поражения
 = иммунобиологическим состоянием организма
 ~ длительностью действия микробов
 ~ вирулентностью возбудителя
 ~ очагом внедрения инфекции
 }

Криптогенный сепсис возникает при наличии: {
 ~ явного гнойного очага
 ~ маловирулентной инфекции
 = скрыто протекающей - дремлющей инфекции
 ~ отсутствие какого либо очага инфекции
 ~ смешанной инфекции
 }