

. Частой причиной острой артериальной недостаточности является: {
= тромбоэмболия артерий
~ острый тромбофлебит
~ варикозное расширение вен
~ атеросклероз
~ ревмокардит
}

Частая причина хронической артериальной недостаточности: {
~ тромбоэмболия артерий
~ острый тромбофлебит
~ рожистое воспаление
= атеросклероз артерий
~ варикоз вен
}

Наиболее информативный метод исследования при артериальной недостаточности кровообращения: {
~ прощупывание пульсации артерии
~ реовазография
~ осциллография
= ангиография
~ ультразвуковая доплерометрия
}

Тромб из левого желудочка может попасть: {
~ верхнюю полую вену
= в ветви аорты
~ в яремную вену
~ в нижнюю полую вену
~ в бедренную вену
}

Ангиография это: {
~ определение пульсации
~ рентгеноскопия
~ определение давления
~ ангиография
= рентгенконтрастное исследование артерий
}

Флебология это: {
~ определение венозного давления
~ исследование лимфатических сосудов

- = рентгенконтрастное исследование вен
- ~ томография
- ~ доплерография
- }

Тромб из глубоких вен нижних конечностей может попасть: {

- ~ в верхнюю полую вену
- = в правый желудочек сердца
- ~ в сонные артерии
- ~ в аорту
- ~ в яремные вены
- }

Какие препараты применяются для расплавления тромба: {

- ~ физиологический раствор
- ~ фурацилин
- = фибринолизин
- ~ стрептомицин
- ~ новокаин
- }

Назовите антикоагулянты прямого действия: {

- ~ фенилин
- = гепарин
- ~ эуфиллин
- ~ дикумарин
- ~ аспирин
- }

К каким осложнениям может привести острая тромбоэмболия магистральной артерии: {

- ~ варикозное расширение вен
- ~ слоновость
- = гангрена
- ~ отек конечности
- ~ рожистое воспаление
- }

Омертвление тканей это: {

- ~ отек
- ~ воспаление
- ~ опухоль
- = некроз
- ~ варикоз
- }

Полное излечение варикозно-трофической язвы возможно только при: {

~ применении венотонизирующих препаратов

~ ношении эластических чулок

= хирургическом вмешательстве

~ лечении повязками

~ применении

гипербарической

оксигенации

}

Укажите наиболее важный симптом артериальной недостаточности конечности: {

~ бледность кожных покровов

~ снижение кожной температуры

= отсутствие пульсации периферических артерий

~ выпадение волос

~ гиперкератоз

}

Трофическая язва это: {

~ омертвление тканей органа в результате первичного нарушения кровообращения

~ одна из форм некроза от воздействий инфекции

~ участок некробиоза

= дефект кожи (слизистой) с малой тенденцией к заживлению

~ локальное омертвление тканей от сдавления

}

Одной из частных причин возникновения трофических язв может быть: {

= хроническое нарушение периферического кровообращения

~ психическая травма

~ ревматизм

~ полиартрит

~ перелом

}

Наиболее опасно для больного наличие: {

~ колостомы

~ гастростомы

= тонкокишечного свища

~ эпицистостомы

~ пупочного свища

}

Какой из перечисленных относится к внутренним свищам? {

- ~ эпицистостома
- ~ гастростома
- = пищеводно-трахеальный свищ
- ~ слюной свищ
- ~ пупочный свищ
- }

К врожденному свищу относится: {

- ~ гастроэнтеро анастомоз
- = влагалищно-прямокишечный свищ
- ~ эпицистостома
- ~ колостома
- ~ желчный свищ
- }

Выделите основной клинический признак влажной гангрены: {

- ~ выраженная интоксикация
- ~ нормальная температура, хороший аппетит
- = отек, зловонный запах пораженных тканей
- ~ наличие четкой демаркационной линии
- ~ чистый PS высокий лейкоцитоз
- }

Основная причина гангрены: {

- ~ ревматизм
- ~ варикоз
- ~ неврит
- ~ авитаминоз
- = атеросклероз
- }

Самым характерным клиническим признаком сухой гангрены является: {

- ~ пузырь с геморрагическим содержимым
- ~ мумификация тканей
- = отсутствие демаркационной линии
- ~ выраженный отек тканей
- }

Какие лечебные средства применяются для расплавления тромба: {

- ~ физиологический раствор
- ~ гипертонический раствор
- новокаин
- ~ фурацилин
- = стрептокиназа

}

Фистулография это: {

- = рентгенконтрастное исследование свища
 - ~ рентгеноскопия
 - ~ пальцевое исследование
 - ~ введение зонда
 - ~ исследование отделяемого
- }

Абсолютным показаниям к ампутации конечности являются: {

- ~ оскольчатый перелом бедренной кости
 - ~ острый тромбофлебит
 - ~ пандактилит
 - = прогрессирующая анаэробная гангрена конечности
 - ~ абсцесс голени
- }

Пролежень чаще всего возникает: {

- ~ при активном ведении больных
 - ~ после аппендэктомии
 - = при длительном лежачем положении
 - ~ после массажа
 - ~ у больных тромбофлебитом подкожных вен
- }

При тромбозе вен назначают: {

- ~ викасол
 - ~ переливание крови
 - ~ хлористый кальций
 - = гепарин
 - ~ аминакапроновая кислота
- }

Язвы чаще всего возникают после: {

- ~ асептических операций
 - ~ ранения нервного ствола
 - ~ паранефральной блокады
 - = внутривенной инъекции
 - ~ ангиография
- }

Какие свищи относятся к врожденным: {

- ~ колостомы
- ~ гастростомы
- = срединные и боковые свищи шеи

- ~ эпицистостома
- ~ цекостома
- }

Пролежни локализуются чаще в области: {

- ~ бедра
- ~ плеча
- ~ предплечья
- = поясницы-крестца
- ~ надколенных чашек
- }

Какой свищ относится к приобретенным: {

- ~ срединный свищ шеи
- ~ боковой свищ шеи
- = эпицистома
- ~ влагалишно - прямокишечный
- ~ врожденный артериовенозный
- }