

Западение языка при наркозе наблюдается в стадии: {

- ~ анальгезии
 - ~ возбуждения
 - = наркотического сна
 - ~ пробуждения
 - ~ в любой стадии
- }

При рефлекторной остановке дыхания во время наркоза достаточно: {

- ~ увеличить концентрацию наркотического вещества
 - ~ проводить искусственное дыхание
 - ~ увеличить концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси
 - = прекратить дачу наркотической смеси
 - ~ вводить препараты, возбуждающие дыхательный центр
- }

При возникновении рвоты во время наркоза следует начинать лечебные действия с: {

- ~ ускоренного углубления наркоза
 - ~ уменьшения дозы наркотического вещества
 - ~ увеличения концентрации кислорода
 - = прекращения подачи наркотического вещества
 - ~ введения средств, угнетающих рвотный центр
- }

Второй уровень третьей стадии эфирного наркоза характеризуется: {

- ~ частым пульсом
 - ~ понижением артериального давления
 - = сохранением реакции зрачков на свет
 - ~ бледностью кожных покровов
 - ~ повышением мышечного тонуса
- }

Для внутривенного наркоза применяется: {

- ~ фторотан
 - ~ хлорэтил
 - = тиопентал натрия
 - ~ циклопропан
 - ~ закись азота
- }

Какой концентрации должен быть стандартный раствор новокаина для выполнения инфильтрационной анестезии по А.В.Вишневскому? {

- ~ 0,5%

- = 0,25%
- ~ 2%
- ~ 3%
- ~ 5%
- }

При каком обезболивании в анестетик добавляют адреналин? {

- = инфильтрационной анестезии по Вишневскому
- ~ спинномозговой
- ~ стволовой
- ~ эпидуральный
- ~ аппликационной
- }

В какой стадии эфирного наркоза выполняется хирургическая операция? {

- ~ анальгезия
- = наркозного сна
- ~ возбуждения
- ~ пробуждения
- ~ в любой стадии
- }

При непрямом массаже сердца давление осуществляют на: {

- ~ верхнюю треть грудины
- ~ среднюю часть грудины
- = нижнюю треть грудины
- ~ левую половину грудной клетки
- ~ не имеет значения
- }

Особенностью газового наркоза является: {

- = быстрый сон
- ~ длительный период возбуждения
- ~ полное расслабление скелетной мускулатуры
- ~ позднее пробуждение
- ~ высокая токсичность
- }

Отрицательной стороной наркоза закисью азота является: {

- = гипоксия
- ~ усиление свертываемости крови
- ~ рекураризация
- ~ длительный период возбуждения
- ~ релаксация мышц
- }

Гексоний относится к: {

~ наркотикам
 ~ анальгетикам
 ~ антигистаминным препаратам
 = ганглиоблокаторам
 ~ нейролептикам
 }

Какое оптимальное соотношение смеси кислорода и закиси азота применяется для наркоза? {

~ 1 : 2
 ~ 2 : 1
 = 1 : 4
 ~ 4 : 1
 ~ 5 : 1
 }

Какие препараты являются основными при создании состояния гибернации: {

~ наркотики
 ~ анальгетики
 ~ мышечные релаксанты
 = нейролептики
 ~ ганглиоблокаторы
 }

Оптимальной концентрацией раствора тиопентала натрия для внутривенного наркоза является: {

~ 0,5%
 ~ 10%
 ~ 5%
 = 2,5%
 ~ 15%
 }

Искусственная гипотермия применяется для: {

~ глубокого обезболивания
 ~ потенцированного наркоза
 ~ искусственного снижения артериального давления
 = снижения потребности тканей в кислороде
 ~ предупреждения шока
 }

Потенцированный наркоз можно осуществить применением смеси: {

~ диуретиков
 ~ гармонов
 ~ местных анестетиков
 = нейролептиков, ганглиоблокаторов и анальгетиков
 ~ тримекаина, лидокаина и фуросемида
 }

Симптомом гипоксии является: {
 ~ бледность
 ~ тахикардия
 ~ урежение дыхания
 ~ брадикардия
 = повышение артериального давления
 }

Признаком нормального протекающего эфирного сна является: {
 ~ частое дыхание
 ~ наличие карнеального рефлекса
 = сужение зрачков
 ~ учащение пульса
 ~ понижение артериального давления
 }

Лечение отека легких проводится: {
 ~ переливанием крови
 = внутривенным введением гипертонического раствора хлористого натрия
 ~ нейролептиками
 ~ антигистаминными препаратами
 ~ анальгетиками
 }

Методы искусственного дыхания: {
 = «рот в рот», «рот в нос»
 ~ Макинтоша
 ~ Пирогова
 ~ Кравкова
 ~ Анрепа
 }

При реанимации больного врач производит следующие действия: {
 = искусственное дыхание
 ~ углубляет наркоз
 ~ вводят релаксанты
 ~ внутриаириальное переливание кровезаменителей

~ внутрисердечное введение атропина
}

Искусственное дыхание проводится с целью: {
~ возбуждения дыхательной мускулатуры
~ возбуждения сердечной деятельности
~ раздувания легких
~ возбуждения дыхательного центра
= предупреждения гипоксии
}

Гипоксемия - это недостаточное содержание кислорода в: {
~ вдыхаемом воздухе
~ выдыхаемом воздухе
~ легочных альвеолах
= крови

~ клетках тканей
}

Рвота исчезает в стадии: {
~ анальгезии
~ возбуждения
= в первом уровне третьей стадии
~ в третьем уровне третьей стадии
~ пробуждения
}

Искусственное дыхание при эндотрахеальном наркозе производится методом: {
~ «рот в рот»
~ Сильвестра
~ Лаборда
~ Шуллера
= наркозным аппаратом
}

При механической асфиксии лечебная помощь начинается с: {
~ введения сердечных препаратов
~ искусственного дыхания
~ введения препаратов, возбуждающих дыхательный центр
= освобождения дыхательных путей
~ подачи чистого кислорода
}

Правильная позиция эндотрахеальной трубки в трахее означает: {

- ~ трубка введена в глубину до отказа
- ~ манжетка на уровне голосовой щели
- ~ манжетка на уровне черпаловидного хряща
- = манжетка на уровне подсвязочного пространства
- ~ верхний срез трубки у края зубов
- }

При каком обезболивании применяются релаксанты? {

- ~ перидуральной анестезии
- ~ хлорэтиловом наркозе
- ~ спинномозговой анестезии
- = эндотрахеальном наркозе
- ~ инфильтрационной анестезии
- }

Мышечные релаксанты действуют на: {

- ~ ганглии вегетативной нервной системы
- = нейромышечные синапсы
- ~ сердечную мышцу
- ~ дыхательный центр
- ~ задние рога спинного мозга