

Из числа пострадавших от травм в амбулаторной помощи нуждаются: {

- ~10% больных
 - ~ 20% больных
 - ~ 40% больных
 - ~ 70% больных
 - = 90% больных
- }

Характерными объективными симптомами травматического вывиха являются: {

- = вынужденное положение и укорочение относительной длины конечности
 - ~ укорочение абсолютной длины конечности
 - ~ патологическая подвижность на протяжении длины конечности.
 - ~ крепитация на необычном месте конечности
 - ~ отек сустава ниже места повреждения
- }

Какой из ниже следующих медицинских манипуляций может выполнить опытный фельдшер самостоятельно?

- ~открытый массаж сердца
- =закрытый массаж сердца, тампонаду при кровотечениях
- ~трахеостомию
- ~интубацию трахеи
- ~эпицистостомию

ФАП для оказания амбулаторной помощи открывается в сельской местности с населением: {

- ~от 150 – до 200 жителей
- ~от 200 – до 300 жителей
- ~от 300 – до 400 жителей
- ~от 400 – до 500 жителей
- = от 300 – до 700 жителей }

Обязательным условием для функционирования ФАП является размещение следующих помещений: {

- ~ операционной
 - ~ рентгенкабинета
 - ~ ЭКГ кабинета
 - = перевязочного, процедурного кабинетов
 - ~ автоклавной
- }

Травматологический пункт с круглосуточным дежурством травматолога открывается в городах с населением: {

- ~ 30 тыс.человек
- ~ 50 тыс.человек

~ 100 тыс.человек
 ~ 150 тыс.человек
 = 200 тыс.человек
 }

В зоне отгонного животноводства амбулаторная помощь оказывают медработники: {

= ФАП и участковой больницы
 ~ медикосанитарных частей
 ~ межрайонных больниц
 ~ круглосуточных травм пунктов
 ~ круглосуточных специализированных медицинских пунктов
 }

Комплектация хирургической службы поликлиник производится из расчета 0,5 ставки хирурга на: {

~ 3 тыс.взрослого населения
 ~ 5 тыс. взрослого населения
 = 10 тыс.взрослого населения
 ~ 15 тыс. взрослого населения
 ~ 20 тыс. взрослого населения
 }

Какую из перечисленных операций нежелательно выполнить в условиях поликлиники? {

~ хирургическая обработка ран
 = вскрытие и дренирование гнойных артритов
 ~ удаление поверхностных доброкачественных опухолей (атером, липом)
 ~ вскрытие панарициев и флегмон кисты
 ~ вскрытие гнойных маститов, абсцессов ягодичной области
 }

Какую из указанных операций может быть выполнена в амбулаторных условиях?
 {

удаление меланомы (пигментной опухоли кожи)
 ~ опухоли молочной железы
 ~ удаление полипа прямой кишки
 ~ удаление лейкоплакии губы
 = удаление бурсита локтевого отростка
 }

Работа хирургической службы поликлиники состоит из: {

~ малой хирургии разрешенного выполнять в амбулаторных условиях
 ~ лечение больных выписанных из стационаров
 ~ профилактических осмотров для выявления хирургических заболеваний и лечения выявленных заболеваний в хирургических стационарах

- ~ ежемесячного обсуждения дефектов в работе хирургической службы на заседаниях ВКК
- = все верно
- }

Укажите какой формы карта диспансерного наблюдения заполняется на больных подлежащим оперативного оздоровления: {

- ~ форма № 30/Д
- ~ форма № 29/А
- = форма № 30/У
- ~ форма № 25/Г
- ~ форма № 33/Б
- }

Отказ больного от неотложной операции следует с его подписью занести в индивидуальную карту амбулаторного больного следующей формы: {

- ~ форма № 021/У
- ~ форма № 022/У
- ~ форма № 023/У
- ~ форма № 024/У
- = форма № 025/У
- }

Каких больных амбулаторный хирург должен направлять на госпитализацию? {

- ~ с хроническими хирургическими заболеваниями не подлежащих лечению в амбулаторных условиях
- ~ при отсутствия эффекта от амбулаторного лечения
- ~ с тяжелыми сопутствующими заболеваниями
- ~ с высоким операционным риском в объеме малой хирургии
- = все верно
- }

В чистой перевязочной производят следующие вмешательства: {

- ~ ПХО ран мягких тканей
- ~ вправление несложных вывихов
- ~ лечение ограниченных ожогов I-II степени
- ~ катетеризацию или пункцию мочевого пузыря
- = все верно
- }

Для стерилизации режущих и колющих инструментов в амбулаторной хирургии широко применяют следующие способы: {

- ~ кипячение
- ~ сухой жар в специальных шкафах
- = холодная химическая стерилизация в антисептических растворах
- ~ автоклавирование

~ ультрафиолетовые лучи бактерицидных ламп
}

Какой химический препарат не используется для приготовления тройного антисептического раствора: {

~ карболовая кислота
~ формалин
~ карбонат натрия
~ вода дистиллированная
= пергидрол
}

При давлении в автоклаве 1,5 ат. стерилизацию операционного белья и перевязочного материала проводят в течение: {

~ одного часа
~ двух часов
= 1,5 часа
~ 30 минут
~ 20 минут
}

Для фиксации стерильной салфетки на ране в амбулаторной хирургии удобно пользоваться сетчато-трубчатыми бинтами «Рэтеласт» следующих номеров: {

~ № 1 – для пальцев
~ № 2 – для кисти и стопы
~ № 3 и 4 – для плеча и голени
~ № 5 и 6 – для головы и бедра
~ № 7 – для груди и живота
= все верно
}

Разрешение на эксплуатацию установленного автоклава дает: {

~ руководитель поликлиники (амбулаторной службы)
= специальная организация «Роспотребнадзор»
~ зам.глав.врача поликлиники по хозяйству
~ амбулаторный хирург
~ главная сестра поликлиники
}

К работе с автоклавом допускают: {

= средних медработников прошедших специальную подготовку и сдавших экзамен по технике безопасности.
~ врача общего профиля прошедший специализацию по эксплуатации автоклава
~ санитарку хирургического кабинета имеющая навыки работы с автоклавом
~ амбулаторного хирурга работающего по совместительству

~ медицинского работника любого ранга имеющий среднетехническое второе образование
 }

При посеве воздуха операционного – перевязного блока количество микроорганизмов в 1м³ воздуха не должно превышать: {

~ 1000–1500
 = 500–1000
 ~1500–2000
 ~ 2000–2500
 ~ 2500–3000
 }

В амбулаторной хирургии преимущественно применяют анестезию: {

~ перидуральную
 ~ спинномозговую
 = местную новокаиновую инфильтрационную
 ~ по Лукашевичу
 ~ внутрикостную
 }

Амбулаторная хирургия – это оказание хирургической помощи в условиях: {

= поликлиники, амбулатория участковой и районной больницы и ФАП
 ~ стационара
 ~ специализированного отделения
 ~ центрального института хирургии
 ~ травматологического отделения больницы
 }

Амбулаторный хирург выставил диагноз – острый аппендицит. Какова тактика хирурга: {

~ вызвать операционную бригаду для срочной операции в условиях поликлиники
 = вызвать скорую помощь и направить больного в дежурную больницу
 ~ собрать консилиум для определения лечебной тактики
 ~ сделать обзорную рентгенографию органов брюшной полости
 ~ сделать биохимические исследования крови и снять ЭКГ
 }