

Как называются реакции II типа по Кумбсу-Джеллу: {

- ~ анафилактические
 - ~ клеточные
 - = цитотоксические
 - ~ иммунокомплексные
 - ~ рецепторно-опосредованные
- }

Как называются реакции III типа по Кумбсу-Джеллу: {

- ~ анафилактические
 - ~ клеточные
 - ~ цитотоксические
 - = иммунокомплексные
 - ~ рецепторно-опосредованные
- }

Как называются реакции I типа по Кумбсу-Джеллу: {

- = анафилактические
 - ~ клеточные
 - ~ цитотоксические
 - ~ иммунокомплексные
 - ~ рецепторно-опосредованные
- }

Под иммунологической толерантностью понимают: {

- = отсутствие иммунной реакции на антиген
 - ~ ослабление иммунной реакции на антиген
 - ~ повышение иммунной реакции на антиген
 - ~ индукция иммунного ответа
 - ~ все верно
- }

Укажите вид иммунодефицита при агаммаглобулинемии Брутона: {

- ~ клеточный
 - = гуморальный
 - ~ ретикулярная дисгенезия
 - ~ ТКИН
 - ~ все верно
- }

Вторичные иммунодефициты могут возникать при: {

~ очаговой пневмонии
~ бронхитах
= злокачественных опухолях
~ Fe - дефицитной анемии
~ все верно
}

Укажите первичные иммунодефициты: {
~ синдром Дауна
~ синдром Иова
~ СПИД
= синдром Ди-Джорджи
~ синдром Клайнфельтера
}

Антиген - распознающими клетками являются: {
~ эритроциты
~ базофилы
= макрофаги
~ нейтрофилы
все верно
}

Антиген - презентирующими клетками являются: {
~ эритроциты
~ базофилы
= макрофаги
~ нейтрофилы
~ все верно
}

Какие клетки участвуют в IV-ом типе аллергических реакций (по Кумбсу) : {
~ В - лимфоциты
~ эритроциты
~ клетки соединительной ткани
= Т - клетки
~ клетки нейроглии
}

К центральным органам иммунной системы относятся: {
~ печень
~ селезенка
= костный мозг
~ лимфоциты крови

~ все верно
}

К центральным органам иммунной системы относится: {

~ печень
~ селезенка
= тимус
~ лимфоциты крови
~ все верно
}

К периферическим органам иммунной системы относятся: {

~ печень
= селезенка
~ костный мозг
~ тимус
~ все верно
}

К реакциям трансплантат против хозяина (РТПХ) относятся: {

= гомологичная болезнь
~ феномен Овери
~ сывороточная болезнь
~ феномен Артюса
~ анафилаксия
}

Укажите характер повреждений, развивающихся по III типу (по Кумбсу и Джеллу): {

~ поллинозы
~ бронхиальная астма
~ контактный дерматит
= сывороточная болезнь
~ все верно
}

К заболеваниям аутоиммунной природы относят: {

~ поллиноз
~ отек Квинке
~ крапивница

= тиреоидит Хашимото
~ все верно
}

Трансплантация каких тканей вызывает развитие РТПХ: {
~ стромальных
~ эпителиальных
= селезенки
~ клетки крови (лейкоциты и эритроциты)
~ все верно
}

Реакции IV типа по Кумбсу и Джеллу называются: {
~ анафилактическими
= клеточными
~ цитотоксическими
~ иммунокомплексными
~ рецепторно-опосредованными
}

Эпитопы – это: {
= антигенные детерминанты
~ антитела
~ иммуноциты
~ ферменты
~ моносахариды
}

Какими клетками обеспечивается клеточный иммунный ответ: {
= Т - клетками
~ В - клетками
~ нейтрофилами
~ эозинофилами
~ базофилами
}

Очередность стадий аллергических реакций: {
~ патохимические нарушения, иммунологические реакции,
патофизиологические нарушения
~ патохимические нарушения, патофизиологические нарушения,
иммунологические реакции

= иммунологические реакции, патохимические нарушения,
патофизиологические нарушения
~ иммунологические реакции, патофизиологические нарушения,
патохимические нарушения
~ патофизиологические нарушения, патохимические нарушения,
иммунологические реакции
}

Сущность стадии патофизиологических нарушений: {
~ активизация тканевых и клеточных ферментов
~ накопление в организме специфических антител
= реакция поврежденных аллергеном клеток и тканей организма
~ быстрое усиление некротических процессов
}

Сущность стадии патохимических нарушений: {
= активизация тканевых и клеточных ферментов
~ накопление в организме специфических антител
~ реакция поврежденных аллергеном клеток и тканей организма
~ быстрое усиление некротических процессов
}

Сущность стадии иммунных реакций: {
~ активизация тканевых и клеточных ферментов
= накопление в организме специфических антител
~ реакция поврежденных аллергеном клеток и тканей организма
~ быстрое усиление некротических процессов
}

Определение понятия гаптен: {
~ полноценный антиген
~ вещество, вызывающее активную выработку антител
= вещество, приобретающее свойства полного антигена после соединения с
белками организма
~ вещество, образованное из собственных тканей организма под влиянием
различных повреждений
}

Примеры аллергических реакций замедленного типа: {
~ сывороточная болезнь
= контактный дерматит
~ отек Квинке
~ крапивница
~ агранулоцитоз
}

Примеры аллергических реакций немедленного типа: {
= сывороточная болезнь
~ контактный дерматит
~ реакция отторжения трансплантата
~ продуктивное воспаление
}

Чем характеризуется гиперергическая форма болезни? {
= быстрым, бурным течением
~ отсутствием проявлений болезни
~ слабыми проявлениями болезни, вялым течением
~ извращением защитных реакций (фагоцитоза, АТ- образования)

}

Воспалительные реакции в состоянии зимней спячки: {
~ воспаление протекает так же, как и в норме
= воспаление протекает медленно
~ воспаление приобретает гиперергический характер
}

Что такое гипозергия : {
~ повышенная реактивность
= пониженная реактивность
~ полное отсутствие ответных реакций
~ извращенные ответные реакции
}

Что такое гиперергия: {
= повышенная реактивность
~ пониженная реактивность
~ полное отсутствие ответных реакций
~ извращенные ответные реакции
}

Реактивность в детском возрасте: {
= понижена
~ повышена

- ~ адекватна реактивности взрослых
- ~ извращена
- }

Механизм расстройства акта дыхания при бронхиальной астме: {

- ~ возникает инспираторная одышка
- = возникает экспираторная одышка
- ~ возникает смешанная одышка
- ~ возникает периодическое дыхание
- }

Чем характеризуется бронхиальная астма: {

- = внезапным приступом удушья с затруднением выдоха
- ~ затруднением вдоха
- ~ затруднением обеих фаз дыхания
- ~ внезапной остановкой дыхания
- ~ внезапным приступом кашля
- }

Причины пассивной сенсibilизации: {

- ~ употребление некоторых пищевых продуктов (мед, яйца и т.д.)
- = введение сыворотки сенсibilизированного организма
- ~ попадание аллергена в организм парентеральным путем
- ~ контакт кожи больного организма с низкомолекулярными веществами
- ~ вдыхание различных пылевых частиц
- }

Что такое анергия: {

- ~ состояние повышенной реактивности
- ~ состояние пониженной реактивности
- = полное отсутствие ответных реакций
- ~ извращение ответной реакции
- ~ ослабление ответной реакции
- }

Что такое дизергия: {

- ~ повышенная реактивность
- ~ пониженная реактивность
- ~ полное отсутствие ответных реакций
- = извращенные ответные реакции

}

Скорость возникновения анафилактического шока: {

= через несколько секунд после введения разрешающей дозы

~ через 1-2 мин. после введения разрешающей дозы

~ через 1-2 час. после введения разрешающей дозы

~ через 1-2 недели после введения разрешающей дозы

}

Факторы, нарушающие бронхиальную проходимость при бронхиальной астме: {

= бронхоспазм, отек слизистой и гиперсекреция слизистых желез

~ закупорка бронхов слизью, инородными телами

~ нарушение эластичного каркаса легочных альвеол

~ расстройство кровообращения бронхиального дерева

~ воспалительный процесс в бронхах

}

Причина чужеродности ткани хрусталика для организма: {

~ ткань хрусталика соединяется с экзогенными веществами

~ эта ткань в процессе онтогенеза впервые появляется в организме

= в процессе онтогенеза ткань оказалась изолированной от аппарата иммуногенеза

~ ткань хрусталика претерпевает изменения вследствие экзогенных влияний

~ лимфоидная ткань извращенно реагирует на контакт с тканью хрусталика

}

Важнейшее условие развития сывороточной болезни: {

~ введение лекарственных средств

~ циркуляция свободных антител

~ наследственные дефекты иммунологической системы

= повторное введение антигена

~ наличие аллергической конституции - предрасположение человека к аллергии

}

В каком организме наиболее интенсивно выражены защитно-физиологические явления: {

- ~ в одноклеточном
 - ~ в многоклеточном
 - ~ в пойкилотермном
 - = в гомойотермном
- }

Сущность десенсибилизационного метода А.М. Безредко: {

- ~ введение антигена под наркозом
 - = дробное парентеральное введение малых доз антигена
 - ~ введение антигена в ранние сроки сенсibilизации
 - ~ внутривенное введение больших доз антигена
- }

Способы создания десенсибилизации: {

- = введение антигена по методу А. Я. Безредко
 - ~ введение антигена внутривенно
 - ~ введение антигена в оптимальные сроки сенсibilизации
 - ~ введение больших доз антигена
- }

Патогенез отека Квинке: {

- ~ нарушается проницаемость сосудов за счет серотонина
 - ~ расширяются кровеносные капилляры за счет брадикинина
 - ~ освобождается большое количество жидкости за счет гепарина
 - ~ меняется холинэстеразная активность тканей
 - = повышается гидрофильность волокон рыхлой соединительной ткани за ~
 - счет гистамина
- }

Причины идиосинкразии: {

- = употребление необычной пищи (клубника, мед, яйца и т.д.)
 - ~ введение сыворотки сенсibilизированного организма
 - ~ попадание аллергена в организм парентеральным путем
 - ~ контакт кожи больного организма с низкомолекулярными веществами
- }

Причина активной сенсibilизации: {

- ~ употребление некоторых пищевых продуктов (клубника, мед, яйца и т.д.)
- ~ введение сыворотки сенсibilизированного организма
- = попадание аллергена в организм парентеральным путем
- ~ контакт кожи больного организма с низкомолекулярными веществами
- ~ вдыхание различных пыльных частиц

}

Виды сенсibilизации: {

- ~ высокая и низкая
- ~ быстрая и замедленная
- = активная и пассивная
- ~ специфическая и неспецифическая
- ~ видовая и специфическая

}

Способ обнаружения реагинов: {

- ~ реакция связывания комплемента
- ~ реакция преципитации
- ~ реакция агглютинации
- = реакция Праусница- Кюстнера

}

Сущность феномена Артюса: {

- ~ анафилактическая реакция изолированных гладкомышечных волокон
- = воспалительно-некротическая реакция кожи в месте многократного введения чужеродного антигена
- ~ немедленное местное выражение общей анафилактической реакции
- ~ некротические изменения в кишечнике после введения антигена
- ~ местное вазотоксическое действие антигена

}

Наиболее частое проявление анафилактической реакции у человека: {

- = анафилактический шок
- ~ сывороточная болезнь
- ~ феномен Артюса
- ~ феномен Овери

}

Определение понятия анафилаксии: {

- ~ состояние приобретенной повышенной чувствительности к действию собственного белка
- ~ состояние приобретенной пониженной чувствительности к действию чужеродного белка

= состояние приобретенной повышенной чувствительности к действию чужеродного белка

~ генетически обусловленная высокая чувствительность к чужеродному белку

}